UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT
00000218

Digitized by Google

HN. 299

Digitized by Google

Digitized by Google

H.N 299

Digitized by Google

LE REGNE
ANIMAL.

REGNUM
ANIMALE.

Digitized by Google

REGNUM ANIMALE

IN CLASSES IX DISTRIBUTUM;

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS GENERALEM *ANIMALIUM* distributionem in Classes IX, & duarum primarum Classium, *Quadrupedum* scilicet & *Cetaceorum*, particularem divisionem in Ordines, Sectiones, Genera & Species.

CUM BREVI CUJUSQUE SPECIEI descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium, Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nominibusque vulgaribus.

A D. BRISSON, Historiæ Naturalis Musei Realmuriani Demonstratore.

Cum Figuris æneis.

PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM.

Apud Cl. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam, ad Insigne Stæ. Genovefæ, & Sti. Joannis in Deserto.

M. DCC. LVI.

Cum Privilegio Regis & Approbatione.

Digitized by Google

LE REGNE ANIMAL
DIVISÉ EN IX CLASSES,
OU
MÉTHODE

CONTENANT LA DIVISION GENERALE DES *Animaux* en IX Claſſes, & la diviſion particuliere des deux premieres Claſſes, ſçavoir de celle des *Quadrupedes* & de celle des *Cetacées*, en Ordres, Sections, Genres & Eſpéces.

AUX QUELLES ON A JOINT UNE courte deſcription de chaque Eſpéce, avec les Citations des Auteurs qui en ont traité, les Noms qu'ils leurs ont donnés, ceux que leurs ont donnés les différentes Nations, & les noms vulgaires.

Par M. BRISSON, Démonſtrateur du Cabinet d'Hiſtoire Naturelle de M. de Reaumur.

Avec Figures en taille douce.

A PARIS,

QUAY DES AUGUSTINS.

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte Geneviéve & S. Jean dans le Deſert.

M. DCC. LVI.

Avec Privilege du Roi & Approbation.

Digitized by Google

Digitized by Google

A MONSIEUR
DE REAUMUR,

Commandeur & Intendant de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis; de l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, des Académies de Peterſbourg & de Berlin, de l'Inſtitut de Bologne, &c. &c.

MONSIEUR,

Il ne fut jamais d'hommage plus légitime que celui que je vous rends aujourd'hui. Cet Ouvrage doit être

Digitized by Google

regardé comme votre bien, puiſque c'eſt chez vous que j'ai puiſé les connoiſſances qui l'ont produit. Si le Public lui accorde ſon ſuffrage, c'eſt à votre Nom ſeul que je le devrai.

J'ai l'honneur d'être avec un profond reſpect,

MONSIEUR,

Votre très humble &
très obéiſſant ſerviteur.
BRISSON.

Digitized by Google

PREFACE.

LA place que j'ai le bonheur d'occuper depuis plusieurs années, m'ayant mis journellement sous les yeux la plus riche collection des productions de la nature, qui ait jamais été faite, m'a donné la facilité de faire un grand nombre d'observations sur le Regne Animal, de comparer entr'eux les êtres animés qui lui appartiennent, d'en examiner les rapports les plus prochains & les plus éloignés. J'ai été ainsi conduit à penser à disposer les Animaux dans un ordre différent de ceux, où on les a mis jusqu'ici. Mon intention, en y travaillant, étoit uniquement de m'instruire moi-même, & de me mettre en état de juger des places les plus convenables aux nouveaux Animaux, qui se présenteroient pour en avoir une dans ces Cabinets, dont le soin m'est confié, & où il y en a tant de rassemblés: & la juste défiance que j'ai de mes lumieres, ne m'eût pas permis de faire paroître au jour la distribution qui m'avoit semblé la plus commode, si je n'y eusse été encouragé par des Sçavans, qui m'ont aidé de leurs conseils, pendant que j'y travaillois; & pour tout dire, par l'approbation que lui a donnée la plus célébre des Académies, l'Académie Royale des Sciences.

Digitized by Google

J'oſe embraſſer tout le Regne Animal. Il ſera diviſé en Claſſes ; les Claſſes en Ordres ; les Ordres en Sections ; les Sections en Genres ; & les Genres en Eſpéces. Chacune de ces diviſions ou ſous-diviſions aura un caractere qui lui ſera propre. Le premier déſignera la Claſſe ; le ſecond l'Ordre ; le troiſiéme la Section ou le Genre. Je dis, la Section, ou le Genre ; parce qu'il y a quelques Animaux, comme le *Rhinoceros*, qui ſeuls compoſent un Ordre, lequel par conſéquent n'eſt point diviſé en Sections : alors le troiſiéme caractere eſt celui du Genre. Au contraire, lorſque l'Ordre ſera diviſé en Sections, ce ſera par le quatriéme caractere que le Genre ſera déſigné. Pour ce qui eſt des Eſpéces, je me contenterai d'une courte énumeration de ce qu'il y a de propre à les faire diſtinguer les unes des autres ; me reſervant à donner des deſcriptions plus détaillées de ces mêmes Eſpéces, lorſque je publierai, comme je me le propoſe, une deſcription générale du magnifique Cabinet d'Hiſtoire Naturelle de M. de Reaumur.

Il y aura donc tout au plus cinq choſes à obſerver, non ſeulement pour mettre un Animal dans ſon Genre, mais encore pour en déterminer l'Eſpéce. Je ſuppoſe, par exemple, qu'on préſente un *Caſtor* à quelqu'un qui n'en a jamais vû, & qui ne le connoît point du tout : par le moyen de cette méthode il connoîtra dans le moment l'eſpéce de cet Animal. Premierement ſes *quatre pieds*, & le *poil* dont ſon corps eſt couvert, lui apprendront qu'il eſt de la premiere Claſſe, de celle des Quadrupedes. Secondement les *deux dents inciſives* qu'il a à chacune de ſes mâchoires, & les ongles de ſes doigts, ou ſes doigts qui ſont de ceux que l'on

Digitized by Google

nomme *onguiculés*, lui feront connoître qu'il eſt du XII Ordre de cette Claſſe. Troiſiémement en continuant de l'obſerver, il remarquera qu'il eſt dépourvû de *dents Canines*, & qu'il n'a pas de *picquants* ſur le corps; ce qui lui apprendra qu'il eſt de la II Section de cet Ordre. Quatriémement ſa queue *platte & écailleuſe* lui déſignera le XXI Genre pour celui auquel l'Animal appartient. Cinquiémement enfin l'applatiſſement *horizontal* de cette queue déterminera l'Eſpéce, & lui apprendra qu'il eſt le *Caſtor*: & ainſi des autres Eſpéces.

J'ai tâché de ne faire rien entrer dans les caracteres que de ſimple & de facile à appercevoir, pour ne point expoſer aux erreurs dans leſquelles des caracteres plus compliqués pourroient induire. Au reſte je ne me flatte pas d'avoir toujours été aſſez heureux pour ſaiſir ce qu'il y avoit de mieux; je ſerai ſenſiblement obligé à ceux qui voudront bien me le montrer, & me faire connoître mes fautes, que je ſerai empreſſé à corriger.

On imagine bien que je n'ai pû parvenir à voir toutes les eſpéces d'Animaux dont il eſt parlé dans cet Ouvrage. Celles que j'ai éte à portée d'éxaminer de mes propres yeux, je les ai décrites avec le plus d'exactitude qu'il m'a été poſſible. Pour ce qui eſt de l'exactitude des deſcriptions des autres Eſpéces, j'en donne pour garants les Auteurs qui me les ont fournies. Auſſi, afin qu'on ſache à quoi s'en tenir, ai-je marqué de ** les Eſpéces dont j'ai fait la deſcription ſur l'Animal même; & de * ſeulement celles que je n'ai vûes qu'en partie, celles dont j'ai vû ſeulement les parties d'où j'ai tiré les caracteres. Le reſte de leur deſ-

cription, & les deſcriptions entieres des Eſpéces qui n'ont aucune marque, je les ai faites d'apres les différens Auteurs cités dans cet Ouvrage : & j'ai toujours préferé la deſcription de ceux qui ont dit avoir vû l'Animal.

Ce premier Volume ne contiendra que les deux premieres Claſſes, celle des Quadrupedes, & celle des Cetacées. Si cet Eſſai eſt agréé du Public, le deſir que j'ai de lui plaire, & de lui être utile, me fera travailler avec ardeur à achever de mettre les autres Claſſes en état de lui être préſentées.

Les Figures que j'ai fait graver, ont toutes été deſſinées ſur l'original. Mon intention étoit d'en donner au moins une de chaque Genre; mais l'impoſſibilité, dans laquelle je me ſuis trouvé, d'avoir les originaux néceſſaires, jointe à ce qu'elles m'ont paru aſſez peu utiles, puiſque la plûpart des caracteres ne ſont tirés que du nombre des *dents* & des *doigts*, m'a déterminé à n'en donner qu'un petit nombre : & ce petit nombre contient des parties d'Animaux, qui, quoique pour la plûpart aſſez communs, nont jamais été bien décrits. Je ferai mon poſſible pour remplir ma premiere intention dans les Claſſes ſuivantes ; c'eſt-à-dire, que je donnerai au moins une Figure de chaque Genre; parce que le plus ſouvent il ne s'agira plus de nombres, mais de formes, toujours difficiles à ſaiſir par la ſimple deſcription : & toutes ces Figures ſeront gravées d'après nature.

Digitized by Google

ERRATA.

Precedens, *semper lege*, præcedens.

Page	5 Ligne	13.	qui eſt, *liſez*, qui en.
4		20.	Cetace's, *liſez*, Cetacées.
6	17 &	38.	Crustace's, *liſez*, Crustacées.
7		29.	CETACE'S, *liſez*, CETACE'ES.
18		39.	nudique, *lege*, undique,
28		7.	*Kein. liſez*, *Klein.*
36	14, 17 &	25.	eum, *lege*, illud.
42		34.	Schilrverken, *liſez*, Schildverkens.
69		6.	Bezoarticus, *lege*, Bezaarticus.
		8.	Bezaarticus, *lege*, Bezoarticus.
73		4.	craſſia, *lege*, craſſa.
75		16.	L'emblin, *liſez*, L'Amblin.
88		23.	Goenlandica, *lege*, Groenlandica.
140		33.	1 ' pede, *lege*, 1 $\frac{1}{2}$ pede.
		39.	2 ' pollices, *lege*, 2 $\frac{1}{2}$ pollices.
156		12.	Au, *lege*, An.
170		33.	7 pollicum, *lege*, 7 $\frac{1}{2}$ pollicum.
175		16.	1 $\frac{1}{2}$ pouce, *liſez*, 1 $\frac{1}{2}$ pouce.
196		18.	C zapud, *lege*, Cay apud.
201		29.	Gaput, *lege*, Caput.
215		16.	Fig. a, *lege*, Fig. 4. a.
241		26.	Blarây, *liſez*, Blarây.
246		37.	habet l ata, *lege*, habet latas.
259		40.	d'argentré, *liſez*, d'argenté.
270		3.	variegatâ, *lege*, variegata.
310		37.	Aſna, *lege*, Aſna.
311		17.	Biſon, 1. 6. *lege*, Biſon, 11 2.
		18.	— Amériquain, 1. 7. *lege*, — Amériquain, 18 7.
312		24.	Bandhirts, *lege*, Brandhirts.
319		19.	Fl'dermus, *lege*, Fl'dermus.
347		11.	Maxillâ, *lege*, Maxilla,
352		6.	*Geſn. lege*, *Gen.*
		13.	*Gen. lege*, *Geſn.*
375		3.	en, *lege*, ex.

De l'Imprimerie de D'Houry Fils.

Digitized by Google

REGNUM

Digitized by Google

REGNUM ANIMALE IN CLASSES IX. DISTRIBUTUM.

ANTEQUAM caracteres uniuſcujuſque claſſis enumeremus, obſervandæ ſunt rationes ob quas in hoc ordine claſſes iſtas reponimus. Agemus primò de Animalibus, quæ majorem habent cum homine analogiam: & deinde de Animalibus, quæ ab iſta analogia magis recedunt. Inter Animalia, alia, hominis modo, ſunt *Sanguinea*; id eſt, liquor rubicundus circulari & indeſinenti motu per ipſorum arterias & venas fluit, cui liquori rubicundo *Sanguinis* nomen inditum eſt: alia verò ſunt *Exanguia*; id eſt, liquore illo rubicundo omninò carent. Inter *Sanguinea*, alia *Pulmonibus* ut homo; alia *Branchiis* ſpirant. Ex iſtis quæ *Pulmoni-*

LE REGNE ANIMAL DIVISÉ EN IX. CLASSES.

AVANT d'établir les caracteres propres à diſtinguer chaque claſſe, il eſt à propos de faire les obſervations, qui m'ont conduit à leur donner à chacune le rang qu'elle occupe. Je commence par les Animaux qui ont le plus d'analogie avec l'homme, & finis par ceux qui en ont le moins. Parmi les Animaux qui habitent notre globe, les uns ont du *Sang* analogue à celui de l'homme; c'eſt-à-dire qu'il circule dans leurs arteres & leurs veines une liqueur rouge à laquelle on a donné le nom de *Sang*: & les autres n'ont point cette liqueur rouge. Parmi ceux qui ont du *Sang*, les uns reſpirent, comme l'homme, par des *Poumons*: & les autres reſpirent par des *Ouïes*. De ceux qui reſpirent par des *Poumons*, les uns ont,

Digitized by Google

comme l'homme, *deux Ventricules* au cœur : & les autres n'en ont qu'*un*. Parmi ceux qui ont *deux Ventricules* au cœur, les uns, comme l'homme, ſont *Vivipares*, & *alaittent* leurs petits : & les autres ſont *Ovipares*. Parmi ceux qui ſont *Vivipares*, & qui *alaittent* leurs petits, les uns ont, comme l'homme, du *Poil*, au moins à quelque partie du corps, & *quatre Pieds* analogues aux pieds & aux mains de l'homme : & les autres ont le corps *nud*, & au lieu de pieds, ils ont des *Nageoires charnues*.

La premiere claſſe eſt compoſée des Animaux qui ont avec l'homme ces *cinq* analogies ; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *Sang* ; qu'ils reſpirent par des *Poumons* ; qu'ils ont *deux Ventricules* au cœur ; qu'ils ſont *Vivipares* & *alaittent* leurs petits ; & qu'ils ont du *Poil*, au moins à quelque partie du corps, & *quatre Pieds* analogues aux pieds & aux mains de l'homme.

Dans la ſeconde ſont ceux qui n'ont avec l'homme que les *quatre* premieres analogies ; c'eſt-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *ſang* ; qu'ils reſpirent par des *poumons* ; qu'ils ont *deux ventricules* au cœur ; & qu'ils ſont *vivipares*, &

bus ſpirant, alia, ut homo, *duobus* gaudent in corde *Ventriculis* : alia verò *unico* tantum donantur. Inter iſta quæ *duos* habent in corde *Ventriculos*, alia, ut homo, ſunt *Vivipara* ; id eſt, *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt : alia ſunt *Ovipara*. Inter *Vivipara*, alia, ut homo, corpus habent *Piloſum*, ſaltem in aliqua ſui parte, & *quatuor* donantur *Pedibus*, manibus & pedibus hominis reſpondentibus : alia verò corpus habent *nudum*, & *pilis* deſtitutum, *pinniſque carnoſis*, pedum loco, prædita ſunt.

In prima claſſe continentur ea quæ in *quinque* illis capitibus cum homine conveniunt ; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea* ; *pulmonibus* ſpirant ; *duobus* gaudent in corde *Ventriculis* ; *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt ; & corpus habent *piloſum*, ſaltem in aliqua ſui parte, & *quatuor* donantur *pedibus*, manibus & pedibus hominis reſpondentibus.

In ſecunda continentur ea, quæ in *quatuor* tantùm primis capitibus cum homine conveniunt ; id eſt, quæ, ſicut homo, ſunt *ſanguinea* ; *pulmonibus* ſpirant ; *duos* habent in corde *ventriculos* ; & *vivos* fœtus pariunt, eoſque

Digitized by Google

lacte alùnt: quæ verò ab homine discrepant in eo quod corpus habeant *nudum*, & *pilis* destitutum, *pinnisque carnosis*, pedum loco, prædita sint.

In tertia continentur ea, quæ in *tribus* tantùm primis capitibus cum homine conveniunt; id est, quæ, sicut homo, sunt *sanguinea*; *pulmonibus* spirant; & *duos* habent in corde *ventriculos*: quæ verò ab homine differunt in eo quod sint *ovipara*.

In quarta continentur ea, quæ in duobus tantùm primis capitibus cum homine conveniunt; id est, quæ, sicut homo, sunt *sanguinea*; & *pulmonibus* spirant: quæ verò ab homine discrepant in eo quod *unicum* habeant in corde *ventriculum*.

In quinta & sexta continentur ea, quæ in *primo* tantum capite cum homine conveniunt; id est, quæ, sicut homo, sunt *sanguinea*: quæ verò ab homine discrepant in eo quod *branchiis* spirent.

In tribus ultimis classibus continentur ea, quæ in nullis ex istis *quinque* capitibus cum homine conveniunt.

Dividitur ergò *regnum Animale* in classes novem.

In prima classe continentur Animalia, quæ corpus *alaittent* leurs petits: mais qui en différent en ce qu'ils ont le corps *nud* & sans *poil*, & en ce qu'aulieu de pieds, ils ont des *nageoires charnues*.

Dans la troisiéme sont ceux, qui n'ont avec l'homme que les *trois* premieres analogies; c'est-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *sang*; qu'ils respirent par des *poumons*; & qu'ils ont *deux ventricules* au cœur: mais qui est différent en ce qu'ils sont *ovipares*.

Dans la quatriéme sont ceux, qui n'ont avec l'homme que les *deux* premieres analogies; c'est-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *sang*; & qu'ils respirent par des *poumons*: mais qui en différent en ce qu'ils n'ont qu'*un ventricule* au cœur.

Dans la cinquiéme & la sixiéme, sont ceux qui n'ont avec l'homme que la *premiere* analogie; c'est-à-dire, qui conviennent avec l'homme en ce qu'ils ont du *sang*: mais qui en différent en ce qu'ils respirent par des *ouies*.

Les trois dernieres classes sont composées des Animaux qui n'ont avec l'homme aucune de ces *cinq* analogies.

Je divise donc le *regne Animal* en neuf classes.

La premiere comprend les Animaux qui ont du *poil*, au

Digitized by Google

moins à quelque partie du corps : & *quatre pieds*. Tous ceux-là, comme je l'ai dit ci-dessus, ont du *sang* : respirent par des *poumons* : ont *deux ventricules* au cœur : & leurs femelles sont *vivipares*, & *alaittent* leurs petits. On leur a donné le nom de QUADRUPEDES.

Dans la seconde classe sont les Animaux qui ont le corps *nud* & *allongé* : des *nageoires charnues* : & la queue *platte horizontalement*. Tous ceux-là, comme les précédents, ont du *sang* : respirent par des *poumons* : ont *deux ventricules* au cœur : & leurs femelles sont *vivipares*, & *alaittent* leurs petits. On les appelle CETACÉS. Ils vivent toûjours dans la mer.

Dans la troisiéme sont ceux, qui ont le corps couvert de *plumes* : un *bec* d'une matiere analogue à la *corne* : *deux ailes* : & *deux pieds*. Tous ceux-là ont du *sang* : respirent par des *poumons* : ont *deux ventricules* au cœur : & leurs femelles sont *ovipares*. On leur a donné le nom d'OISEAUX.

Dans la quatriéme sont ceux, qui ont, ou le corps *nud*, & *quatre pieds* : ou le corps couvert d'*écailles*, & *quatre pieds*, ou *point de pieds* : & qui respirent par des *poumons*. Tous ceux-là ont du *sang* : & n'ont qu'*un ventricule* au cœur. Quelques-unes

habent *pilosum*, saltem in aliqua sui parte : & *pedes quatuor*. Omnia ista, ut supra notavi, sunt *sanguinea* : *pulmonibus* spirant : *duobus* gaudent in corde *ventriculis* : eorumque fœminæ *vivos* fœtus pariunt, eosque *lacte* alunt. QUADRUPEDA vocantur.

In secunda classe continentur ea, quæ corpus habent *nudum* & *elongatum* : *pinnas carnosas* : & caudam *horizontaliter planam*. Omnia ista, sicut & præcedentia, sunt *sanguinea* : *pulmonibus* spirant : *duobus* gaudent in corde *ventriculis* : eorumque fœminæ *vivos* fœtus pariunt, eosque *lacte* alunt. CETACEA nominantur. Perpetuò in mari degunt.

In tertia continentur ea, quæ corpus habent *plumis* tectum : *rostrum corneum* : *alas duas* : & *pedes duos*. Omnia ista sunt sanguinea : *pulmonibus* spirant : *duos* habent in corde *ventriculos* : eorumque fœminæ sunt *oviparæ* : AVIUM nomine donantur.

In quarta continentur ea, quæ, vel habent corpus *nudum*, & *pedes quatuor* : vel corpus *squamosum*, & *pedes* vel *quatuor*, vel *nullos* : quæque *pulmonibus* spirant. Omnia ista sunt *sanguinea* : & *unico* in corde *ventriculo* donan-

Digitized by Google

tur. Horum fœminæ quædam ſunt *viviparæ*: aliæ ſunt *oviparæ*. Omnes tamen *ova* concipiunt, quorum incubatio fit intra corpus in quibuſdam fœminis; quæ idcircò *vivos* fœtus pariunt: in aliis verò fœminis incubatio fit extra corpus. Omnia hujus claſſis Animalia *repunt*; quamobrem ea REPTILIA vocavi.

In quinta continentur ea quæ *pinnas* habent *cartilagineas*: quæque per *foramina* ad *branchias* aperta ſpirant. Omnia hujus claſſis Animalia ſunt *ſanguinea*: & perpetuò in aqua vitam agunt. Ipſorum fœminæ quædam ſunt *viviparæ*; aliæ verò *oviparæ*. Omnes tamen *ova* concipiunt, quorum incubatio fit intrà corpus in quibuſdam fœminis, quæ deinde *vivos* fœtus pariunt: in aliis verò fœminis incubatio fit extra corpus. PISCES CARTILAGINEI vocantur.

In ſexta continentur ea, quæ *pinnas* habent *oſſiculis conſtantes*: quæque *branchiis tegmine mobili, partibus oſſeis conſtante*, coopertis ſpirant. Omnia iſta, ſicut & præcedentia, ſunt *ſanguinea*; perpetuoque in aqua degunt. Fœminæ eorum fere omnes ſunt *oviparæ*. *Ova* concipiunt valde exigua, quæ gallice

de leurs femelles ſont *vivipares*: les autres ſont *ovipares*. Toutes cependant ont des *œufs*; mais dans quelques-unes l'incubation ſe fait dans le corps de l'Animal, qui fait enſuite ſes petits *vivants*; & dans d'autres l'incubation ſe fait hors du corps. Tous les Animaux de cette claſſe *rampent*; c'eſt pourquoi je leur ai donné le nom de REPTILES.

Dans la cinquiéme ſont ceux qui ont des *nageoires cartilagineuſes*: & qui reſpirent par des *ouies*, vis-à-vis deſquelles ſont ouverts des *trous*. Tous les Animaux de cette claſſe ont du *ſang*: & vivent toujours dans l'eau. Quelques-unes de leurs femelles ſont *vivipares*: les autres ſont *ovipares*. Toutes cependant ont des *œufs*, dont l'incubation ſe fait dans quelques-unes dans le corps de l'Animal, qui fait enſuite ſes petits *vivants*; & dans d'autres l'incubation ſe fait hors du corps. On les appelle POISSONS CARTILAGINEUX.

Dans la ſixiéme ſont ceux qui ont des *nageoires compoſées d'oſſelets*: & qui reſpirent par des *ouies* ſur leſquelles ſont des *couvercles mobiles, compoſez de parties oſſeuſes*. Tous ceux-là, comme les précédents, ont du *ſang*: & vivent toujours dans l'eau. Preſque toutes leurs femelles ſont *ovipares*. Elles ont des *œufs* extrêmement petits, auxquels

on a donné le nom de *frais*. J'appelle les Animaux de cette classe POISSONS PROPREMENT DITS.

Dans la septiéme sont ceux qui ont des *antennes* à la tête & au moins *huit pieds*. Leur corps est couvert d'une enveloppe qui se *renouvelle*, c'est-à-dire, que, lorsque, par l'accroissement du corps de l'Animal, elle est devenue trop petite pour le contenir, elle se détache naturellement du corps, sur lequel il s'en est produit une nouvelle. C'est ce qu'on appelle *changer de peau*. On appelle les Animaux de cette classe CRUSTACÉS.

La huitiéme classe comprend tous les Animaux, qui subissent plusieurs *méthamorphoses* avant d'être parvenus à leur accroissement parfait; c'est-à-dire, qui naissent sous une forme différente de celle qu'ils doivent avoir dans la suite. Ce n'est qu'après avoir subi la derniere *méthamorphose* qu'ils sont en état de multiplier leur espéce. Tous ces animaux ont, avant leur derniere *méthamorphose*, *plusieurs stigmates*, ou organes de la respiration; & après leur derniere *méthamorphose*, ils ont des *antennes* à la tête; toujours *six pieds*, & jamais d'avantage. Ils changent de peau, comme les CRUTACÉS. Ces changemens ne se font dans le plus grand nom-

frais vocantur. Hujus classis Animalia PISCES PROPRIE DICTOS nominavi.

In septima continentur ea, quæ caput habent *antennis* instructum: & *pedes octo*, & ultra. Corpus ipsorum tegitur tegmine *mutabili*; id est, tegmine, quod, cùm, incremento corporis, ad illud continendum fit strictius, naturaliter à corpore avellitur, supra quod corpus novum producitur tegmen: quod gallicè dicitur, *changer de peau*. Hujus classis Animalia CRUSTACEA vocantur.

In octava continentur omnia Animalia, quæ, antequam perveniant, ad ultimum incrementum, diversas *formas* induunt; id est, quæ sub unâ nascuntur formâ, diversâ ab illis quas postea induere debent. Speciem suam multiplicare nequeunt, nisi post ultimam *méthamorphosim*, post ultimam *formam* indutam. Omnia ista Animalia ante ultimam *méthamorphosim*, *plura* habent *stigmata*, aut respirationis organa: & post ultimam *méthamorphosim*, caput habent *antennis* instructum: & *pedes sex*, nec ultra. Tegmen habent *mutabile*, sicut & CRUSTACEA: attamen fere omnia tegmine

Digitized by Google

non mutant, nisi ante ultimam *formam* indutam : pauca verò sunt quæ post ultimam *méthamorphosim* tegmine mutent. Sola ista Animalia INSECTORUM nomine donavi.

In nona & ultima classe continentur Animalia, quæ corpus habent *retractibile*, aut saltem corporis aliquam partem *retractibilem*; id est, quorum corpus, aut saltem corporis aliqua pars sponte contrahi, aut extendi potest : quæque nec *antennas* habent, nec *pedes*, nec *stigmata*. Hujus classis Animalia VERMES dicuntur.

Dans la neuviéme & derniere classe sont tous les Animaux qui ont le corps, ou du moins quelque partie du corps, *capable d'un mouvement de contraction & d'extension ;* de sorte que ce corps, ou cette partie du corps peut occuper plus ou moins d'espace à volonté : & qui n'ont ni *antennes*, ni *pieds*, ni *stigmates*. On a donné à ces Animaux le nom de VERS.

CLASSIUM characteres.

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

Horum character est
Corpus pilosum, saltem in aliqua sui parte :
Et pedes quatuor.

CLASSIS II.

CETACEA.

Horum character est
Corpus nudum & elongatum :
Pinnæ carnosæ :
Cauda Horizontaliter plana.

CARACTERES des différentes Classes.

CLASSE I.

LES QUADRUPEDES.

Leur caractere est
D'avoir du poil au moins à quelque partie du corps :
Et quatre pieds.

CLASSE II.

LES CETACÉS.

Leur caractere est
D'avoir le corps nud & allongé :
Des nageoires charnues :
Et la queue platte horizontalement.

Digitized by Google

CLASSE III.

LES OISEAUX.

Leur caractere eſt
D'avoir le corps couvert de plumes:
Un bec d'une matiere analogue à la corne:
Deux aîles:
Et deux pieds.

CLASSIS III.

AVES.

Harum character eſt
Corpus plumis tectum:
Roſtrum corneum:
Alæ duæ:
Pedes duo.

CLASSE IV.

LES REPTILES.

Leur caractere eſt d'avoir
Ou le corps nud:
Et quatre pieds;
Ou le corps couvert d'écailles:
Et quatre pieds, ou point de pieds;
Et de reſpirer par des poumons.

CLASSIS IV.

REPTILIA.

Horum character eſt
Vel corpus nudum:
Et pedes quatuor;
Vel corpus ſquamoſum:
Et pedes vel quatuor, vel nulli;
Et pulmonibus ſpirare.

CLASSE V.

LES POISSONS Cartilagineux.

Leur caractere eſt
D'avoir des nageoires cartilagineuſes:
Et de reſpirer par des ouies, vis-à-vis deſquelles ſont ouverts des trous.

CLASSIS V.

PISCES Cartilaginei.

Horum character eſt
Pinnæ cartilagineæ:
Et per foramina ad branchias aperta ſpirare.

CLASSE VI.

LES POISSONS proprement dits.

Leur caractere eſt
D'avoir des nageoires compoſées d'oſſelets:

CLASSIS VI.

PISCES proprie dicti.

Horum character eſt
Pinnæ oſſiculis conſtantes:

Et

Et branchiis, tegmine mobili, partibus osseis constante, coopertis spirare.

Et de respirer par des ouies sur lesquelles sont des couvercles mobiles, composés de parties osseuses.

CLASSIS VII.

CRUSTACEA.

Horum character est
Caput antennis instructum:
Et pedes octo & ultra.

CLASSE VII.

LES CRUSTACÉES.

Leur caractere est
D'avoir des antennes à la tête:
Et au moins huit pieds.

CLASSIS VIII.

INSECTA.

Horum character est
Ante ultimam methamorphosim, plura stigmata, aut respirationis organa;

Et post ultimam methamorphosim,
Caput antennis instructum:
Et pedes sex.

CLASSE VIII.

LES INSECTES.

Leur caractere est
D'avoir, avant leur derniere méthamorphose, plusieurs stigmates, ou organes de la respiration;
Et après leur derniere méthamorphose,
Des antennes à la tête:
Et six pieds.

CLASSIS IX.

VERMES.

Horum character est
Corpus retractibile, aut saltem corporis aliqua pars retractibilis:

Nec antennæ:
Nec pedes:
Nec stigmata.

CLASSE IX.

LES VERS.

Leur caractere est
D'avoir le corps, ou du moins quelque partie du corps capable d'un mouvement de contraction & d'extension:
Et de n'avoir ni antennes:
Ni pieds:
Ni stigmates.

Digitized by Google

Digitized by Google

CLASSE I.

LES QUADRUPEDES.

CLASSIS I.

QUADRUPEDA.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUS AUTHORUM.

ALDRO. Avi. ... Uliſſis Aldrovandi Philoſophi ac Medici Bononienſis Hiſtoriam Naturalem in gymnaſio Bononienſi profitentis, Ornithologia; hoc eſt, de Avibus hiſt. libri XII. Bononiæ 1599. in-folio.

Aldro. Piſc. .... Uliſſis Aldrovandi Philoſophi ac Medici Bononienſis de Piſcibus libri V, & de Cetis liber 1. &c. Bononiæ 1638, in-folio.

Aldro. Quadr. biſ. .... Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis, Quadrupedum omnium Biſulcorum Hiſtoria, &c. Bononiæ 1642, in-folio.

Aldro. Quadr. dig. ovi. .... Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis de Quadrupedibus digitatis oviparis, libri II, &c. Bononiæ 1645, in-folio.

Aldro. Quadr. dig. viv. .... Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis de Quadrupedibus digitatis viviparis, libri tres &c. Bononiæ 1645, in-folio.

Aldro. Quadr. ſolid. .... Uliſſis Aldrovandi Patricii Bononienſis de Quadrupedibus ſolidipedibus volumen integrum, &c. Bononiæ 1639, in-folio.

Art. Gen. Piſc. .... Petri Artedi Sueci genera Piſcium, in quibus ſyſthema totum Ichtyologiæ proponitur, cum claſſibus, ordinibus, generum characteribus, ſpecierum differentiis, obſervationibus plurimis, &c. Ichtyologiæ pars III. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.

Art. ſynon. Piſc .... Petri Artedi Angermannia-ſueci ſynonimia nominum Piſcium fere omnium; in qua recentio fit nominum Piſcium, omnium facile authorum, qui unquam de Piſcibus ſcripſere: uti Græcorum, &c. Ichtyologiæ pars IV. Lugduni Batavorum 1738, in-octavo.

Barr. Hiſt. Fr. eq. .... Eſſai ſur l'Hiſtoire Naturelle de la France équinoxiale, ou dénombrement des plantes, des Animaux, &c. Par Pierre Barrere, correſpondant de l'Académie des Sciences de Paris, &c. A Paris 1741, in-12.

Bell. de Aquat .... Petri Bellonii Cenomani de Aquatilibus libri duo, &c. Pariſiis 1553, in-octavo. Oblong.

Bell. obſ. .... Petri Bellonii Cenomani plurimarum ſingularium & memorabilium rerum in Græcia, &c. Obſervationes tribus libris expreſſæ, &c. Raphelengii 1605, in-folio.

Bont Ind ori. .... Jacobi Bontii, Medici civitatis Bataviæ novæ in Java ordinarii Hiſtoriæ Naturalis & medicæ Indiæ orientalis libri ſex, &c. A Guilelmo Piſone, in ordinem redacti, &c. Amſtelodami 1658, in-folio.

Cat .... Hiſtoire Naturelle de la Caroline, la Floride, & les Iſles Bahama, contenant les deſſeins des Oiſeaux, Animaux, &c. Par Marc Cateſby, de la Société Royale. Londres 1743, in-folio.

Charlet. exer .... Gualteri Charletoni exercitationes, de differentiis & nominibus Animalium, &c. Oxoniæ 1677, in folio.

Cluſ. exot ..., Caroli Cluſii Atrebatis, Aulæ Cæſareæ quondam familiaris; exoticorum libri decem, &c. Raphelengii 1605, in folio.

Colum. aquat .... Aquatilium & terreſtrium aliquot Animalium aliarumque naturalium rerum obſervationes, Fabio Columna authore. Romæ 1616, in-quarto.

Des March. .... Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, Iſles voiſines & à Cayenne, fait en 1725, 1726 & 1727, &c. A Paris 1730, in-12. 4 vol.

Edwards. .... Hiſtoire Naturelle de divers Oiſeaux qui n'avoient point encore été figurés ni décrits, &c. Par George Edwards; traduit de l'Anglois, par M. D. de la S. R. A Londres 1745, in-quarto.

Euſ Nieremb. .... Joannis Euſebii Nierembergii Madritenſis, ex Societate Jeſu, in Academia Regia Madritenſi; Phyſiologiæ Profeſſoris, Hiſtoria Naturæ maximè peregrinæ libris XVI. diſtincta. Antuerpiæ 1635, in-folio.

Digitized by Google

Faun. Suec. Linn. .... Caroli Linnæi Medic. & Botan. Prof. Upſal. horti Academici Præfect. Acad. Imperial. Monſpelienſ. Stockolm. Upſal. Soc. hujuſque Secretar. Fauna Suecica, ſiſtens Animalia ſuecize regni, &c. Stockolmiæ 1746, in-octavo.

Fern. Hiſt. N. Hiſp. .... Hiſtoriæ Animalium & Mineralium Novæ Hiſpaniæ liber unicus, in ſex tractatus diviſus, Franciſco Fernandez, Philippi ſecundi primario Medico Authore.

Flor. Sin. .... Flora Sinenſis à P. Michaële Boym, Soc. Jeſu, 1656.

Gaz. Pet. .... Gazophilacii naturæ, & artis decades à Jacobo Petiver Pharmacop. Londin, & Regiæ Societatis ſocio. in-folio.

Gaz. Rup. Beſl. .... Gazophilacium rerum naturalium è regno vegetabili, Animali & minerali depromptarum, &c. Opera Michaelis Ruperti Beſleri. Lipſiæ & Francofurti 1716, in-folio.

Geſn. Avi. .... Conradi Geſneri Tigurini, Medicinæ & Philoſophiæ Profeſſoris in ſchola Tigurina, Hiſtoriæ Animalium liber III, qui eſt de Avium natura. Francofurti. 1585, in-folio.

Geſn. Icon. Aquat. .... Icones Animalium Aquatilium in mari & dulcibus aquis degentium, &c. Tiguri 1560, in-folio.

Geſn. Icon. Avi. .... Icones Avium omnium, quæ in Hiſtoria Conradi Geſneri deſcribuntur, &c. Editio ſecunda. Tiguri 1560, in-folio.

Geſn. Icon. Quadr. .... Icones Animalium Quadrupedum viviparorum & oviparorum, &c. Editio ſecunda. Tiguri 1560, in-folio.

Geſn. Piſc. .... Conradi Geſneri Medici Tigurini, Hiſtoriæ Animalium liber IV, qui eſt de Piſcium & Aquatilium animantium natura. Tiguri 1558, in-folio.

Geſn. Quadr. .... Conradi Geſneri Medici Tigurini, Hiſtoriæ Animalium lib. I. de Quadrupedibus viviparis. Tiguri 1554, in-folio.

Hernand. Hiſt. Mex. .... Nova Plantarum, Animalium, & Mineralium Mexicanorum hiſtoria, à Franciſco Hernandez, Medico, in Indûs præſtantiſſimo, primùm compilata, dein à Nardo Antonio Recchio in volumen digeſta; &c. Romæ 1651, in-folio.

Hiſt. de l'Acad. .... Hiſtoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris, in-quarto.

Hiſt d'Iſl. & de Gro. .... Hiſtoire Naturelle de l'Iſlande, du Groenland, du détroit de Davis & d'autres pays ſitués ſur le Nord; traduite de l'Allemand, par M. Anderſon, &c. A Paris 1750, in-12. 2 vol.

Hiſt. Nat. Gen. & Part. .... Hiſtoire Naturelle Générale & Particuliere, avec la deſcription du Cabinet du Roi. A Paris, in-quarto & in-12.

Jo. de Laet. .... Novus orbis, ſeu deſcriptionis Indiæ Occidentalis libri 18. Authore Joanne de Laet Antuerp. &c. Lugduni Batavorum 1633, in-folio.

Jonſt. Avi. .... Hiſtoriæ Naturalis de Avibus libri VI. cum æneis figuris, à Joanne Jonſtono Medicinæ Doctor. Amſtelodami 1657, in-folio.

Jonſt. Piſc. .... Hiſtoriæ Naturalis de Piſcibus & Cetis libri V. cum æneis figuris, à Joanne Jonſtono Medicinæ Doctor. Amſtelodami 1657, in-folio.

Jonſt. Quadr. .... Hiſtoriæ Naturalis de Quadrupedibus libri cum æneis figuris, à Joanne Jonſtono, Medicinæ Doctor. Amſtelodami 1657, in-folio.

Klein. Quadr. .... Jacobi Theodori Klein, Secr. Civ. Ged. Soc. Reg. Lond. & Acad. Scient. Bonon. Membri, Quadrupedum diſpoſitio, breviſque Hiſtoria Naturalis. Lipſiæ 1751, in quarto.

Kæmpf. Amæn. .... Amœnitatum exoticarum Politico-Phiſico-Medicarum faſciculi V, &c. Auctore Engelberto Kæmpfero. Lemgoviæ 1712, in-quarto.

Kolbe. .... Deſcription du Cap de Bonne-Eſperance, où l'on trouve tout ce qui concerne l'Hiſtoire Naturelle du pays, &c. Tirée des Mémoires de M. Pierre Kolbe, Maître ès Arts. A Amſterdam 1741, in-12.

Linn. Syſt. Nat. ed. 6. .... Caroli Linnæi Archiatr. Reg. Med. & Bot. Profeſſ. Upſal. Syſthema Naturæ, ſiſtens regna tria naturæ in claſſes & ordines genera & ſpecies redacta, Tabuliſque æneis illuſtrata. Editio ſexta. Stockolmiæ 1748. in-octavo.

Digitized by Google

Marcgr. Hiſt. Br..... Georgi Marcgravii de Liebſtad, Miſnici Germani, Hiſtoriæ rerum naturalium libri octo. in-folio.

Muſ. Beſl..... Rariora Muſei Beſleriani, quæ olim Baſilius & Michael Rupertus Beſlerus collegerunt, &c. Illuſtrata à Joanne Henrico Lochnero, &c. 1716, in-folio.

Muſ Worm..... Muſeum Wormianum, ſeu Hiſtoria rerum rariorum tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm, Med. Doct. &c. Amſtelodami 1655, in-folio.

Piſon. Hiſt. Nat..... Gulielmi Piſonis Medici Amſtelodamenſis, Hiſtoriæ Naturalis & Medicæ Indiæ Occidentalis, &c. Libri quinque. Amſtelodami. 1658, in-folio.

Proſp. Alp. Ægypt..... Proſperi Alpini Maroſticenſis Philoſophi, Medici, &c. Hiſtoria Ægypti naturalis, &c. Lugduni Batavorum. 1735, in-quarto.

Raj. Syn. Quadr..... Synopſis Methodica Animalium Quadrupedum, & Serpentini Generis, &c. Authore Joanne Rajo. Londini. 1693, in-octavo.

Rzac. Auct..... Auctuarium hiſtoriæ naturalis curioſæ Regni Poloniæ, Magni Ducatûs Lithuaniæ, annexarumque Provinciarum, per P. Gabrielem Rzaczynſki, Soc. Jeſu Concinnatum, &c. Gedani. 1745, in-quarto.

Rzac. Hiſt. Nat. Pol..... Hiſtoria naturalis curioſa Regni Poloniæ, Magni ducatûs Lituaniæ, annexarumque Provinciarum, in Tractatus XX. diviſa, &c. à P. Gabriele Rzaczynski, Soc. Jeſu. Sandomiviæ. 1721, in-quarto.

Seb..... Locupletiſſimi rerum naturalium Theſauri accurata deſcriptio, & iconibus artificioſiſſimis expreſſio, &c. Ex toto terrarum orbe collegit, digeſſit, deſcripſit, & depingendum curavit Albertus Seba, &c. Amſtelaedami. 1734, in-folio. 2 vol.

Sloane..... A voyage To The Iſlands, Madera, Barbadoes, Nieves, S. Chriſtophers, And Jamaica; With The Natural Hiſtory, &c. by ſir Hims Sloane, Bart. London. 1725, in folio.

Tranſ. Phil..... Tranſactions philoſophiques de la Société Royale de Londres, traduites par M. de Bremond. A Paris. in-quarto.

Voy. de la B. de Hud..... Voyage de la Baye de Hudſon, fait en 1746 & 1747, pour la découverte du paſſage de Nord-Oueſt, &c. Traduit de l'Anglois de M. Henry Ellis, &c. A Paris 1749. in-12. 2 vol.

Voy du Lev..... Relation d'un voyage du Levant, &c. Par M. Pitton de Tournefort &c. A Paris. 1717, in-quarto. 2 vol.

Digitized by Google

CLASSE I.

Digitized by Google

CLASSIS I.
QUADRUPEDA.

HORUM character eſt Corpus piloſum, ſaltem in aliqua ſui parte: Et pedes quatuor.

Omnia QUADRUPEDA ſunt *ſanguinea : pulmonibus* ſpirant: *duos* habent in corde *ventriculos :* eorumque fœminæ *vivos* fœtus pariunt, eoſque *lacte* alunt.

Quædam ſunt edentula, ut *Myrmecophaga*, &c: Alia omnia ſunt dentata. Inter dentata, alia dentes habent tantummodò *molares* (1), ut *Tardigradus*, &c. Alia dentes *molares* & *caninos*

(1) *Dentes molares* vocantur iſti, qui poſteriorem Maxillæ partem occupant.

CLASSE I.
LES QUADRUPEDES.

LEUR caractere eſt D'avoir du poil, au moins à quelque partie du corps: Et quatre pieds.

Tous les QUADRUPEDES ont du *ſang* : reſpirent par des *poumons :* ont *deux ventricules* au cœur : & leurs femelles ſont *vivipares* & *alaittent* leurs petits.

Quelques-uns n'ont point du tout de dents, comme le *Fourmiller*, &c. Le plus grand nombre en eſt muni. De ces derniers les uns n'ont que des dents *molaires* (1), comme le *Pareſſeux*, &c : d'autres n'en ont que des

(1) On appelle *dents molaires*, celles qui ſont placées à la partie poſtérieure de la mâchoire.

Digitized by Google

molaires & des *canines* (1), comme l'*Elephant* &c: d'autres enfin en ont des *inciſives* (2). Parmi ceux-ci, les uns n'ont des dents *inciſives* qu'à la mâchoire inférieure ſeulement: & les autres en ont aux deux mâchoires. De ceux qui n'ont des dents *inciſives* qu'à la machoire inferieure, les uns n'en ont que ſix, comme le *Chameau*: les autres en ont huit, comme le *Bœuf*, le *Cerf*, &c. Parmi ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires, les uns ont la corne du pied d'*une ſeule piece*, comme le *Cheval*: d'autres ont le *pied fourchu* (3), comme le *Cochon*: d'autres ont trois doigts *ongulés* (4) à chaque pied, comme le *Rhinoceros*: d'autres ont quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere: & de ces derniers, les uns n'ont que

(1) On appelle *dents canines*, celles qui ſont placées entre les *molaires* & les *inciſives*. Elles ſont ordinairement pointues.

(2) On appelle *dents inciſives* celles qui ſont placées à la partie antérieure de la mâchoire.

(3) On appelle *pieds fourchus* ceux qui ont quatre doigts *ongulez*, & qui ne s'appuyent que ſur deux en marchant.

(4) On appelle *doigts ongulez* ceux dont l'extrémité eſt toute entourée de l'ongle, & qui, en marchant s'appuyent ſur l'ongle même.

(1), ut *Elephas*, &c. alia denique dentes habent *inciſores* (2). Horum ultimorum alia dentes habent *inciſores* in maxilla inferiore tantùm: alia in maxilla utraque. Inter prima iſta, alia dentes habent *inciſores* in maxilla inferiore ſex, ut *Camelus*: alia dentes habent *inciſores* in maxilla inferiore octo, ut *Bos*, *Cervus*, &c. Horum quæ dentes habent *inciſores* in maxilla utraque, alia pedibus *ſolidungulis* (3) donantur, ut *Equus*: alia pedibus *biſulcis* (4), ut *Sus*: alia pedibus *terungulatis* (5) anticè & poſticè, ut *Rhinoceros*: alia pedibus *quaterungulatis* anticè, *terungulatis* poſticè: inter quæ alia dentes habent *inciſores* in utraque maxilla duo tantùm, ut *Hydrochærus*:

(1) *Dentes canini* dicuntur, qui *molares* inter & *inciſores* ſiti ſunt. Hi communiter ſunt acuti.

(2) *Dentes inciſores* nuncupantur, qui anteriorem maxillæ partem obtinent.

(3) *Pedes ſolidungui* ſunt iſti, quorum extremitas *ungulâ* ſolidâ undique circumdatur.

(4) *Pedes biſulci* dicuntur, qui quatuor habent digitos *ungulatos*, quique duobus tantum digitis incedunt.

(5) *Pedes angulati* vocantur illi, quorum extremitas digitorum *ungulâ* nudique circumdatur, quique unguli ipſis incedunt.

Digitized by Google

alia verò decem habent dentes *incisores* in utraque maxilla, ut *Tapirus* : alia pedibus donantur *quaterungulatis* antice & postice, ut *Hippopotamus* : alia tandem digitis *unguiculatis* (1) prædita sunt. Inter illa quæ digitos habent *unguiculatos*, alia dentes habent *incisores* in utraque Maxilla duo tantùm, ut *Hystrix*, *Lepus*, *Mus*, &c : alia dentes *incisores* in utraque Maxilla quatuor, ut *Simia* &c : alia dentes *incisores* in maxilla superiore quatuor, in inferiore sex, ut *Prosimia* &c : alia dentes *incisores* in Maxilla superiore sex, in inferiore quatuor, ut *Phoca* : alia dentes *incisores* in utraque maxilla sex, ut *Canis*, *Felis*, *Lutra*, &c : alia dentes *incisores* in maxilla superiore sex, in inferiore octo, ut *Talpa* : alia denique dentes *incisores* in maxilla superiore decem: in inferiore octo, ut *Philander*.

deux dents *incisives* à chaque mâchoire, comme le *Cabiai* : & les autres en ont dix à chaque mâchoire, comme le *Tapir* ou *Manipouris* : d'autres ont quatre doigts *ongulés* à chaque pied, comme l'*Hippopotame* : d'autres enfin ont les doigts *onguiculés* (1). Parmi ceux qui ont les doigts *onguiculés*, les uns n'ont que deux dents *incisives* à chaque machoire, comme le *Porc-Epic*, *le Lievre*, *le Rat*, &c : d'autres ont quatre dents *incisives* à chaque machoire, comme le *Singe*, &c : d'autres en ont quatre à la mâchoire supérieure, & six à l'inferieure, comme le *Maki*, &c : d'autres en ont six à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inferieure, comme le *Phocas* : d'autres en ont six à chaque mâchoire, comme le *Chien*, le *Chat*, la *Loutre*, &c : d'autres en ont six à la mâchoire supérieure, & huit à l'inferieure, comme la *Taupe* : d'autres enfin en ont dix à la mâchoire supérieure, & huit à l'inferieure, comme le *Philandre*.

In decem & octo ordines dividuntur.

Je les divise en dix-huit Ordres.

(1) *Digiti unguiculati* isti sunt, quorum extremitas ungue cooperta est in parte superiore, & nuda, aut pilis tantummodò tecta, in parte inferiore.

(1) On appelle *doigts onguiculez* ceux dont l'extrémité est couverte de l'ongle dans la partie supérieure, & nue, ou seulement couverte de poils dans la partie inferieure.

Digitized by Google

Dans le premier ſont compris ceux qui n'ont point de dents.

Dans le ſecond, ceux qui n'ont que des dents *molaires*.

Dans le troiſiéme, ceux qui n'ont que des dents *canines*, & des dents *molaires*.

Dans le quatriéme, ceux qui n'ont point de dents *inciſives* à la machoire ſupérieure, & qui en ont ſix à l'inferieure. Tous ceux-là ſont *ruminants*, & ont à chaque pied deux doigts *onguicules*.

Dans le cinquiéme, ceux qui n'ont point de dents *inciſives* à la mâchoire ſupérieure, & qui en ont huit à l'inferieure. Tous ceux-là ſont *ruminants* & ont le *pied fourchu*.

Dans le ſixiéme, ceux qui ont des detns *inciſives* aux deux mâchoires; & la corne du pied d'*une ſeule piece*.

Dans le ſeptiéme, ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires; & le *pied fourchu*.

Dans le huitiéme, ceux qui ont des dents *inciſives* aux deux mâchoires; & trois doigts *ongulés* à chaque pied.

Dans le neuviéme, ceux qui ont deux dents *inciſives* à chaque mâchoire; & quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Dans le dixiéme, ceux qui

In primo Ordine continentur ea quæ ſunt edentula.

In ſecundo, ea quæ dentes tantùm *molares* habent.

In tertio, ea quæ dentes habent tantummodó *molares* & *caninos*.

In quarto, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore nullos, in inferiore ſex: quæ omnia ſunt *ruminantia*, & duobus digitis *unguiculatis* in ſingulis pedibus donantur.

In quinto, ea quæ dentes habent *inciſores* in maxilla ſuperiore nullos, in inferiore octo. Omnia iſta ſunt *ruminantia*, & pedibus *biſulcis* donantur.

In ſexto, ea quæ dentes *inciſores* in utraque maxilla; & pedes *ſolidungulos* habent.

In ſeptimo, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla; & pedibus *biſulcis* donantur.

In octavo, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla; & digitos tres *ungulatos* in ſingulis pedibus.

In nono, ea quæ dentes habent *inciſores* in utraque maxilla duo; & digitos *ungulatos* quatuor in pedibus anticis, & tres in poſticis.

In decimo, ea quæ dentes ha-

Digitized by Google

bent *incisores* in utraque maxilla decem; & digitis *ungulatis* quatuor in pedibus anticis, & tribus in posticis donantur.

In undecimo, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla; & digitos *ungulatos* quatuor in singulis pedibus.

In duodecimo, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla duo; & digitis *unguiculatis* prædita sunt.

In decimo tertio, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla quatuor, & digitis donantur *unguiculatis*.

In decimo quarto, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore quatuor, in inferiore sex; & digitis *unguiculatis* donantur.

In decimo quinto, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore sex, in inferiore quatuor; & digitis *unguiculatis* prædita sunt.

In decimo sexto, ea quæ dentes habent *incisores* in utraque maxilla sex; & digitis *unguiculatis* donantur.

In decimo septimo, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore sex, in inferiore octo; & digitis donantur *unguiculatis*.

In decimo octavo & ultimo, ea quæ dentes habent *incisores* in maxilla superiore

ont dix dents *incisives* à chaque mâchoire; & quatre doigts *ongulés* aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Dans le onziéme, ceux qui ont des dents *incisives* aux deux mâchoires; & quatre doigts *ungulés* à chaque pied.

Dans le douziéme, ceux qui ont deux dents *incisives* à chaque mâchoire; & les doigts *onguiculés*.

Dans le treiziéme, ceux qui ont quatre dents *incisives* à chaque mâchoire; & les doigts *onguiculés*.

Dans le quatorziéme, ceux qui ont quatre dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & six à l'inferieure; & les doigts *onguiculés*.

Dans le quinziéme, ceux qui ont six dents *incisives* à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inferieure; & les doigts *onguiculés*.

Dans le seiziéme, ceux qui ont six dents *incisives* à chaque mâchoire; & les doigts *onguiculés*.

Dans le dix-septiéme, ceux qui ont six dents *incisives* à la machoire supérieure, & huit à l'inferieure; & les doigts *onguiculés*.

Dans le dix-huitiéme & dernier, ceux qui ont dix dents *incisives* à la mâchoire

ſupérieure, & huit à l'inférieure ; & les doigts *onguiculés*.

decem, in inferiore octo; & digitis *unguiculatis* prædita ſunt.

Digitized by Google

TABLE Ordres, Sections & Genres.

LES QUADRUPEDES
- N'ont point de dents. . .
  - Et le corps couvert de
  - Et le corps couvert d'é
- Ont des dents.
  - Des dents molaires ſe
    - Et le corps couvert
    - Et le corps couvert *nadille.* 4. . . *Section* II.
  - Des dents molaires & c
    - A la mâchoire ſupér courbées en enhaut ; une trompe très longue &
    - A la mâchoire ſupé courbées en enbas ; point de trompe. . .
      - Tous les doig . . *Section* I.
      - Les doigts d membrane, étendue en aîles. . . *La Rouſſete.*
      - Quatre dents incieure. . . ORDRE XIV.
        - Tous les doi . . *Section* I.
        - Les doigts d membrane, étendue en aîles. . . *La Chauve-*
      - Six dents inciſiveure. . . *Le Phocas.* 33. . . ORDRE XV.
      - Six dents inciſiv
        - Les doigts ſe
          - Quatre doriere. . . *L'Hyene.* 34.
          - Cinq doigterriere. . . *Le Chien.* 35.
          - Cinq doig
            - Le pou6.
            - Le pou 37.
          - Les pieds *L'Ours.* 38.
          - Les ongleſement cachés. . . *Le Chat.* 39.
        - Les doigts jotre. 40. . . *Section* II.
      - Six dents inciſivure. . . *La Taupe.* 41. . . ORDRE VII.
      - Dix dents inciſive. . . *Le Philandre.* 42. . . ORDRE VIII.

Digitized by Google

Digitized by Google

ORDO I.

QUADRUPEDA

Edentula.

HUJUS ordinis QUADRUPEDUM alia sunt corpore *pilis* tecto ; alia corpore *squamis* magnis, pilis quibusdam intermixtis tecto. Ratione tegminis dividuntur in duas Sectiones ; in unaquaque est unicum Genus. Prima continet ea quorum corpus *pilis* tegitur, quæ formicis vescuntur, quæque ideo *Myrmecophagarum* nomine donantur. Secunda, ea quorum *squamæ* magnæ, pilis quibusdam intermixtis, corpus cooperiunt, quæque ideo *Pholidoti* nomine prædita sunt.

Obs. Omnia hujus Ordinis QUADRUPEDA linguâ cilindraceâ, longissimâ, quamque, *Picorum avium* modo, longissimè extrà orem exserunt, donantur. Ope hujus linguæ formicas, quibus vescuntur, arripiunt.

ORDRE I.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents.

PARMI les QUADRUPEDES de cet ordre, les uns ont le corps couvert de *poils*, & les autres l'ont couvert de grandes *écailles*, sous la plûpart desquelles sont quelques poils. Cette différence d'habillement me les fait diviser en deux Sections, qui contiendront chacune un Genre. Dans la premiere sont ceux qui ont le corps couvert de *poils*, qui se nourrissent de Fourmis, & qu'on a appellé pour cela *Fourmillers*. La seconde contient ceux qui ont le corps couvert d'*écailles*, auxquels je donne le nom de *Pholidote*.

Obs. Tous les QUADRUPEDES de cet Ordre ont la langue cilindrique & très-longue, & peuvent, comme les *Pics*, la faire sortir en grande partie hors de la bouche. C'est par son moyen qu'ils attrapent les fourmis, dont ils se nourrissent.

Digitized by Google

SECTION I.

Ceux qui ont le corps couvert de poils.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, qui eſt celui des *Fourmillers*.

I.

Le Genre du Fourmiller.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents :
D'avoir le corps couvert de poils.

Obſ. Parmi les QUADRUPÉDES de ce genre les uns ont le muſeau fort allongé ; d'autres l'ont beaucoup plus court. Tous ont la bouche petite.

SECTIO I.

Ea quæ ſunt corpore piloſo.

IN illâ Sectione unicum continetur Genus, ſcilicet *Myrmecophagarum*.

I.

Genus Myrmecophagæ.

Hujus character eſt
Dentes nulli :
Corpus piloſum.

Obſ Hujus generis QUADRUPEDUM alia ſunt roſtro longiſſimo ; alia roſtro multò breviori. Omnibus os parvum.

** 1. LE FOURMILLER TAMANOIR.

Myrmecophaga roſtro longiſſimo, pedibus anticis tetradactylis, poſticis pentadactylis, caudâ longiſſimis pilis veſtitâ.... MYRMECOPHAGA TAMANOIR dicta.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 15. ſp. 1.*

Tamandua-Guacu ; i. e. Myrmecophaga omnium maxima. *Klein. Quadr. p. 45. n°. 1. Fig. T. 3.* (*Fig. malâ*) *peccat in eo quod caput & collum nimis elongata ſunt, & roſtrum informe* (a).

Myrmecophaga, ſive Tamendoa. *Euſ. Nieremb. p.* 190.

Tamandua-guacu Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 241.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 225. (*Fig. bona*).
Charlet. exerci. p. 17.

Tamandua-Guacu. *Jonſt. Quadr. p. 95. Fig. T. 62.* (*Fig. bona*).

(a) M. Klein a confondu cette eſpéce avec celle dont Seba a donné la Figure Tom. 1. Pl. 40. Fig. 1. ſous le nom de *Tamandua-Guacu du Bréſil*, qui eſt la troiſiéme eſpéce de ce genre.

(a) Dom. Klein, ſpeciem iſtam eamdem eſſe putavit quam Seba delineavit Vol. 1. T. 40. Fig. 1. ſub iſto nomine *Tamandua-Guacu Braſilienſis*, quæ tertia eſt hujus generis ſpecies.

Tamandua

Tamandua-guacu, sive major. *Pison. Hist. Nat. Fig. pag.* 320. (*Fig. bona*).
Tamandua major cauda panniculata. *Barr. Hist. Fr. eq. p.* 162.
Tamandua. *Joan. de Laet p.* 551.
Ursus Formicarius, Cardani. *Raj.*
Mange-Fourmis, ou Renard Ameriquain. *Des March. T. III. p.* 307.
Cochon de terre. *Kolbe. Tome III. p.* 43.
Les Congois l'appellent UMBULU. *Marcgr. Charlet.*
Les Suédois, MYRBIÖRN. *Linn.*
Les Hollandois, MIEREN-EETER. *Klein.*
Les Anglois, GREAT-ANT-BEAR. *Raj.*
Les François de la Guiane, GROS MANGEUR DE FOURMIS. *Barr.*
Les Guianois, OUARIRI. *Barr.*

Longitudo, ab extremitate caudæ, ad extremitatem oris, 6 ½ pedum, scilicet caput simul cum promuscide 14 pollicum; collum 4 pollicum; corpus ad caudæ initium 2 ½ pedum, & cauda totidem. Crura posteriora unum pedem longa, anteriora paulo longiora, pedes anteriores in 4, posteriores in 5 digitos, longis unguibus munitos divisi, duobus mediis anterioribus maximis; rostrum longissimum; oris rictus minimus; auriculæ breves & subrotundæ; oculi parvi; cauda longissimis pilis vestita; omnes pili ejus (quod maximè singulare) sunt plani, longitudine minores in parte corporis anteriore, quam in posteriore; in collo & capite antrorsum versi apparent. Omnes ex albo & nigro varii, posteriùs tamen magis nigrescentes. Per pectus ad latera in dorsum, usque ad me-

Il a, depuis l'extrémité de la queue jusqu'à l'extrémité de la bouche, environ 6 ½ pieds, sçavoir la tête & le museau 14 pouces, le col 4 pouces, le corps 2 ½ pieds, & la queue autant. Les jambes de derriere sont longues d'un pied, & celles de devant un peu plus longues; il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts. Les deux du milieu des pieds de devant sont les plus longs; le museau est fort allongé; l'ouverture de la bouche très petite; les oreilles courtes & rondes; les yeux petits; la queue garnie de longs poils: mais ce qu'il a de singulier, c'est que tous ses poils sont plats. Ils sont moins longs à la partie antérieure du corps qu'à la postérieure. Ceux du col & de la tête paroissent tournés en devant. Ils sont tous variez de noir & de blanc, plus noirs cependant vers la partie postérieure du corps. Une grande bande

Digitized by Google

noire; qui couvre la poitrine transversalement, & passe sur les côtés, va se terminer sur le dos vers la moitié de sa longueur. Les jambes de derriere sont noires, celles de devant blanches, avec une tache noire vers le pied. C'est la plus grande espece de Fourmiller. Elle se trouve au *Cap de Bonne-Esperance*, dans la *Guiane*, & dans le *Brésil*.

diam longitudinem, linea protenditur nigra. Posteriora crura nigris, anteriora albis pilis vestiuntur, & in quolibet versus pedem macula est nigra. Myrmecophagarum omnium species maxima est. Habitat in *Capite Bonæ-Spei*, *Guianâ*, & *Brasiliâ*.

Obs. Lorsque sa queue est relevée vers le dos, elle lui sert de parasol.

Obs. Caudâ suâ, in dorsum reflexâ, se tegit & inumbrat.

2. LE FOURMILLER.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda fere nuda... MYRMECOPHAGA.

Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 15. sp. 3.*
Tamandua-J, Brasilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p. 242.*
Marcgr. Hist. Br. p. 225. Fig. p. 226. (Figura bona).
Tamandua Americana minor. *Klein. Quadr. p. 46.*
Tamandua-J. *Jonst Quadr. p. 93. Fig. T. 62. (Fig. bona).*
Charlet. exerc. p. 17.
Tamandua-Miri. *Pison. Hist. Nat. Fig. p. 321. (Fig. bona).*
Tamandua minor cinerea. *Barr. Hist. Fr. eq. p. 162.*
Tamandua Formicis vescens Americana minor. *Seb. Il. p. 48. Fig. T. 47. Fig. 2. (Fig bona).*
Les Anglois l'appellent, LESSER ANT-BEAR. *Raj.*
Les François de la Guiane, MANGEUR DE FOURMIS. *Barr.*

Il est plus de moitié plus petit que le précédent: il a, comme lui, 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; le museau fort allongé; l'ouverture de la bouche très petite; les oreilles courtes & rondes; les yeux petits; la tête, les jambes, les pieds, la queue, & toute la par-

Precedentis dimidiam magnitudinem non attingit. Sicut in eo, pedes anteriores 4 digitis, posteriores 5 donati sunt; rostrum longissimum; oris rictus minimus; auriculæ breves & subrotundæ; oculi parvi; caput, crura, pedes, cauda, & tota corporis pars

Digitized by Google

anterior ex albo flavescunt; posterior verò ex ruffo fusca est. Per pectus ad latera in dorsum usque ad mediam longitudinem protenditur linea etiam ex ruffo fusca. Cauda ferè nuda est; per hoc, ita & per magnitudinem, & pilorum brevitatem à precedente differt. Habitat in *Guianâ* & *Brasiliâ*.

tie antérieure de son corps sont couleur de paille; la partie postérieure est d'un brun roux. Une bande de pareille couleur, qui couvre la poitrine transversalement, & passe sur les côtés, va se terminer sur le dos vers la moitié de sa longueur. Sa queue est presque rase: c'est par-là, ainsi que par sa grandeur, & ses poils courts qu'il differe du précédent. On le trouve dans la *Guiane* & au *Brésil*.

3. LE FOURMILLER AUX LONGUES OREILLES.

Myrmecophaga rostro longissimo, pedibus anticis tridactylis; posticis pentadactylis, auriculis longis, flaccidis... MYRMECOPHAGA MINOR. (*a*).

Tamandua-guacu, Brasilienſis, seu Ursa formicaria. *Seb. Vol. 1. p. 65. Fig. T. 40. f. 1.*

Pedes anteriores in 3 digitos, posteriores in 5 sunt divisi. Unguis medius pedum anteriorum aliis multo major; rostrum longissimum; oris rictus parvus; auriculæ longæ flaccidæ; oculi sat magni; cauda longa & in acumen desinens, supernè dilutè fulva; corpus longis pilis supernè dilutè spadiceis, infernè verò magis ruffis, vestitur. Habitat in *Indiâ Occidentali*.

Il a 3 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. L'ongle du milieu des pieds de devant est beaucoup plus grand que les autres. Le museau est fort allongé; l'ouverture de la bouche petite; les oreilles longues & pendantes; les yeux assez grands; la queue longue & qui se termine en pointe, est dans sa partie supérieure d'un fauve clair. Le corps est couvert de longs poils d'un chatain clair en dessus, & d'un brun plus foncé en dessous. On le trouve dans les *Indes Occidentales*.

(*a*) Dom. Klein, ut suprà notavi, hujus generis speciem primam eam esse putavit.

(*a*) M. Klein, comme je l'ai dit ci-dessus, l'a confondu avec le *Fourmiller Tamanoir*.

Digitized by Google

Séba, Tom. 1. Planc. 37. F. 1. a donné la figure d'un autre, qui ne différe de celui-ci que parce qu'il eſt plus petit, & par ſa couleur, qui eſt incarnat. Je le crois un jeune de cette eſpece. *M. Kelin*, l'a décrit ſous le nom de *Tamandua-J. Braſil. p. 46. n°. 2.*

Seba, Vol. 1. T. 37. F. 1. aliam delineavit quæ ab iſtâ non differt, niſi magnitudine, quâ ei cedit, & colore qui helvus eſt. Iſtius ſpeciei juniorem eam puto. *Klein. Quadr. p. 46. n°. 2.* eam deſcripſit ſub nomine *Tamandua-J. Braſil.*

**4. Le Petit Fourmiller.

Myrmecophaga roſtro brevi, pedibus anticis didactylis, poſticis tetradactylis... Myrmecophaga minima.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis. *Linn. Syſt. Nat. Ed. 6. g. 15. ſp. 2.*
Tamandua alba, altera, ſeu Coati. *Klein. Quadr. p. 46. no. 3.*
Tamandua, ſeu Coati Americana alba altera. *Seb. Vol. 1. p. 60. Fig. T. 37. F. 3. (Fig. bona). Peccat tamen in eo quod digitus unicus in pedibus anterioribus repreſentetur.*
Tamandua minor flaveſcens. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. p. 163.*
Les François de la Guiane l'appellent Petit mangeur de Fourmis. *Barr.*
Les Guianois, Ouatiriouaou. *Barr.*
Les Ethiopiens de Surinam, Coaty. *Seba.*

Celui-ci eſt la plus petite eſpéce. Depuis le bout du nez juſqu'à l'extrêmité de la queue, il a environ 15 pouces; la queue eſt plus longue que le corps & la tête; le col eſt très court. Il a 2 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere; l'ongle extérieur des pieds de devant eſt très grand. Le muſeau eſt court; l'ouverture de la bouche plus grande que dans les précédens; les oreilles petites; les yeux aſſez grands. Tout ſon corps eſt couvert de poils jaunâtres, mêlez de gris, & qui ſont doux au tou-

Hæc eſt minima ſpecies. Longitudo totius corporis, ab extrêmitate caudæ ad extremitatem oris, circiter 15 pollicum. Cauda corpore ſimul cum capite longior; collum breviſſimum; pedes anteriores in 2 digitos, poſteriores in 4 ſunt diviſi. Unguis exterior pedum anteriorum maximus. Roſtrum brevius; oris rictus amplior, quam in precedentibus; auriculæ parvæ; oculi ſat magni. Color totius corporis ex albo flaveſcit, cum griſeo admixto. Pili om-

Digitized by Google

nes, sericei modo, ad tactum mollissimi sunt. Habitat in *Guianâ*.

cher comme de la soye. On le trouve dans la *Guiane*.

SECTIO II.

Ea quæ sunt corpore squamoso.

IN illa Sectione, sicut in precedenti, unicum est genus, scilicet *Pholidoti*.

SECTION II.

Ceux qui ont le corps couvert d'écailles.

CEtte section, de même que la précédente, ne contient qu'un seul genre, qui est celui du *Pholidote*.

II.

Genus Pholidoti.

Hujus character est
Dentes nulli:
Corpus squamosum.

II.

Le genre du Pholidote.

Son caractere est
De n'avoir point de dents:
Et d'avoir le corps couvert d'écailles.

** 1. LE PHOLIDOTE.

Pholidotus pedibus anticis & posticis pentadactylis, squamis subrotundis... PHOLIDOTUS.

Manis manibus pentadactylis, palmis pentadactylis. *Linn. Syst. Nat. Ed. 6. g. 16. sp. 1.*

Tatu Mustelinus: Armodillus squamatus major Ceylanicus, seu *Diabolus Tajovanicus* dictus. *Klein. Quadr. p. 47.*

Armodillus, squamatus, Major, Ceylanicus, seu *Diabolus Tajovanicus* dictus. *Seb. Vol. 1. p. 88. Fig. T. 54. F. 1. Pullus Fig. T. 53 F. 5.* (*Fig. bonis*)

Lacertus Indicus Squamosus. *Bont. Ind. Ori. Fig. p. 60.* (*Fig. sat bona*).

Lacertus Squamosus minor setulis asperfis. *Gaz. Pet. Fig. T. 26. F. 12.* (*Fig. bona*).

Lezard Ecaillé. *Hist. de l'Acad. Tom. 3. Part. 3. p. 87. Fig. Plano. 17.* (*Fig. bonne, excepté la tête qui est mal faite*).

Les François l'appellent LEZARD ECAILLEUX; DIABLE DE JAVA.

Les Espagnols, ARMODILLO. *Seba.*

Les Habitans de Java & les autres Peuples Orientaux, PANGGOELING. *Seba.*

Les Brasiliens, TATOE. *Seba.*

Longitudo totius corporis

Il a environ 3 ou 4 pieds de

long. *Seba* dit qu'il y en a qui ont plus de 6 pieds. Il ne lui paroit point de col, & la queue eſt à peu près de la longueur du corps: il a à chaque pieds 5 doigts armés d'ongles forts; ceux du milieu ſont les plus grands. Sa tête eſt oblongue; le muſeau & l'ouverture de la bouche petite; les oreilles petites. La tête en deſſous & aux côtés, le deſſous du corps, & la partie intérieure des jambes, ſont couverts d'une peau molle ſur laquelle ſont quelques poils. Le deſſus de la tête, le deſſus du corps & des jambes, & la queue deſſus & deſſous ſont couvertes de grandes écailles arondies, ſtriées, rouſſes, ſous leſquelles ſont quelques gros poils de la même couleur. Celles du deſſus de la tête ſont plus petites que les autres. Dans les jeunes les écailles ſont jaunâtres, enſuite elles deviennent rouſſes; cette derniere couleur devient de plus en plus foncée, à meſure que l'Animal vieillit. Il a la faculté de faire de ſon corps une boule, en retirant ſi bien ſa tête & ſa queue vers le ventre, qu'on n'en ſçauroit rien appercevoir. On le trouve au *Bréſil*, & dans les *Iſles de Ceylan*, *Java*, & *Formoſe*.

trium circiter aut 4 pedum. Secundum *Sebam* ſunt qui ultra 6 pedes longi ſunt. Collum non apparet; cauda corporis ſimul cum capite longitudine; in ſingulis pedibus ſunt 5 digiti magnis unguibus muniti, intermediis maximis. Caput oblongum; roſtrum & oris rictus minimus; auriculæ parvæ. Caput infrà & ad latera, corporis infima pars, & crurum pars interior teguntur cute molli pilis quibuſdam prædita. Vertex, pars ſuperior corporis & crurum, & cauda ſupernè & infernè teguntur ſquamis magnis, rotundatis, ſtriatis, ruſſis, pilis quibuſdam craſſis, etiam ruſſis, intermixtis. Squamæ verticis aliis multò minores ſunt. Juniorum ſquamæ flaveſcunt; adultiorum ruſeſcunt, & tandem in ſenio magis, magiſque ſaturantur. In globoſam quaſi pilam ſe ſe contrahere poteſt, capite & caudâ tantoperè ventrem versùs adductis, ut nihil eorum conſpici queat. Habitat in *Braſiliâ*, & *Inſulis Ceylonenſi*, *Java*, & *Formoſa*.

Digitized by Google

**2. LE PHOLIDOTE A LONGUE QUEUE.

Pholidotus pedibus anticis & posticis tetradactylis, squamis mucronatis, caudâ longissima.. PHOLIDOTUS LONGICAUDATUS.

Lacertus squamosus peregrinus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 274.
Clus. Exot. Fig. p. 374. (*Fig. bona*).
Mus. Besl. p. 36. *Fig. T.* 11. (*Fig. bona*).
Lacerta Indica Yvannæ congener. *Aldro. Quadr. Dig. Ovi. p.* 668. *Fig. p.* 667. (*Fig. sat bona*).
Lezard de Clusius. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 89.
Lezard des Indes Orientales. *Hist. de l'Acad. an.* 1703. *p.* 39.
Les Indiens Orientaux, l'appellent PHATAGEN. *Hist. de l'Acad.*
Les Portugais du Brésil, BICHO VERGONHOSO. *Besl.*
Les Habitans de l'Isle de Formose, DIABLE DE TAIOAN. *Besl.*

Longitudo corporis, ab extremitate oris ad extremitatem caudæ, 3 pedum & 10 pollicum. Cauda 2 ½ pedes longa. Pedes singuli in 4 digitos, unguibus præditos, dividuntur. Unguis secundus pedis anterioris aliis multò major; ungues posteriorum pedum minores: anteriora crura posterioribus paulò breviora; caput infrà & ad latera, corporis pars infima, anteriora crura, & posteriorum crurum pars inferior teguntur cute molli pilis quibusdam nigris prædita. Vertex, pars superior corporis & crurum posteriorum, & cauda suprà & infrà teguntur squamis magnis, latis, striatis, & mucronatis; squamæ verticis aliis multò minores sunt; & squamæ

Il a environ 3 pieds 10 pouces de long, depuis le bout du museau, jusqu'à celui de la queue, qui a, elle seule, 2 ½ pieds de longueur. Il a à chaque pied 4 doigts, armés d'ongles, dont le second des anterieurs est beaucoup plus grand que les autres. Ceux des pieds de derriere sont les plus petits; les jambes de devant sont un peu plus courtes que celles de derriere. La tête en dessous & aux côtés, le dessous du corps, les jambes de devant, & la partie intérieure de celles de derriere sont couvertes d'une peau molle, sur laquelle sont quelques poils noirs. Le dessus de la tête, du corps & des jambes de derriere, & la queue dessus & dessous sont couverts de grandes écailles, larges, striées, & terminées par une pointe. Les

Digitized by Google

écailles du deſſus de la tête ſont plus petites que les autres, & celles de la queue ſont moins grandes à meſure qu'elles approchent de ſon extrémité. On le trouve au *Bréſil*, & à l'*Iſle Formoſe*.

caudæ ſenſim versùs ejus extremum procedendo minuuntur. Habitat in *Inſulâ Formoſâ* & *Braſiliâ*.

ORDO II.

ORDO II.

QUADRUPEDA

Dentibus molaribus tantum donata.

IN hoc Ordine, ſicut in precedenti, duo tantum ſunt genera QUADRUPEDUM, quæ ratione tegminis in duas Sectiones dividuntur : alia enim ſunt corpore *piloſo*, alia corpore quaſi Cataphracto, vel tegmine oſſeo tecto. Prima Sectio continet ea quorum corpus *pilis* tegitur, quæque ratione tardi progreſsûs, *Tardigradi* vocantur. Secunda continet ea quorum corpus tegmine oſſeo tegitur, quæque *Cataphracti* nomine donantur.

ORDRE II.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont que des dents molaires.

IL n'y a dans cet Ordre; comme dans le précédent, que deux genres de QUADRUPEDES, qui à raiſon de la couverture de leur corps ſe diviſent en deux Sections. Les uns ont le corps couvert de *poils*, & les autres l'ont comme cuiraſſé ou couvert d'un teſt oſſeux. Dans la premiere Section ſont ceux qui ont le corps couvert de *poils*, & qui à cauſe de leur lenteur à marcher ſont appellés *Pareſſeux*. Dans la ſeconde ſont ceux qui ont le corps couvert d'un teſt oſſeux, & qu'on appelle *Armadilles*.

SECTIO I.

Ea quæ ſunt corpore piloſo.

IN illâ Sectione unicum continetur genus, ſcilicet *Tardigradi*.

SECTION I.

Ceux qui ont le corps couvert de poils.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, qui eſt celui du *Pareſſeux*.

Digitized by Google

III.

Le genre du Pareſſeux.

Son caractere eſt
De n'avoir ni dents inciſives, ni dents canines, mais des dents molaires ſeulement:
D'avoir le corps couvert de poils.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de ce genre ont les jambes de devant plus longues que celles de derriere, ce qui fait qu'ils marchent très lentement: & c'eſt à cauſe de leur allure lente qu'on les a nommés *Pareſſeux*. Leurs dents molaires, qui ſont les ſeules qu'ils ayent, ne ſont point à lobes comme celles des autres QUADRUPEDES, elles ſont cilindriques, & terminées par un bout arrondi.

III.

Genus Tardigradi.

Hujus character eſt
Dentes nec inciſores, nec canini, ſed molares tantum:
Corpus piloſum.

Obſ. Omnium hujus generis QUADRUPEDUM crura anteriora poſterioribus longiora ſunt: ideò lentiſſimè progrediuntur, ob quam tarditatem greſsûs *Tardigradi* nomine donantur. Dentes illorum molares, quibus ſolis prædita ſunt, nullomodo ſunt lobati, ſicut dentes molares aliorum QUADRUPEDUM, ſed cilindrici, apice rotundato.

** 1. LE PARESSEUX.

Tardigradus pedibus anticis & poſticis tridactylis... TARDIGRADUS.

Bradypus manibus tridactylis, candâ brevi. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 3. ſp. 1.*
Ignavus Americanus riſum fletu miſcens. Ignavus Marcgravii. *Klein. Quadr. p. 43.*
Ai, ſive Ignavus. *Raj. Syn. Quadr. p. 245.*
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 221. (Fig. bona).
Piſon. Hiſt. nat. p. 321. Fig. p. 322. (Fig. bona).
Charlet. exer. p. 17.
Ignavus. *Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 262.*
Jonſt. Quadr. p. 101. Fig. T. 62. (Fig. bona) & T. 74. (Fig. mala).
Cluſ. Exot. p. 372. Fig. p. 373. (Fig. bona).
Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 154.
Ignavus, ſive Haut Cluſii. *Euſ. Nieremb. bis Fig. p. 164. (prima Figura mala, ſecunda bona).*
Ignavus, ſive per antiphraſim agilis. *Cluſ. Exot. p. 110. Fig. p. 111. (Fig. mala).*
Hay. *Jo. de Laet. Fig. p. 554. (Fig. mala).*

Digitized by Google

Arctopitechus. *Gesn. icon. Quadr. Fig. p.* 96. (*Fig. mala*).
Papio II. *Jonst. Quadr. Fig. T.* 61. (*Fig. mala*).
Pigritia, sive Haut. *Euf. Nieremb. Fig. p.* 163. (*Fig. mala*).
Ai, seu Tardigradus Gracilis Americanus. *Seb. Vol.* 1. *p.* 53. *Fig. T.* 33. *Fig.* 2. (*Fig. optima*).
Unau. *Jo. de Laet. Fig. p.* 618. (*Fig. bona*).
Ai, ou Paresseux. *Des March. Tom. III. p.* 300.
Les Espagnols & les Portugais l'appellent Pezillo, & Perico Ligero: Priguiza. *Klein. Aldrov. Jonst. Euf. Nieremb. Marcgr. Pison. Seba. Charlet.*
Les Flamands Luiaardt. *Klein. Seba.*
Les Guianois Ouaikare'. *Barr.*

Longitudo totius corporis 2 circiter pedum. Crura anteriora posterioribus sunt longiora. Cauda brevissima: in singulis pedibus 3 sunt digiti, longis & incurvis unguibus muniti: totum corpus tegitur pilis densissimis, ex fusco & albo variis, exceptâ facie, quæ tota alba est. Caret auriculis, sed non caret meatu auditorio. Habitat in *Indiâ Orientali*, *Guianâ*, & *Brasiliâ*.

Il a environ 2 pieds de longueur. Ses jambes de devant sont plus longues que celles de derriere. Sa queue est très courte; il a à chaque pied 3 doigts armés d'ongles forts, & un peu recourbés. Tout son corps est couvert de poils très épais, variés de brun & de blanc, sa face seule est toute blanche. Il n'a point d'oreilles extérieurement; mais on trouve à leur place des trous par lesquels il entend. On le trouve dans les *Indes Orientales*, dans la *Guiane* & au *Brésil*.

2. Le Paresseux de Ceylan

Tardigradus pedibus anticis didactylis, posticis tridactylis. Tardigradus Ceylonicus.

Bradypus manibus didactylis, caudâ nulla. *Linn. syst. nat. ed.* 6. *g.* 3. *sp.* 2.
Silenus: Simia persona. *Klein. Quadr. p.* 42.
Tardigradus Ceylanicus. *Seb. Vol.* 1. *p.* 54. *Fig. T.* 34. *F.* 1. *& T.* 35. *F.* 4. (*Fig. bonis*).

Pedes anteriores in 2, posteriores in 3 digitos, unguibus longis & incurvis muni-

Il a 2 doigts aux pieds de devant, & 3 à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts & cro-

chus: ſes oreilles, qui ſont plates & appliquées contre la tête, ſont cachées ſous les poils. Il n'a point de queue: tout ſon corps eſt couvert de poils épais, de couleur incarnat foncé par deſſus le dos, & d'un cendré clair par deſſous le ventre: il a le muſeau un peu plus allongé que le précédent.

Je n'ai jamais vû cet Animal, je ne ſuis pas ſûr qu'il ait le caractere de ce genre: *Séba*, qui l'a décrit, n'a point parlé de ſes dents; je crois pourtant qu'on doit le mettre dans ce genre; car il convient aſſez avec le *Pareſſeux* par ſa façon de vivre, par ſon cri, & même par la forme de ſon corps, excepté le muſeau, qui eſt un peu plus allongé. Au reſte j'aime mieux, juſqu'à-ce que je ſois plus inſtruit de ſon vrai caractere, le mettre dans ce genre, que dans la famille des *Chameaux*, comme a fait M. *Klein*.

On le trouve dans l'*Iſle de Ceylan*.

tos, diviſi ſunt: auriculæ planæ, quam proximè capiti adpreſſæ ſunt, & capitis crine obteguntur. Caret caudâ: totum corpus tegitur pilis denſiſſimis, coloris ſaturatè helvi per corpus ſupernum, ſubtùs verò dilutè cinerei: roſtrum paulò longius quam in precedente.

Hoc Animal nunquam vidi: neſcio utrum hujus generis characterem habeat. *Seba*, qui primum eum deſcripſit, dentium nullam mentionem fecit: attamen ex hoc genere eum eſſe puto; moribus enim, cantilenâ, & quidem formâ corporis, excepto roſtro paulum longiori, cum *Tardigrado* perfectè convenit. Cæterùm convenientiùs mihi videtur, uſquedum ampliorem illius cognitionem habeamus, eum in hoc genere reponere, quam, cum illuſtriſſimo *Kleinnio*, in familiâ *Camelorum*.

Habitat in *Inſulâ Ceylonenſi*.

SECTION II.

Ceux qui ont le corps couvert d'un teſt oſſeux.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, qui eſt celui de l'*Armadille*.

SECTIO II.

Ea quæ ſunt corpore tegmine oſſeo tecto.

IN illâ Sectione unicum eſt genus, ſcilicet *Cataphracti*.

Digitized by Google

IV.

Genus Cataphracti. Fig. 11

Hujus character est

Dentes nec incisores, nec canini, sed molares tantum: Fig. 1. a.

Corpus tegmine osseo tectum, & cataphractum.

Obs. Tegmen osseum, quod omnium hujus generis specierum corpus cooperit, in plures partes dividitur: anterior & posterior (*a*) sunt quasi duo scuta supernè convexa, internè concava, inter quæ plurima sunt cingula, connexa inter se cute membranacea, cujus ope suprà se mutuò glisciunt; undè corpus ita contrahunt ut globosum fiat, sicut *Erinaceus*. Tota pars infima, scilicet caput, & collum inferius, & venter, cute crassa, crassis rarisque pilis obsita, investitur: sunt etiam suprà corpus pili quidam inter squamas tegmen osseum tegentes. Dentes omnes hujus generis QUADRUPEDUM, sicut in genere precedenti, sunt cilindrici.

IV.

Le genre de l'Armadille. Fig. 11

Son caractere est

De n'avoir ni dents incisives, ni dents canines, mais des dents molaires seulement: Fig 1. a.

D'avoir le corps couvert d'un test osseux, & comme cuirassé.

Obs. Le test osseux, dont le corps de toutes les espéces de ce genre est couvert, est divisé en plusieurs parties: l'antérieure & la postérieure (*a*) sont comme deux espéces de boucliers convexes en dessus, & concaves en dessous, entre lesquels sont plusieurs bandes étroites, jointes ensemble par une peau membraneuse, qui leur laisse la liberté de se mouvoir, & de glisser les uns sur les autres: c'est ce qui leur permet de se mettre en boule, comme le *Hérisson*. Toute la partie inférieure, sçavoir le dessous de la tête & du col, & le ventre, est couverte d'une peau épaisse, garnie de quelques gros poils: il y a aussi quelques poils entre les écailles qui couvrent le test osseux. Toutes leurs dents sont cilindriques, comme dans le genre précédent.

1. L'ARMADILLE.

Cataphractus scuto unico, cingulis octodecim... ARMADILLO.

Tatu Mustelinus. *Raj Syn. Quadr. p.* 235.
Dasypus cingulo simplici. *Linn. syst. nat. ed. 6. g.* 12. *sp.* 1.
Les Anglois l'appellent WEESLE-HEADED ARMADILLO. *Raj.*

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad initium

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ

(*a* Primæ speciei pars posterior corporis non scuto, sed cingulis tegitur.

(*a*) La premiere espece n'a point de bouclier derriere, mais seulement des bandes.

Digitized by Google

10 pouces. La queue a 7 pouces de long. Chaque pied eſt diviſé en 5 doigts, dont les 3 du milieu des pieds de devant ſont beaucoup plus longs que les autres. Son front eſt large & applati; ſes yeux petits; ſes oreilles nues. On diſtingue aiſément cette eſpece des autres, en ce qu'elle n'a point de grand bouclier derriere: mais depuis le bouclier antérieur, juſqu'à la queue, le teſt oſſeux eſt diviſé en 18 bandes jointes enſemble par une peau membraneuſe. Les antérieures, qui ſont les plus grandes, ſont couvertes d'écailles quarrées; les poſtérieures de quarrées & de rondes mêlées enſemble. Les écailles qui couvrent le bouclier antérieur ſont quarrées, ainſi que celles de la queue, qui eſt compoſée de 6 anneaux à ſon origine, & enſuite ſe termine en pointe.

caudæ, 10 circiter pollicum; cauda 7 pollicum; pedes ſinguli dividuntur in 5 digitos, quorum 3 medii anteriores aliis multò ſunt longiores. Frons latus, valdè planus; oculi parvi; auriculæ nudæ. Ab aliis abundè diſtinguitur, in eo quod ſcuto poſteriori careat: ſed, à ſcuto anteriori ad caudam uſque, tegmen dividitur in 18 cingula, totidem membranis intermediis connexa. Anteriora, quæ & majora ſunt, ſquamis quadratis, poſteriora verò quadratis & rotundis intermixtis conſtant. Squamæ, ſcutum anterius tegentes, ſunt quadratæ, ſicut illæ quæ caudam cooperiunt, quæ cauda in exortu 6 annulis cingitur, & deinde in acutum deſinit.

2. L'Armadille Oriental.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis tribus.... Armadillo Orientalis.

Daſypus cingulis tribus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 12. *ſp.* 2.
Tatu Apara, Armadilli tertia ſpecies Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 234.
Tatu Apara. *Jonſt. Quadr. p.* 121. *Fig. T.* 63. (*Fig. bona*).
Marcgr. Hiſt. Bra. Fig. p. 232. [*Fig. bona*].
Tatu porcinus, ſeu Armadillo orientalis, loricâ oſſeâ, toto corpore tectus. *Klein. Quadr. p.* 48.
Tatu ſeu Armodillo Orientalis loricâ oſſeâ toto corpore tectus. *Seb. Vol.* 1. *p.* 62. *Fig. T.* 38. *F.* 2. *&* 3. (*Fig. optima*).
Tatu ſeu Armadillo. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 100. (*Fig. bona*).

Digitized by Google

Armadillo, seu Tatou genus alterum. *Clus. Exot. Fig. p.* 109. (*Fig. bona*).

Armadillo, genus alterum Clusii. *Eus. Nieremb. Fig. p.* 158. [*Fig. satis bona*].

Tatus Gesneri. *Barr. Hist. Fr. eq. p.* 163.

Longitudo corporis, ab extermitate rostri ad extremitatem caudæ, circiter unius pedis : pedes singuli secundum *Marcgravium* & *Rajum*, in 5 digitos, secundum *Sebam* & *Kleinnium*, in 4 sunt divisi. Inter duo scuta tria sunt cingula squamis parallelogramis tecta ; squamis exagonis scuta teguntur ; auriculæ nudæ, breves & rotundæ. Cauda utrinque suprà & infrà paulùm applanata, brevissima, squamis exagonis tecta, unico tantum articulo constat. Habitat in *Indiâ Orientali*, *Brasiliâ* & *Guianâ*.

Il a, depuis le bout du museau, jusqu'au bout de la queue, environ 1 pied ; il a à chaque pied, selon *Marcgrave* & *Ray*, 5 doigts, & selon *Seba* & *Klein*, 4 seulement. Entre les deux grands boucliers sont 3 bandes étroites, dont les écailles représentent des parallélogrames : celles qui couvrent les 2 grands boucliers sont exagones. Les oreilles, qui sont nues, sont courtes & rondes. La queue, qui est applatie en dessus & en dessous, est très-courte, composée d'une seule articulation & couverte d'écailles exagones. On le trouve dans les *Indes Orientales*, au *Brésil*, & dans la *Guiane*.

3. L'Armadille des Indes.

Cataphractus scutis duobus, cingulis quatuor... Armadillo Indicus.

Dasypus cingulis quatuor. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 12. sp. 3.*

Testudinatus porcellio, vel Testudinatus Echinus, Exoticum Animal. *Colum. aquat. p.* 15. *Fig. p.* 16. [*Fig. & descript. bonis*]. *Tegmen ossium tantùm descripsit & figuravit.*

De istâ specie pauca dicam. Nunquam eam vidi, & *Columna* qui solus illius mentionem fecit, tegmen osseum tantùm descripsit & figuravit.

Je ne puis dire que très peu de choses de cette espéce : je ne l'ai pas vûe, & *Columna* qui est le seul qui en ait parlé, n'en a décrit & figuré que le test. Mais

Digitized by Google

cela ſuffira pour la diſtinguer des autres eſpéces de ſon genre. Ce teſt eſt compoſé de 2 eſpéces de boucliers, dont le poſterieur eſt le plus grand, couverts d'écailles raboteuſes, exagones, pentagones, quarrées, & de quelques autres figures, entre leſquels ſont 4 bandes étroites, jointes enſemble par une peau membraneuſe.

Sed hoc ſufficit ad diſtinguendam iſtam ſpeciem ab aliis ejuſdem generis. Tegmen illud oſſeum duobus componitur ſcutis, quorum poſterius majus eſt, ſquamis exagonis, pentagonis, quadratis, aliiſque quibuſdam paucis figuris tectis illiſque ſquamis tuberculis exaſperatis; inter quæ ſcuta, 4 ſunt cingula, cute membranaceâ inter ſe connexa.

4. L'Armadille du Mexique.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis ſex... Armadillo Mexicanus.

Daſypus cingulis ſex. *Linn. Syſt. Nat. ed. 6. g. 12. ſp. 5.*
Tatu, ſive Armadillo prima Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 233. n. 1.*
Tatu, ſeu Echinus Braſilianus. *Jonſt. Quadr. p. 120.*
Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 478. Fig. p. 480.
Tatu, ſeu Armadillo. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 62.*
Cluſ. Exot. Fig. p. 330.
Muſ. Beſl. p. 40. Fig. T. 11.
Charlet. Exer. p. 18.
Tatu & Tatupeba Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 231.*
Tatu, ſive Tatou. *Jo. de Laet. Fig. p. 532.*
Tatou. *Bell. obſ. Fig. p. 204.*
Armadillo Cluſii. *Euſ. Nieremb. Fig. p. 158.*
Ayotochtli, ſeu Daſypus cucurbitinus, ab aliis Tatou, vel Armadillo dictus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 314.* [a].
Les Eſpagnols l'appellent Armadillo. *Aldro. Hern. Marcg. Beſl.*
Les Portugais Encuberto, *ou* Encubertado. *Aldr. Hern. Marcg. Beſl.*
Les Italiens, Bardato. *Beſl. Aldr.*
Les Flamands, Schilrverken. *Beſl.*
Les Anglois, Great Strell'd Hedgog. *Beſl.*
Les Habitans de la Nouvelle Eſpagne, Chirquinchum. *Euſ. Nieremb. Beſl.*

(a) Toutes les figures qu'en ont donné ces Auteurs, excepté celle d'*Aldrovande*, repréſentent plus de 6 bandes entre les 2 grands boucliers; en quoi elles ſont mauvaiſes.

(a) Omnes illorum Authorum figuræ, exceptâ ſolâ *Aldrovandi* figurâ, pluſquam 6 cingula referunt; in quo peccant.

Pedes

Digitized by Google

Pedes ſinguli in 5 digitos, unguibus ſubrotundis munitos, diviſi ſunt; os acutum; oculi parvi; auriculæ nudæ, breves. Inter duo ſcuta 6 ſunt cingula ſquamis triangularibus tecta. Squamæ ſcuta tegentes irregulares & indeterminatæ. Cauda in exortu craſſa, ſenſim ad finem uſque gracilior fit, & in acutum deſinit. Habitat in *Braſiliâ*, & *Mexico.*

Il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles arrondis; il a le muſeau pointu; les yeux petits; les oreilles nues & courtes. Entre ſes 2 grands boucliers ſont 6 bandes étroites, couvertes d'écailles triangulaires. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers ſont de figure irréguliere. La queue eſt groſſe à ſon origine; enſuite elle devient de plus en plus effilée, & ſe termine en pointe. On le trouve au *Bréſil*, & au *Mexique.*

5. L'ARMADILLE DU BRESIL.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis octò... ARMADILLO BRASILIANUS.

Daſypus cingulis ſeptem. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 12. ſp. 6.*
Tatu-été Braſilienſibus; Armadilli ſecunda ſpecies Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 233. n°. 2.*
Tatu-été Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. p. 231.*
Tatus Quadrupes peregrina. *Geſn. Icon. Quadr. fig. p. 103.* [*Fig. bona*]. [*a*]
Armadillo, ſeu Aiatochtli. *Jonſt. Quadr. p. 120. fig. T. 74.* [*Fig. bona*]. *Euſ. Nieremb. fig. p. 158.* [*Fig. bona*]. [*a*]
Tatus Major Moſchum redolens. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 163.*
Les Portugais l'appellent VERDADEIRO. *Marcgr.*
Les Guianois, TATOU-KABASSOU. *Barr.*

In pedibus anterioribus 4 digitos habet, 2 medios æquales, & lateralibus majores; in poſterioribus 5, quorum 3 medios æquales, lateralibus etiam majores. Caput

Il a 4 doigts aux pieds de devant; les 2 du milieu ſont égaux & plus grands que les latéraux; & 5 aux pieds de derriere; les 3 du milieu ſont auſſi égaux, & plus grands que les latéraux. Il

(*a*) Figuræ *Geſn.* & *Euſ. Nieremb.* pluſquam 8 cingula inter duo ſcuta referunt, in quo peccant.

(*a*) Les Figures de *Geſner*, & d'*Euſ. de Nieremb.* repréſentent plus de 8 bandes entre les 2 grands boucliers, en quoi elles péchent.

Digitized by Google

a la tête petite ; le muſeau pointu ; les oreilles longues & droites ; la queue longue & compoſée d'anneaux dans ſa partie antérieure, & enſuite ſe terminant en pointe. Entre les 2 grands boucliers ſont 8 bandes étroites, (9 jointures ſelon *Ray*, & *Marcgrave*) couvertes d'écailles joliment diſtribuées. On le trouve au *Bréſil* & dans la *Guiane*.

parvum eſt & acutum; auriculæ longæ & erectæ; cauda longa, in parte anteriore annulis compoſita, & deindè in acutum deſinens. Inter 2 ſcuta 8 ſunt cingula (9 junctura ſecundùm *Rajum* & *Marcgravium*) ſquamis ordine decenti diſpoſitis tecta. Habitat in *Guianâ* & *Braſiliâ*.

** 6. L'Armadille de Cayenne.

Cataphractus ſcutis duobus, cingulis novem... Armadillo Guianensis.

Daſypus cingulis novem. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 12. ſp. 7.*
Tatu Porcinus: Tatu ſimpliciter: Porcellus Cataphractus: Armadillo communiter. *Klein. Quadr. p. 48.*
Tatou, ſeu Armodillo Americanus. *Seb. vol. 1. p. 45. fig. T. 29. f. 1.* [*Fig. optima*].
Armadillo. *Muſ. Worm. p. 335.*

Il a, depuis le bout du muſeau, juſqu'au bout de la queue, environ 2 pieds 10 pouces ; ſçavoir la tête 4 pouces ; le corps 1 ½ pied ; & la queue 1 pied ; il a aux pieds de devant 4 doigts, dont les 2 du milieu ſont égaux & plus grands que les latéraux ; à ceux de derriere 5 doigts, dont celui du milieu eſt le plus grand, les 2 qui le ſuivent un peu plus petits, & les 2 autres très petits : ſon muſeau eſt pointu ; ſes oreilles aſſez longues & couvertes de petites écailles. Sa queue, qui eſt aſſez groſſe à ſon origine,

Longitudo totius corporis, ab extremitate oris ad caudæ apicem, circiter 2 pedum & 10 pollicum ; ſcilicet capitis 4 pollicum ; corporis 1 ½ pedis ; & caudæ 1 pedis. Pedes anteriores in 4 digitos diviſi, quorum duo medii æquales ſunt, & lateralibus majores ; poſteriores in 5, quorum medius major, 2 ſequentes paulò minores, & 2 laterales minimi. Roſtrum acutum ; auriculæ ſat longæ, parvis ſquamis tectæ. Cauda, quæ in exortu craſſa eſt, & pau-

Digitized by Google

latim gracilior fit, in parte anteriore 10 aut 12 annulis cingitur, & deindè in acumen desinit. Inter duo scuta 9 sunt cingula squamis triangularibus tecta. Squamæ scuta tegentes sunt subrotundæ & magnitudine inæquales. Habitat in *Americâ*: in *Guianâ* frequens.

& qui diminue ensuite peu à peu, est composée dans sa partie antérieure de 10 ou 12 anneaux, & ensuite se termine en pointe. Entre les 2 grands boucliers sont 9 bandes étroites, couvertes d'écailles triangulaires. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers sont presque rondes & inégales en grandeur. On le trouve en *Amérique* & sur-tout dans la *Guiane*.

** 7. L'Armadille d'Afrique.

Cataphractus scutis duobus, cingulis duodecim... Armadillo Africanus.

Dasypus tegmine tripartito. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 12. sp. 4.*
Tatu Caninus, capite pedibusque anomalis: Tatu Apara: Armadillo Nothus. *Klein. Quadr. p. 49.*
Tatu, seu Armodillo Africanus. *Seb. vol. 1. p. 47. fig. T. 30. Mas, fig. 3. Fœmina, fig. 4.* [*Fig. bonis*].

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad initium caudæ, 10 circiter pollicum, cauda 7 pollicum. Singuli pedes in 5 digitos, magnis unguibus, tribus intermediis anterioribus maximis, munitos, sunt divisi. Auriculæ sunt longæ, apice subrotundo. Inter duo scuta 12 sunt strictiora cingula, cute crassâ & membranaceâ connexa, squamis parallelogramis tecta. Squamæ scuta tegentes, sunt modò tetragonæ, modò pen-

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 10 pouces; sa queue a 7 pouces de long. Chaque pied a 5 doigts armés d'ongles forts, les 3 du milieu des pieds de devant sont les plus grands. Ses oreilles, qui sont assez longues, sont arrondies vers le bout. Entre les 2 grands boucliers sont 12 bandes étroites, jointes ensemble par une peau épaisse & membraneuse, & couvertes d'écailles parallélogrames. Celles qui couvrent les 2 grands boucliers,

Digitized by Google

ſont tantôt à 4, tantôt à 5, tantôt à 6 côtés, mais toujours inégaux. On le trouve en *Afrique.*

tagonæ, modò exagonæ, lateribus ſemper inæqualibus. Habitat in *Africâ.*

Digitized by Google

ORDO III. ORDRE III.

QUADRUPEDA *LES QUADRUPEDES*

Dentibus inciſoribus nullis, caninis & molaribus preſentibus donata.

Qui n'ont point de dents inciſives, mais qui en ont des canines & des molaires.

IN hoc Ordine duo tantùm QUADRUPEDA continentur, *Elephas* ſcilicet & *Odobenus*, quod unumquodque genus ſuum conſtituit. Dentes canini alterius ſurſùm incurvantur, alterius verò deorsùm.

CET Ordre ne comprend que deux QUADRUPEDES, ſçavoir l'*Eléphant* & la *Vache-marine*, qui ſont chacun un genre particulier. L'un à ſes dents canines recourbées en enhaut, & l'autre les a recourbées en enbas.

V.

Genus Elephantis.

Hujus character eſt

Dentes inciſores nulli:

Dentes canini duo, unus utrinque, maxillæ ſuperioris affixi, longiſſimi, ſurſùm recurvi:

Proboſcis longiſſima flexibilis.

V.

Le genre de l'Elephant.

Son caractere eſt

De n'avoir point de dents inciſives:

D'avoir à la mâchoire ſupérieure deux dents canines, une de chaque côté, très longues, recourbées en enhaut:

Une trompe très longue & flexible.

* 1. L'ELEPHANT.

ELEPHAS.

Elephas. *Raj. Syn. Quadr p 131.*

Digitized by Google

Linn. syst. nat. ed. 6. g. 24. sp. 1.
Klein. Quadr. p. 36.
Aldro. Quadr. solid. p. 418. Fig. p. 463. [*Fig. mala*].
Gesn. Quadr. p. 409. Fig. p. 410. [*Fig. mala*].
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 61. [*Fig. mala*].
Jonst. Quadr. p. 17. Fig. T. 7. 8. 9. (*Fig. bonis*).
Euf. Nieremb. p. 191.
Charlet. exerci. p. 4.
Elephas Africanus. *Seb. vol. 1. p. 175. Fatus Fig. T. 111. f. 1.* [*Fig. bona*].
Elephant. *Kolbe. Tom. III. p. 9. Fig. p. 10.*
Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 3. p. 101. Fig. T. 19. (*Fig. bonne*).
Les Grecs l'appellent Ελεφας.
Les Arabes, Cenalfa. *Aldro.*
Les Ethiopiens, Ytembo. *Aldro.*
Les Sabins, Barrus. *Gesn. Aldro.*
Les Illyriens, Sion. *Aldro. Gesn.*
Les Espagnols, Elephante. *Gesn. Aldrov.*
Les Italiens, Leophante. *Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, Helphant. *Gesn. Aldro.*
Les Flamands, Elèphant. *Aldrov.*
Les Anglois, Elephant. *Raj.*

La grandeur seule de l'Eléphant suffit pour le distinguer des autres Quadrupedes : c'est le plus grand de tous : il a jusqu'à 12 pieds de haut : mais les caracteres que nous avons établis le feront encore mieux connoître. Il n'a point de dents incisives, mais il a à la mâchoire supérieure 2 dents canines, longues quelquefois de 5 ou 5 ½ pieds, recourbées en enhaut ; & en outre plusieurs dents molaires à chaque mâchoire. Entre ses 2 longues dents canines est une trompe plus longue encore & flexible, de laquelle il se sert pour prendre sa nourriture & la porter à sa bouche. Cette trompe n'est autre chose que le pro-

Elephas magnitudine, quâ ea antecellit, ab aliis Quadrupedibus satis abundè distinguitur. Omnium maximum est ; 12 pedum altitudinem attingit ; illius verò notæ caracteristicæ à quibuscumque, non specie tantum, sed & genere differre demonstrant. Dentibus incisoribus omninò caret, sed maxillæ superiori 2 sunt dentes canini, 5 vel 5 ½ pedum interdum longi, sursùm recurvi : plures in utrâque maxilla molares. 2 inter dentes longos caninos est proboscis adhuc longior, flexibilis, quâ, velut manu, utitur ad cibos colligendos, & ori admoven-

Digitized by Google

dos. Proboscis illa nihil aliud est quam nasus productus : auriculæ amplissimæ, circumcirca dentatæ, pendulæ : crura, pedesque crassi & rudes, *ungulatos* inter & *digitatos* anomali esse videntur : pedes enim 5 digitis donantur, quorum phalanges omnes dissectione deteguntur, quæ verò aliter non apparent, cùm in carne fungosâ, substantiâ quasi corneâ omninò tecta, contineantur : ambitus enim pedum 5 ungulis obtusis, inter se connexis cute ità induratâ, ut ad substantiæ corneæ naturam accedat, terminatur : plantæ pedum cute pariter induratâ, & quasi corneâ teguntur. Cutis illa cum unguibus ipsis ità cohæret, ut & ungues & cutis simul eripi possint, sicut *Equi* ungula. Præterea cutis illa indurata ipsa substantia cornea dici posset : ab ungulis enim non differt, nisi quod ipsis sit mollior. Cutis corporis crassa est, non prorsus nuda, sed pilis rarioribus, crassis & satis longis, obsita : cauda pilis quibusdam etiam crassis terminatur. Habitat in *Africâ* : in *Asia* majores.

Vide *D. Georg. Christ. Petri ab Hartenfels*, Elephantographiam curiosam.

longement de son nez. Ses oreilles sont grandes & larges, comme dentelées tout autour, & pendantes. Ses jambes & ses pieds, qui sont gros & malfaits, semblent tenir le milieu entre les *ongulés*, & les *digités*. Ses pieds ont réellement 5 doigts, dont on distingue bien toutes les phalanges par la dissection, mais qui sans elle ne sont point visibles, & qui sont renfermées dans une chair fongueuse, laquelle est comme entiérement couverte de corne ; car la circonférence des pieds est terminée par 5 ongles obtus, joints ensemble par une peau tellement endurcie, qu'elle approche de la nature de la corne. La plante des pieds est couverte d'une peau semblable, & le tout peut être arraché ensemble, comme le sabot d'un *Cheval*. On pourroit même regarder cette peau endurcie, comme de la corne ; car elle ne différe des ongles, qu'en ce qu'elle est un peu plus molle qu'eux. Sa peau, qui est fort épaisse, n'est pas tout a fait nue ; on y trouve quelques poils gros & assez longs, ainsi qu'au bout de la queue. On le trouve en *Afrique* ; les plus grands sont en *Asie*.

Digitized by Google

VI.

Le genre de la Vache-marine.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſives :
D'avoir à la mâchoire ſupérieure deux dents canines, une de chaque côté, très longues, recourbées en enbas ;
Point de trompe.

VI.

Genus Odobeni.

Hujus caracter eſt
Dentes inciſores nulli :
Dentes canini duo, unus utrinque, maxillæ ſuperiori affixi, longiſſimi, deorsùm incurvi :
Proboscis nulla.

* 1. LA VACHE-MARINE, ODOBENUS,

Phoca dentibus exſertis. Odobenus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 9. ſp. 2.*
Equus Marinus & Hippopotamus falsò dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 191.*
Roſmarus. *Klein. Quadr. p. 92. N° III.*
Geſn. Piſc. p. 249. fig. p. 250. (*Fig. mala. peccat in pedibus*).
Jonſt. Piſc. p. 160. fig. T. 44, ſub iſto nomine. Roſmarus vetus. [*Fig. bona*].
Vache-Marine. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. T. II. p. 159. fig. p. 168.* [*Fig. bonne*].
Les Danois & Iſlandois l'appellent ROSMARUS. *Raj,*
Les Ruſſiens, MORSS. *Raj. Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Hollandois, WALROS, WALRUS. *Klein. Hiſt. d'Iſl,*
Les Flamands, WALRUS. *Raj.*
Les Anglois, MORSE, *ou* SEA-HORSE. *Raj.* SEA KOW. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Angle-Saxons, HORS-HWAL. *Hiſt. d'Iſl. Klein.*
Les François des Côtes de l'Amérique, VACHE-MARINE, *ou* BESTE A LA GRANDE DENT. *Hiſt. d'Iſl. Klein.*

Cet Animal eſt très grand : il a quelquefois juſqu'à 16 pieds de long, & environ 8 de tour. Il a 4 pieds courts, à chacun deſquels ſont 5 doigts, armés d'ongles, & joints enſemble par la peau. Les poſtérieurs ſont tout-à-fait tournés en arriere, & ſemblent n'être autre choſe

Monſtroſum eſt hoc Animal. Longitudo corporis 16 pedes plerumque attendit ; ambitus verò circiter 8. 4 habet pedes breves, in quibus ſingulis ſunt 5 digiti, unguibus muniti, cute interſe connexi. Pedes poſteriores retrorsùm omninò ſpectant.

Digitized by Google

tant, & nihil aliud, quàm ipsius cauda, apparent. Caput crassum & in anteriore parte planum: rictus validissimis setis obsitus est. Dentibus incisoribus omninò caret; in maxillâ verò superiore duobus dentibus caninis, 2 pedum circiter longis, deorsùm incurvis, & in utrâque maxillâ 8 molaribus, 4 utrinque, donatur. Auricularum externarum loco, habet utrinque foramina quibus audit; cutis, quæ pollicis ferè crassitiem attingit, pilis brevibus, rigidis, ex fusco sordidè flavis, tegitur. Habitat in *Regionibus Septentrionalibus.*

que sa queue. Sa tête est grosse & écrasée sur le devant. Son museau est entouré de gros poils roides: il n'a point de dents incisives; mais il en a à la mâchoire supérieure 2 canines, longues d'environ 2 pieds, recourbées en enbas; & en outre à chaque mâchoire 8 molaires, 4 de chaque côté: il n'a point d'oreilles extérieures, mais à chaque côté de la tête est un trou, par lesquels il entend. Sa peau a près d'un pouce d'épaisseur, & est couverte d'un poil court & roide, d'un brun jaunâtre. On le trouve dans tout le *Nord.*

2. LE LAMANTIN.

MANATUS.

Manatus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 56. sp. 1.*
Klein. Quadr. p. 94. N°. V.
Manati. *Gesn. Pisc. p. 253.*
Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 323.
Manati, seu Vacca-Marina. *Raj. syn. Quadr. p. 195.*
Sloane. Vol. II. p. 329.
Manati Indorum. *Aldro. Pisc. p. 728. fig. p. 729.*
Jonst. Pisc. p. 257.
Manati Phocæ Genus. *Clus. exot. p. 132. fig. p. 133.*
Trichechus. *Art. Gen. Pisc. g. 51. sp. 1.*
Art. Synon. Pisc. g. 51. sp. 1.
Bœuf-Marin. *Hist. de l'Acad. T. III. Part. 1. p. 191.*
Les Espagnols l'appellent MANATI. *Klein. Art. Raj.*
Les Portugais, PEZZE MOULLER, *ou* MUGER. *Art.*
Les Flamands, SEEKOEGEN. *Art.*
Les Anglois, MANATEE. *Art.*
Les Habitans d'Amboine, DUIUNG, *ou* DOUIONG. *Art.*
Les Habitans des bords de la Riviere des Amazones, PEGE-BUEY. *Art.*

Je n'ai jamais vû le LAMANTIN : je ne ſcais de quel genre il eſt ; car aucun Auteur n'a fait mention de ſes dents. Je le place ici, juſqu'à ce que je ſois plus inſtruit de ſon vrai caractere. Voilà la deſcription qu'en donne le *P. Labat*, dans ſon *voy. aux Iſles de l'Amerique*, *Tome II. p. 201*, où il dit l'avoir vû. « Il avoit 14 pieds 9 pouces de « longueur, depuis le bout du « muſſle juſqu'à la naiſſance de « la queue ; il étoit tout rond « juſqu'à cet endroit-là. Sa tête « étoit groſſe, ſa gueule large « avec de grandes babines, & « quelques poils longs & rudes « audeſſus. Ses yeux étoient « très petits par rapport à la tête, « & ſes oreilles ne paroiſſoient « que comme deux petits trous. « Le col eſt fort gros & fort « court..... Les deux nageoires « qu'il a un peu audeſſous du « col, ... reſſemblent aſſez « aux pattes de la Tortue..... Le « Lamantin femelle a deux ma- « melles rondes ; celles du La- « mantin que j'ai meſuré avoient « 7 pouces de diamétre ſur 4 « pouces ou environ d'éléva- « tion..... Ce Poiſſon, qui eſt « tout rond, depuis la tête juſ- « qu'à la naiſſance de la queue, « avoit 8 pieds 2 pouces de cir- « conference. Sa queue étoit de « 19 pouces de long, depuis ſa « naiſſance, juſqu'à ſon extrêmi-

MANATUM nunquam vidi: cujus ſit generis prorsùs ignoro ; Authores enim nulli de illius dentibus locuti ſunt. Poſt *Odobenum* eum repono, uſquedum ampliorem illius cognitionem habeamus. *P. Labat*, in ſuo opere cui Titulus ; *voy. aux Iſles de l'Amérique. Tome II. p. 201*, hoc Animal vidiſſe refert ; ſicque id deſcribit. » Ab extremita- « te roſtri ad caudæ exortum « 14 pedes & 9 pollices lon- « gitudine æquabat. Corpore « erat tereti uſque ad cau- « dam. Caput erat craſſum, « oris rictus latus, labiis craſ- « ſis donatus, quæ labia pilis « quibuſdam longis & rigidis « adornabantur. Oculos ha- « bebat valdè exiguos pro ra- « tione capitis, & auricula- « rum loco duo erant exigua « foramina. Collum valdè « craſſum eſt & breve.... Pin- « næ duæ, paulò infra collum « ſitæ, ... teſtudinis pedes « æmulantur..... Fœmina « duas habet mammas rotun- « das ; diameter earum, quas « menſuravi, 7 pollices æqua- « bat ; craſſities verò 4 aut « circiter pollices... Ambitus « corporis illius Piſcis, qui à « capite ad caudæ exortum « teres eſt, octo pedes & 2 « pollices attingebat. Cauda « ab exortu ad extremitatem

Digitized by Google

« 19 pollices longa erat; quâ « parte latissima, 15 circiter « pollices attingebat: & ver- « sùs extremum crassities 3 « circiter pollices æquabat..... « Cutis hujus Piscis corii Bo- « vini duplicem ferè crassitiem « in dorso æquat; in ventre « verò multò minus crassa. « Rugosa est, coloris ex cine- « reo fusci, pilis ejusdem co- « loris, raris, crassis, satque « longis obsita.

Secundùm Authores omnes duobus tantùm pedibus *Manatus* præditus est: attamen tantam habet cum *Quadrupedibus* analogiam, ut ad eorum Classem eum pertinere puto; verisimile enim videtur pedes posteriores cum cauda connecti, eosque dissectione posse detegi.

« té; elle avoit environ 15 pou- « ces dans sa plus grande lar- « geur: son épaisseur tout au bout « étoit d'environ 3 pouces.... La « peau de ce Poisson est épaisse « sur le dos, presque comme « deux cuirs de Bœuf, mais elle « est beaucoup plus mince sous « le ventre. Elle est de couleur « d'ardoise brune, d'un gros « grain & rude, avec des poils « de même couleur, clairs se- « més, gros, & assez longs.

Quoique tous les Auteurs n'accordent que deux pieds à cet Animal, il a tant d'analogie avec les *Quadrupedes*, que je crois qu'il appartient à leur Classe: & il y a toute apparence que les pieds de derriere sont confondus dans la queue, & qu'on les découvriroit par la dissection.

Digitized by Google

ORDRE IV.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & qui en ont ſix à l'inférieure.

TOUS les QUADRUPEDES de cet Ordre, comme ceux de l'Ordre ſuivant, ſont ruminants ; ils ont, comme eux, quatre ventricules, mais ils n'ont point de cornes : leurs pieds ſont fendus en deux doigts *onguiculés*, & non pas *ongulés*, comme ceux des *pieds fourchus*. La plante de leurs pieds eſt couverte d'une peau molle & un peu calleuſe. Cet Ordre ne contient qu'un ſeul genre, qui eſt celui des *Chameaux*.

VII.

Le genre du Chameau.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir ſix à l'inférieure :
D'avoir à chaque pied deux doigts onguiculés.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de ce genre ont le col très long.

ORDO IV.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore nullis, in inferiore ſex donata.

OMNIA hujus Ordinis QUADRUPEDA, ſicut & ſequentis, ſunt ruminantia. Quatuor ventriculos habent ; non verò ſunt cornigera. Pedes habent in duos digitos, non quidem *ungulatos*, ſicut *biſulca*, ſed tantùm *unguiculatos*, fiſſos. Plantæ pedum cute molli & parumper calloſâ teguntur. In hoc Ordine unicum eſt genus, ſcilicet *Camelinum*.

VII.

Genus Camelinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſorii in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore, ſex :
In ſingulis pedibus digiti duo unguiculati.

Obſ Omnia hujus generis QUADRUPEDA collo longiſſimo donantur.

Digitized by Google

** 1. LE CHAMEAU.

Camelus duobus in dorso tuberibus..... CAMELUS.

Camelus duobus in dorso tuberibus, seu Bactrianus. *Raj. syn. Quadr. p. 145. no. 2.*
Camelus tophis dorsi duobus. Bactrianus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 29. sp. 2.*
Camelus, Beschet, Bactrianus fortissimus. *Klein. Quadr. p. 41.*
Camelus vel Camelus Bactriana. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 22. (Fig. bona).*
Camelus. *Aldrov. Quadr. Bis. p. 889. Fig. p. 907. (Fig. mala).*
Gesn. Quadr. p. 162. Fig. p. 163. (Fig. bona).
Jonst. Quadr. p. 67. Fig. T. 43. sub isto nomine. Camelus Bactrianus, seu Dromedarius. *(Fig. bon.).*
Charlet. Exer. p. 12.
Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 223. Fig. T. 13. (Fig. bona).
Les Hébreux l'appellent GAMAL. *Gesn.*
Les Chaldéens, GAMELA. *Gesn.*
Les Arabes, GEMAL. *Gesn.*
Les Grecs, Καμηλος.
Les Sarrasins, SHYMEL. *Gesn.*
Les Perses, SCHETOR. *Gesn.*
Les Illyriens, VUELBLUD. *Gesn.*
Les Espagnols, & les Italiens, CAMELLO. *Gesn.*
Les Allemands, KÆMELTHIER. *Gesn.*
Les Anglois, CAMEL. *Raj. Gesn.*

A vertice ad caudam, 8 circiter pedes longus est. Caput, ab extremitate labii superioris ad occipitium, 23 pollices longum: auriculæ 4 pollices; cauda 2 pedes longa. 2 habet in dorso tubera, quorum posterius anteriori multò majus est. A parte superiore majoris istius tuberis ad terram usque, 7 pedum altus est. Labium superius ut in *lepore* fissum: pili ipsius longissimi sunt in tuberibus, in dorso, suprà caput, & ad collum;

Il a, depuis le sommet de la tête, jusqu'à la queue, environ 8 pieds. Sa tête a, depuis l'extrêmité de la lévre supérieure, jusqu'à l'occiput, 23 pouces; les oreilles 4 pouces; la queue 2 pieds de long. Il a sur le dos 2 bosses, dont la postérieure est beaucoup plus considérable que l'antérieure. Depuis la partie supérieure de cette grosse bosse jusqu'à terre, il a 7 pieds de haut. Sa lévre supérieure est fendue, comme celle d'un *liévre*: il a des poils très longs sur

Digitized by Google

ſes boſſes, ſur le dos, ſur la tête, & au col: le reſte du corps eſt couvert de poils courts. Ses pieds ſont fendus en deſſus ſeulement, & terminés par deux petits ongles. La plante des pieds eſt large, plate, très charnue, & couverte d'une peau molle, épaiſſe, & un peu calleuſe. Il a 6 calloſités aux jointures des jambes, ſçavoir 2 à chacune des jambes de devant; la premiere & la plus haute étant en arriere à la jointure qui fait proprement le coude, & la deuxiéme endevant & plus bas à la jointure qui repréſente le pli du poignet. Chaque jambe de derriere en a auſſi une à la premiere & plus haute jointure, qui eſt celle de devant & le véritable genou: outre ces 6 calloſités, il en a une ſeptieme beaucoup plus conſidérable placée au-bas de la poitrine, fermement attachée au ſternon. Le prépuce eſt fort long & regarde en arriere. Il n'a point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure; il en a 6 à l'inférieure, & 3 dents canines de grandeur inégale de chaque côté à la mâchoire ſupérieure, & 2 à peu près ſemblables de chaque côté à la mâchoire inférieure. Le nombre des dents molaires varie. On le trouve dans la *partie orientale* de l'*Aſie*.

in reliquo corpore breves. Pedes in parte ſuperiore tantùm ſunt fiſſi, ſinguli duobus parvis unguibus in extremo donati: planta pedum lata, plana, admodum carnoſa, cute molli, craſſâ, & parumper callosâ, tegitur. Articulorum crurum calli 6 ſunt numero; nimirùm ad ſingulos crurum anteriorum articulos ſinguli; prior & ſuperior retrorsùm ad partem *cubitum* propriè dictam; alter & inférior antorsùm ad partem quæ carpo humano reſpondet. In ſingulis poſterioribus cruribus unus etiam eſt callus ad primum & ſupremum articulum, qui antrorsùm flectitur, & verum genu eſt. Præter prædictos, ſeptimus eſt callus, aliis multò major, ad imum thoracem, ſterno firmiter adnexus. Prepucium longiſſimum eſt & retrò verſum. Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore nullis, in inferiore 6 donatur, & præterea dentibus caninis magnitudine inæqualibus 3 utrinque in maxillâ ſuperiore, & 2 ſimilibus utrinque in maxillâ inferiore. Dentium molarium variat numerus. Habitat in *partibus Aſiæ orientalibus*.

Digitized by Google

** 2. LE DROMADAIRE.

Camelus unico in dorſo tubere..... DROMEDARIUS.

Camelus unico in dorſo gibbo, ſeu Dromedarius. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 143 *n°.* 1.
Camelus topho dorſi unico. Dromedarius. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 29. *ſp.* 1.
Camelus minimus. Dromedarius. *Klein. Quadr. p.* 42.
Camelus Arabica, vel Camelus Dromas. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 23. (*Fig. bona*).
Camelus Dromas. *Geſn. Quadr. p.* 171. *Fig. p.* 172. (*Fig. bona*).
Dromas. *Proſp. Alp. Ægypt. p.* 223. *Fig. T.* 12. (*Fig. bona, exceptis pedibus qui ungulati apparent*).
Dromedarius. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 909. *Fig. p.* 908. (*Fig. mala*).
Jonſt. Quadr. p. 69. *Fig. T.* 43. *ſub iſto nomine* Camelus (*Fig. bona, exceptis pedibus qui ungulati apparent*).
Charlet. Exer. p. 13.
Chameau. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 1. *p.* 71. *Fig. Pl.* 7. (*Fig. très bone*).
Les Chaldéens l'appellent HOGENAIN. *Geſn.*
Les Grecs, Δρομας.
Les Ethiopiens, RAGUAHIL, *ou* EBAMARI. *Klein.*
Les Maures, EGIN. *Proſp. Alp.*
Les Italiens, DROMEDARIO. *Geſn.*
Les Allemands, DROMEDARY. *Geſn.*
Les Anglois, CAMEL, *ou* DROMEDARY. *Raj.*

A precedente differt magnitudine, quâ ei cedit, & numero tuberum, quod ei unicum eſt in dorſo. In aliis precedenti ſimilis eſt. Sicut ille, labium habet ſuperius fiſſum; pili ipſius longiores in tubere & ad collum ſiti ſunt. Pedes pedibus precedentis ſimiles habet, eoſdemque in cruribus & thorace callos. Habitat in *partibus Aſiæ occidentalibus*; in *Syriâ* & *Arabiâ frequens*.

Il eſt plus petit que le précédent. Il en différe auſſi, parce qu'il n'a qu'une ſeule boſſe ſur le dos. D'ailleurs il lui reſſemble aſſez : il a, comme lui, la levre ſupérieure fendue ; ſes plus longs poils ſont ſur ſa boſſe & au col. Ses pieds ſont conformés de même que ceux du précédent ; il a aux jambes & à la poitrine les mêmes calloſités. On le trouve le plus communément aux *parties Occidentales de l'Aſie*, ſçavoir dans la *Syrie* & l'*Arabie*.

Digitized by Google

3. Le Chameau du Perou.

Camelus pilis breviſſimis veſtitus..... Camelus Peruanus.

Camelus Peruanus Glama dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 145. *n°.* 3.
Camelus dorſo levi, pectore gibboſo. Glama. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 29. *ſp.* 3.
Camelus ſpurius Peruanus, Glama dictus. *Klein. Quadr. p.* 42.
Ovis Peruana. *Jonſt. Quadr. p.* 45. *Fig. T.* 46. (*Fig. bona*).
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 243. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 9.
Pelon Ichiatl Oquitli. Ovis Peruana. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 660. [*Fig. malâ*].
Petvichcatl. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 11.
Les François l'appellent Mouton de Perou.
Les Eſpagnols du Perou, Glama, *ou* Lhama. *Raj.*

Il a depuis le ſommet de la tête, juſqu'à la queue, 6 pieds; depuis la partie ſupérieure du dos, juſqu'à la plante des pieds, 4 pieds: le col long de 2 pieds depuis les épaules juſqu'au ſommet de la tête; les oreilles aſſez longues; la tête allongée; la levre ſupérieure fendue; les yeux aſſez grands; le ventre large; le derriere plus élevé que le devant. Audeſſous de la poitrine eſt un eſpece de tumeur ſemblable à un abſcès de laquelle il ſemble qu'il découle continuellement un peu de pûs. Les individus de cette eſpéce varient en couleur comme nos brebis: les

Longitudo corporis à cervice ad caudam 6 pedum eſt: altitudo à dorſo ad pedis plantam, 4 tantùm; colli longitudo, à ſcapulis ad cervicem, 2 pedum. Auriculæ longæ; caput oblongum; labium ſuperius fiſſum; oculi ſat magni; cauda brevis; venter latus; clunes anteriore parte alteriores. Sub pectore, ubi thorax ventri connectitur, eſt tuber vomicæ ſimilis, è quò aliquid excrementi ſenſim manare videtur. Colore variat hæc ſpecies, ſicut oves noſtræ. Modò eſt alba, modò nigra;

Digitized by Google

gra, modò fusca, modò ex his coloribus variegata: hæc ultima ab incolis *Moromoro* (*a*) vocatur. Habitat in *Peruvio*.

uns sont blancs, d'autres noirs, d'autres bruns, & d'autres variés de toutes ces couleurs : les Habitans du pays appellent ces derniers *Moromoro* (*a*). On le trouve au *Perou*.

4. La Vigogne.

Camelus pilis prolixis toto corpore vestitus.

Camelus seu Camelo congener Peruvianum, lanigerum, *Pacos* dictum. Ovis Indica, seu Peruviana vulgò. *Raj. Syn. Quadr. p.* 147.

Camelus gibbis nullis. Pacos. *Linn. Syst nat. ed.* 6. *g.* 29. *sp.* 4.

Camelus laniger, Peruanus; Pacos vulgò Ovis Peruviana. *Klein. Quadr. p.* 42.

Ovis Chilensis. *Jonst. Quadr. p.* 46. *Fig. T.* 23. *sub illo nomine*, Vervex alius peregrinus. (*Fig. bona, exceptis pedibus anticis, qui in quatuor digitos divisi sunt, cum in duos tantùm dividi debeant*). *Charlet. Exer. p.* 9.

Ovis Peruana, Paco dicta. *Marcgr. Hist. Br. Fig. p.* 244. (*Fig. Bona*): *Peccat tamen in pedibus anticis, sicut Jonstoni figura.*

Ovis Peruanæ alia species ab incolis *Pacos* dicta. *Hernand. Hist. Mex. p.* 663.

Precedente minor est; caput & auriculas, servatâ corporis proportione, multò minores habet. Clunes anteriore parte non sunt altiores. Totum corpus pilis longissimis & mollissimis tegitur. Colore variat hæc species, sicut præcedens: modò est nigra, modò alba, modò subrussa, modò

Elle est plus petite que le précédent: elle a la tête & les oreilles beaucoup plus petites à proportion de la grandeur du corps. Son derriere n'est pas plus élevé que le devant; tout son corps est couvert de poils très longs & très fins: elle varie en couleur, comme le précédent. Il y en a de noires, d'autres blanches, d'au-

(*a*) Vide Eus. de Nieremb. *p.* 282. *Moromoro* in eâ figuratur.

(*a*) Eus. Nieremb. p. 182. a donné la figure du *Moromoro*.

Digitized by Google

tres rouſsâtres, & d'autres variées de toutes ces couleurs. On la trouve au *Perou*, dans le *Chili*, & dans la *nouvelle Eſpagne*.

ex his coloribus variegata. Habitat in *Peruvio*, in *Chile*, & in *novâ Hiſpaniâ*.

Digitized by Google

ORDO V.

QUADRUPEDA

Dentibus incisoribus in maxillâ superiore nullis, in inferiore octo, & pede bisulco donata.

IN hoc Ordine continentur omnia QUADRUPEDA ruminantia, bisulca; quæ, sicut QUADRUPEDA præcedentis Ordinis, quatuor ventriculis prædita sunt. In tres Sectiones dividuntur. Prima continet ea quorum cornua sunt simplicia, ut *Hircus*, *Aries*, &c. Secunda ea quæ cornibus ramosis donantur, sicut *Cervus*. Tertia verò ea quæ non sunt cornigera, sicut *Tragulus*.

ORDRE V.

LES QUADRUPEDES

Qui n'ont point de dents incisives à la mâchoire supérieure, & qui en ont huit à l'inférieure, & le pied fourchu.

DANS cet Ordre sont compris tous les QUADRUPEDES ruminants à pied fourchu: ils ont, comme ceux de l'Ordre précédent, quatre ventricules. Ils se divisent en trois Sections. Dans la premiere sont ceux qui ont des cornes simples, comme le *Bouc*, le *Belier*, &c. Dans la seconde sont ceux qui ont des cornes branchues, comme le *Cerf*; & dans la troisiéme ceux qui n'ont point de cornes, comme le *Chevrotain*.

SECTIO I.

Ea quorum cornua sunt simplicia.

HUJUS Sectionis QUADRUPEDA in quatuor Genera dividuntur. Alia sunt cornibus sursùm versis, inter

SECTION I.

Ceux qui ont des cornes simples.

LES QUADRUPEDES de cette Section se divisent en quatre Genres. Les uns ont les cornes tournées en enhaut: & ceux

Digitized by Google

là ou ont les cuiſſes de devant beaucoup plus longues que celles de derriere, comme la *Giraffe*, ou les ont à peu près d'égale longueur, comme *le Bouc*, *le Chamois*, &c. D'autres ont les cornes tournées vers le derriere, comme *le Bellier*; d'autres enfin les ont tournées vers les côtés, comme *le Bœuf*. Ces différentes directions de cornes ſerviront à diſtinguer ces Genres les uns des autres.

quæ alia femoribus anticis longiſſimis donantur, ut *Giraffa*, ſeu *Camelopardalis*; alia femoribus æqualibus, ut *Hircus*, *Rupicapra*, &c. Alia ſunt cornibus retrorsùm verſis, ſicut *Aries*; aliâ tandem cornibus ad latera verſis, ut *Bos*. Diverſis illis cornuum directionibus Genera iſta ſatis abundè à ſe invicem differunt.

Obſ. 1°. Lorſque je dis que les cornes ſont tournées en enhaut, vers le derriere, ou vers les côtés, je ne veux parler que de l'origine de la corne; c'eſt-à-dire, que la partie par laquelle elle tient à la tête, ſe dirige vers le haut, ou le derriere, ou les côtés: toutes les autres courbures ſont comptées pour rien, parcequ'elles varient très ſouvent.

Obſ. 2°. Toutes les femelles de cette Section portent des cornes, ainſi que leurs mâles.

Obſ. 1°. Cum dicuntur cornua ſurſùm, retrorsùm, aut ad latera verſa, de ipſorum origine tantummodò loquitur; id eſt, pars cornuum quâ capiti adhærent, ſurſùm, retrorsùm, aut ad latera vertitur. Ad alios autem cornuum inflexus nullo modo attendi debet, quia ſæpiſſimè variant.

Obſ. 2°. Omnes hujus Sectionis fœminæ ſunt cornigeræ, ſicut & mares.

VIII.

Le Genre de la Giraffe.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure; d'en avoir huit à l'inférieure:
D'avoir le pied fourchu:
Des cornes ſimples,
Tournées en enhaut:
Les cuiſſes de devant beaucoup plus longues que celles de derriere.

VIII.

Genus Giraffæ.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore octo:
Pes bifulcus:
Cornua ſimplicia,
Sursùm verſa:
Femora anteriora poſterioribus multò longiora.

Digitized by Google

1. LA GIRAFFE.

GIRAFFA. CAMELOPARDALIS.

Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis. Camelopardalis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 1.*
Tragus bisulcorum mixtus: Giraffa; Camelopardalis. *Klein. Quadr. p. 22.*
Camelopardalis, Giraffa recentioribus dicta. *Raj. syn. Quadr. p. 90.*
Camelopardalis. *Aldrov. Quadr. Bis. p. 927. Fig. p. 931.* [*Fig. sat bona*].
Gesn. Quadr. Fig. p. 160. (*Fig. sat bona*).
Gesn. Icon. Quadr. p. 41. Fig. p. 42. (*Fig. sat bona*).
Jonst. Quadr. p. 69. Fig. T. 39. & 45. (*Fig. sat bonis*). & *T. 40. sub illo nomine*, Camelus Indicus. (*Fig. sat bona, si maculas præberet*).
Prosp. Alp. Ægypt. p. 236. Fig. T. 14. f. 4. (*Fig. sat bona*).
Camelopardalus. *Charlet. Exer. p. 13.*
Gyraffa quam Arabes *Zurnapa*, Græci & Latini *Camelopardalin* nominant. *Bell. Obs. p. 118. Fig. p. 119.* (*Fig. sat bona*).
Graffa. *Eus. Nieremb. p. 191.*
Les Hébreux l'appellent ZAMER. *Gesn.*
Les Chaldéens, DEBA. *Gesn.*
Les Arabes, ZURNAPA. *Raj. Bell. Prosp. Alp.* SERAPHAH. *Gesn.*
Les Perses, SERAPHAH, GIRNAFFA *Gesn.*
Les Ethiopiens, NABIN. *Gesn. Klein.* NABUDA. *Jonst. Klein.*
Les Allemands, GIRAFF. *Gesn.*

Longitudo corporis, à vertice ad caudam, 18 pedum est. Collum 7 pedum longum. Ad 16 pedes caput à terrâ efferre potest: femora (non verò crura) anteriora posterioribus multò longiora sunt: quare non nisi latè deductis cruribus anterioribus, cibum ex terrâ capere potest. Duo cornicula ex fronte eminent circiter 6 digitorum longitudine, ad apicem parumper incurva. Auriculæ sat magnæ sunt. A capitis vertice ad dorsum, jubam habet ut

Elle a depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, 18 pieds. Son col est long de 7 pieds: elle peut élever la tête à 16 pieds de haut: ses cuisses (& non pas les jambes) de devant sont beaucoup plus longues que celles de derriere: ce qui fait qu'elle ne peut prendre sa nourriture par terre, à moins qu'elle n'écarte beaucoup les jambes de devant l'une de l'autre. Elle a 2 petites cornes, longues d'environ 6 doigts, un peu courbées vers le bout; les oreilles assez grandes; une criniere comme un *Cheval*, des

Digitized by Google

puis le ſommet de la tête juſqu'au dos. (Il y en a qui n'ont point de criniere, c'eſt peut-être ce qui diſtingue les ſéxes.) Sa queue eſt courte & menue, & terminée par un bouquet de poils. Tout ſon corps eſt marqué de taches, dont les unes ſont rondes, & les autres quarrées. On la trouve en *Afrique*, & ſur tout en *Ethiopie*.

Equus. (Sunt qui jubâ carent, per quod fortè ſexus diſtinguntur.) Cauda tenuis eſt & exigua, in acumine piloſa. Totum corpus maculis conſpergitur, non quidem omnibus rotundis, ſed aut obquadratis, aut rotundis. Habitat in *Africâ*, & præſertim *Æthiopiâ*.

IX.

Le Genre du Bouc.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure :
D'avoir le pied fourchu :
Les cornes ſimples,
Tournées en enhaut :
Les cuiſſes de devant égales en longueur à celles de derriere.

IX.

Genus Hircinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore nulli, in inferiore octo :
Pes biſulcus :
Cornua ſimplicia,
Sursùm verſa :
Femora anteriora poſterioribus longitudine æqualia.

** 1. Le Bouc, la Chevre Domestique.

Hircus cornibus interiùs cultratis, exteriùs rotundatis, infrà carinatis, arcuatis... Hircus et Capra Domestica.

Capra cornibus carinatis, arcuatis. Caper. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 32. *ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. no. 42.
Capra Domeſtica. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 77. *n°.* 1.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Capra. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 270. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 17. (*Fig. bona*).
Hircus *Geſn. Quadr. p.* 301. *Fig. p.* 302. (*Fig. bona*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 16. (*Fig. bona*).
Capra & Hircus. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 619. *Fig. p.* 635. [*Fig. ſat bona*].
Capra & Hircus Domeſticus. *Jonſt. Quadr. p.* 46. *Fig. T.* 26. & 27. [*Fig. bonis*].

Digitized by Google

Caper. Capra. *Rzac. Hist. nat. pol. p.* 239.
Rzac. Auct. p. 331.
Hircus Domesticus. *Charlet. Exer. p.* 9.
Tragus Domesticus. Hircus, Capra, Caper si castratus. *Klein. Quadr. p.* 15.
Hœdus. *Gesn. Quadr. p.* 314.
Chévre privée ou Domestique. *Kolbe. Tom. III. p.* 35.
Les François appellent le mâle Bouc; *la femelle*, Chevre; *le jeune*, Chevreau.
Les Latins, le mâle, Hircus; *lorsqu'il est châtré*, Caper; *la femelle*, Capra; *le jeune*, Hædus.
Les Chaldéens, le mâle, Ize; *la femelle*, Eza. *Gesn.*
Les Grecs, le mâle, Τράγος; *la femelle*, Αἴξ.
Les Arabes, le mâle, Maez; *la femelle*, Schaah. *Gesn.*
Les Sarrasins, Anse. *Gesn.*
Les Perses, le mâle, Busan; *la femelle*, Buz. *Gesn.*
Les Espagnols, le mâle, Cabron; *la femelle*, Cabra; *le jeune*, Cabrito. *Gesn.*
Les Italiens, le mâle, Becco; *la femelle*, Cabra; *le jeune*, Cavretto. *Gesn.*
Les Allemands, le mâle, Bock; *la femelle*, Geisz; *le jeune*, Gitse ou Titslein. *Gesn.*
Les Illyriens, le mâle, Kozel; *la femelle*, Koza. *Gesn.*
Les Polonois, Koziel. *Rzac.*
Les Suédois, Get. *Linn.*
Les Anglois, le mâle, Gote-Bucke; *la femelle*, Goat; *le jeune*, Kydd. *Raj. Gesn.*

Capra animal est ita notum ut descriptione non indigeat. Observabo tantùm cornua esse interiùs cultrata, exteriùs rotundata, infrà carinata, arcuata; barbam, sive aruncum ex mento dependere, & Hircum odorem gravem spirare. Habitat domestica in omnibus ferè locis cultis, & fera in montibus.

La Chevre est un animal trop connu, pour qu'il soit nécessaire d'en faire la description. J'observerai seulement que ses cornes sont tranchantes à leur côté intérieur, arrondies à l'extérieur, concaves endessous, & un peu courbées en arc: elle a une barbe assez longue qui lui pend sous le menton. Le mâle répand une odeur forte. On la trouve domestique dans presque tous les lieux habités, & sauvage sur les montagnes.

Digitized by Google

* 2. La Chevre d'Angora.

Hircus pilis longissimis crispis toto corpore vestitus... Capra Angorensis.

Chevre d'Angora. *Voy. du Lev. Tom. II. Fig. p.* 463. (*Fig. très bonne*).

Elle differe de la *Chevre domestique* par la beauté de son poil, qui a 8 ou 9 pouces de long, qui est d'une blancheur éblouissante, fin & doux comme de la soye, & naturellement frisé. On la trouve à *Angora*.

A *Capra domesticâ* differt pilis 8 aut 9 pollices longis, candidissimis, splendentibus, sericei modo mollissimis & tenuissimis, crispis. Habitat in *Angorâ*.

* 3. Le Bouc-Estain.

Hircus cornibus suprà nodosis, infrà rotundatis, in dorsum reclinatis... Ibex.

Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g.* 32. *sp.* 6.
Ibex. *Raj. Syn. Quadr. p.* 77. *n°.* 2.
Aldro. Quadr. Bis. p. 730. *Fig. p.* 732. (*Fig. mala*).
Gesn. Quadr. p. 331. *Fig. p.* 1099. (*Fig. bona*).
Jonst. Quadr. p. 53. *Fig. T.* 28. (*Fig. bona*).
Charlet. Exerc. p. 10.
Ibex, nonnullis Capricornus. *Klein. Quadr. p.* 16.
Ibex, vel Capricornus apud recentiores: Capra fera Varronis. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p.* 35. (*Fig. bona*).
Hircus Ferus, quoddam genus Cretæ familiare, quod galli *Bouc-Estain* appellant. *Bell. Obs. Fig. p.* 20. (*Fig. sat bona*).
Caper Montanus Alberti. *Aldro. Klein.*
Les Chaldéens l'appellent Jaela. *Gesn.*
Les Grecs, Τραγος ἄγριος.
Les Perses, Kotzcohi. *Gesn.*
Les Italiens & les Allemands, Steinboch. *Aldro. Gesn. Jonst. Raj.*
Les Suisses des montagnes, Ybsch. *Aldro. Gesn.*
Les Illyriens, Kozoroziecz. *Aldro. Gesn.*
Les Flamands, Wildgheit. *Aldrov.*

Il est un peu plus grand que le *Bouc domestique*. Il a la tête

Hirco domestico paulò major est. Caput habet pro mole corporis

corporis parvum; cornua vasta, suprà nodosa, infrà rotundata, parumper arcuata, & in dorsum reclinata: crura gracilia sunt; cauda brevis; pilus ut in *Hirco* longus, fulvus. Mas prolixam nigricantem barbam gerit: fœmina mare minor est. Habitat in *Alpibus*, *Helvetiâ*, & Archiepiscopatu *Saltzburgensi*.

petite à proportion de la grandeur de son corps : ses cornes sont très grandes, garnies de nœuds en dessus, arrondies en dessous, un peu courbées en arc, & couchées sur le dos : ses jambes sont menues ; sa queue courte ; son poil est long, comme celui d'un *Bouc*, & de couleur fauve. Le mâle porte une grande barbe noirâtre : la femelle est un peu plus petite que lui. On le trouve dans les *Alpes*, en *Suisse*, & dans l'Archevêché de *Saltzbourg*.

4. La Petite Chevre d'Amerique.

Hircus cornibus depressis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus... Capra parva Americana.

Capra cornibus depressis, incurvis, minimis, cranio incumbentibus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 2. & ed. 4. g. 30. sp. 2.*

Magnitudo *Hædi* : pili longi, uti in precedente (*Capra domestica*) ; cornua lunulata, vix digitum longa, crassa, cranio adpressa, ut cutem ferè perforent. *Huc usque Linnæus.* Habitat in *Americâ*.

Elle est de la grandeur d'un *Chevreau*. Ses poils sont longs, comme ceux de la *Chevre*; ses cornes, qui sont à peine de la longueur du doigt, sont grosses, courbées en croissant, & si bien appliquées à la tête, qu'elles percent presque la peau. On la trouve en *Amérique*.

5. Le Petit Chamois d'Amerique.

Hircus cornibus erectis, apice recurvis... Ibex parvus Americanus.

Capra cornibus erectis, apice recurvis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 3. & ed. 4. g. 30. sp. 3.*

Digitized by Google

Il eſt de la grandeur d'un *Chevreau* d'un an. Ses poils ſont courts, comme ceux du *Cerf*; ſes cornes, qui ſont à peine de la longueur du doigt, ſont élevées & courbées vers le bout. On le trouve en *Amérique*.

Magnitudo *Hædi* unius anni; pili breves, uti in cervino genere; cornua vix digitum longa. *Huc uſque Linnæus*. Habitat in *Americâ*.

** 6. LE CHAMOIS, OU L'YZARD.

Hircus cornibus teretibus erectis, rugoſis, ad apicem levibus & uncinatis... RUPICAPRA.

Capra cornibus erectis, uncinatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 5.*
Rupicapra. *Raj. Syn. Quadr. p. 78. No. 3.*
Geſn. Quadr. p. 321. Fig. p. 319. (Fig. ſat bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 36. (Fig. ſat bona).
Jonſt. Quadr. p. 52. Fig. T. 27. (Fig. mala). & T. 32. (Fig. non aquè mala).
Bell. Obſ. Fig. p. 57. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 9.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 223.
Rzac. auct. p. 319.
Tragus Dorcas; Rupicapra; Caprea. *Klein. Quadr. p. 17.*
Dorcas, ſive Rupicapra. *Aldro. Quadr. Biſ. p. 725. Fig. p. 727. (Fig. mala).*
Chamois. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 203. Fig. Pl. 29. (Fig. bonne).*
Kolbe. Tom. III. p. 38.
Les Hebreux l'appellent ZEBI. *Aldro.*
Les Chaldéens, THABIA. *Aldro.*
Les Arabes, THABIU. *Aldro.*
Les Perſes, AHU. *Aldro.*
Les Eſpagnols, CAPRA MONTÉS *Aldro. Geſn.*
Les Italiens, CAMUZA, *ou* CAMORCIA. *Geſn.*
Les Griſons, CAMUZA. *Aldro. Geſn.*
Les Peuples circonvoiſins de Trente, COMOZZA. *Charlet.*
Les Allemands, GEMSS, *ou* GAMSS. *Aldro. Geſn. Raj. Rzac.*
Les Bohémiens, KORYTANSKY; KOZLIK. *Aldro. Geſn.*
Les Polonois, DZYKA-KOZA. *Aldro. Geſn. Rzac.* KOSA SKALNA *Rzac.*
Les Anglois, WILD GOOTE. *Aldro. Geſn.*

Il eſt de la groſſeur d'une *Chévre*; mais il a les jambes plus longues, & le poil plus court. Ses

Capræ domeſticæ craſſitiem attingit; ſed crura ipſius longiora ſunt, & pilus brevior.

Digitized by Google

Cornua 8 circiter pollices longa, nigra, teretia, erecta, rugosa, ad apicem levia & uncinata. Labium superius parumper, ut in *lepore*, fissum. Auriculæ 5 pollices longæ, cauda 3 pollices. Pilus suprà fuscus est aut ruffus, infrà verò ex sordidè albo rufescit. Cauda nigricat, & quidem utrinque, nec subtùs alba est, ut in aliis. Habitat in *Alpibus Helveticis*, sed *Rhæticis* præcipuè frequens.

cornes ont environ 8 pouces de long; elles sont noires, rondes, droites & élevées, garnies de rides, comme autant de petits anneaux; mais lisses vers leur bout, qui est crochu. Sa lévre supérieure est un peu fendue, comme celle du *Liévre*. Ses oreilles sont longues de 5 pouces; sa queue de 3 pouces. La couleur de son poil est ordinairement brune ou rousse en dessus; & en dessous d'un blanc sale & roussâtre. Sa queue est noirâtre dessus & dessous. On le trouve dans les *Alpes Suisses*, mais sur tout chez les *Grisons*.

* 7. La Gazelle des Indes.

Hircus cornibus teretibus, longissimis, rectis, basi tantùm annulatis... Gazella Indica.

Capra cornibus teretibus rectissimis, longissimis, basi annulatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 32. sp. 8.*

Gazella Indica cornibus rectis, longissimis, nigris, propè caput tantùm annulatis. *Raj. Syn. Quadr. p. 79. No. 5.*
Klein. Quadr. p. 18.

Gazella. *Prosp. Alp. Ægypt. p. 232. Fig. T. 14. F. 1. (Fig. mala).*

Elan. *Kolbe. Tom. III. p. 32. Fig. p. 34. (Fig. bonne).*

Ipsius altitudo, à parte superiore dorsi usque ad terram, circiter 2 ½ pedum. Cornua, 3 propemodum pedes longa, nigra sunt, recta, ad basim tantùm annulis eminentibus cincta, in reliquâ longitudine levia. Cauda 1 pedis ferè longitudinem æquat. Pilus ei cinereus est. Habitat in *Indiâ*.

Elle a environ 2 ½ pieds de haut, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre. Ses cornes, qui ont près de 3 pieds de long, sont noires, droites, comme garnies d'anneaux seulement à la base; tout le reste de leur longueur est lisse. Sa queue est longue de près d'un pied. Tout son poil est gris. On la trouve dans l'*Inde*.

Digitized by Google

* 8. La Gazelle.

Hircus cornibus teretibus, dimidiato annularis, bis arcuatis. Gazella.

Capra cornibus teretibus dimidiato annularis, arcuatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 7.*

Gazella Africana, Strepſiceros Plinii. *Raj. Syn. Quadr. p. 79. No. 4.*

Tragus ſtrepſiceros, Gazella. *Klein. Quadr. p. 18.*

Capra ſtrepſiceros. *Aldro. Quadr. Bis. p. 740. ibi caput Fig. (Fig. bona). Jonſt. Quadr. p. 54. Fig. T. 24. (Fig. bona). Charlet. Exer. p. 10.*

Strepſiceros Jo. Caii. *Geſn. Icon. Quadr. p. 38. ibi caput Fig. (Fig. bona).*

Strepſiceros. *Geſn. Quadr. p. 323. Muſ. Worm. p. 339.*

Gazelle. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. 1. p. 95. Fig. Pl. 11. (Fig. très bonne).*

Les Arabes l'appellent Algazel. *Klein. Hiſt. de l'Acad.*

Les Grecs, Στρεψικερως.

Elle a à peu-près la forme & la grandeur d'un *Chevreuil*. Son poil eſt court, fauve par deſſus le corps, & blanc ſous le ventre & l'eſtomach. Ses jambes ſont longues & menues; ſa queue longue environ d'un pied, & noirâtre; ſes oreilles très grandes, ayant intérieurement quelques rayes d'un poil très blanc. Ses cornes, qui ont 15 pouces de long, ſont noires, comme garnies d'anneaux juſqu'à la moitié de leur longueur; le reſte eſt liſſe: elles ne ſont pas exactement droites, elles ſont un peu courbées en dehors vers le milieu, & elles ſe rapprochent enſuite en dedans comme les branches d'une lyre. Ces cornes ont à leur racine une touffe de poil plus long que celui du reſte du corps. On la trouve en *Afrique*.

Ad *Capreoli* formam & magnitudinem accedit. Pili breves ſunt, ſuprà fulvi, in ventre & thorace albi; crura longa & gracilia; cauda 1 pede circiter longa, nigricans; auriculæ maximæ, intùs lineis pilorum albis ſtriatæ. Cornua, 15 pollices longa, nigra ſunt, tranſverſim annulata uſque ad dimidiam partem, alterâ parte levi: non ſunt exactè recta, ſed circà mediam partem extrorsùm flexa, deinde introrsùm incurvata, ità ut lyram veterum figurâ ſuâ imitentur. Ad baſim cornuum ſunt pili, quàm in reliquo corpore longiores. Habitat in *Africâ*.

Digitized by Google

9. La Gazelle du Bezoar.

Hircus cornibus teretibus, rectis, ab imo ad summum ferè annulatis, apice tantummodò levi... Gazella Bezoartica.

Animal Bezoarticum Orientale. *Raj. Syn. Quadr. p.* 80.
Tragus Bezaarticus. *Klein. Quadr. p.* 19.
Capra sive Hircus Bezoartieus. *Aldro. Quadr. Bis. p.* 755. *Fig. p.* 756. (*Fig. sat bona*).
Capra sive Hircus Bezaarticus, vel potiùs Pazaharticus. *Jonst. Quadr. p.* 56.
Hircus Bezoarticus. *Charlet. Exer. p.* 11.
Capricerva. *Kæmpf. p.* 398. *Fig. p.* 407. *F.* 1. (*Fig. sat bona*).
Les Perses l'appellent Pasan. *Aldro. Jonst. Klein.* Pasen. *Kæmpf.*

Capram domesticam (aliquî *Cervum*) magnitudine adæquat. Pilis brevibus ex cinereo ruffis vestitur. Barbam gerit ut *Capra*. Cornua ipsi teretia sunt, recta, sat longa, ab imo ad summum ferè annulata, apice tantummodò levi. Cornua fœminis multò breviora quàm maribus. Habitat præcipuè in *Persidis* provinciâ *Laar*.

Elle est de la grandeur de la *Chévre domestique*, (quelques Auteurs disent du *Cerf*). Son poil est court, & d'un gris mêlé de roux. Elle a une barbe sous le menton, comme la *Chévre*. Ses cornes sont rondes, assez longues, droites, comme garnies d'anneaux presque du haut au bas; il n'y a que le bout qui soit lisse. Les femelles ont les cornes beaucoup plus courtes que les mâles. On la trouve dans la province de *Laar* en *Perse*.

** 10. La Gazelle d'Afrique.

Hircus cornibus teretibus, arcuatis, ab imo ad summum ferè annulatis, apice tantummodò levi... Gazella Africana.

Capra cornibus teretibus perfectè annulatis arcuatis. *Linn. Syst. nat. ed.* 6. *g.* 32. *sp.* 9.
Gazella Africana cornibus brevibus ab imo ad summum ferè annulatis, & circà medium inflexis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 80. *No.* 6. *Klein. Quadr. p.* 18.
Algazel ex Aphricâ. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p.* 893. (*Fig. bona*).

Elle eſt de la grandeur d'un *Chevreuil*. Son poil eſt court, doux au toucher, fauve ſur le dos, & blanc ſous le ventre & aux côtés. Sa queue eſt aſſez longue & noirâtre : ſon col eſt épais ; ſes jambes très déliées : les poſtérieures ſont plus longues que les antérieures. Ses oreilles ſont longues, larges & ouvertes, garnies intérieurement de bandes de poils blanchâtres. Ses cornes ſortent du milieu du front entre les deux yeux : elles ſont longues d'un pied, rondes, comme garnies d'anneaux preſque du haut au bas, n'ayant que la pointe de liſſe, & courbées en arc. Leur couleur eſt un maron foncé. On la trouve en *Afrique*, & en la *Nouvelle Eſpagne*.

Capreoli magnitudinem attingit. Pilo eſt brevi, levi, in dorſo fulvo, in ventre & lateribus candicante ; caudâ ſat longâ nigricante. Collum habet craſſum ; crura admodum gracilia ; poſteriora anterioribus longiora ; auriculas longas, magnas, patulas, intùs ſtriis piloſis candicantibus ornatas. Cornua è frontis medio inter oculos oriuntur ; uno pede longa ſunt, teretia, ab imo ad ſummum ferè annulata, apice tantummodo levi, arcuata : colore ſunt ex caſtaneo nigricante. Habitat in *Africâ* & *Novâ Hiſpaniâ*.

11. La Gazelle de la Nouvelle Espagne.

Hircus cornibus teretibus, circà medium inflexis, ab origine ad flexuram ſpiraliter canaliculatis, à flexurâ ad apicem levibus... Gazella Novæ Hispaniæ.

Tragulus Temamaçama. *Klein. Quadr. p.* 21.
Cervus Temamaçama, ſive Macatlchichiltic dictus. *Seb. Vol.* 1. *p.* 69. *Fig. T.* 42. *F.* 4. (*Fig. bona*).
Tamamaçame. *Jonſt. Quadr. p.* 63.
Temamaçame. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 325. (*Fig. mala*).

Elle eſt à peu-près de la grandeur d'un *Faon de Biche*. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un châtain clair, & court : ceux de ſa queue ſont plus longs : ſes oreilles ſont grandes : ſes cornes ſont d'un beau noir, rondes,

Hinnuli magnitudinem circiter æquat. Corpus undique veſtitur pilis dilutè ſpadiceis, & brevibus : cauda verò pilis longioribus obſita eſt ; auriculæ magnæ : cornua dilutè nigra ſunt, teretia, circà me-

Digitized by Google

dium inflexa, ab origine ad flexuram spiraliter canaliculata, à flexurâ verò ad apicem levia. Habitat in rupibus & altis montibus *Novæ Hispaniæ.*

courbées vers le milieu, cannelées en spirale depuis leur origine jusqu'à la courbure, & lisses dans le reste de leur longueur. On la trouve sur les rochers & les hautes montagnes de la *Nouvelle Espagne.*

* 12. La Chevre du Levant.

Hircus cornibus suprà rotundatis, infrà planis, semicirculum referentibus... Capra Orientalis.

Tragelaphus Bellonii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 81. *No.* 11.
Gesn. Icon. Quadr. p. 38. *Fig. p.* 39. (*Fig. bona*).
Tragelaphus. *Bell. Obs. Fig. p.* 57. (*Fig. bona*).

Arietis magnitudinem circiter adæquat. Pilus ei longus est & fulvus. Crura albicant. Os album est, ut etiam tota ventris pars inferior, & femora sub caudâ; nares verò & cauda nigræ. Colli pars prona & supina, sicut & pectus, villis ità longis obsita sunt, ut barbata videatur. Pili etiam scapularum longi sunt ac nigri: utrinque ad latera macula est cinerea. Ore, fronte, & auriculis *ovem* refert. Cornua ipsius suprà sunt rotundata, infrà plana, & semicirculum quodammodo referunt.

Elle est à peu-près de la grandeur d'un *Bellier.* Son poil est long & fauve: ses jambes sont blanchâtres: son museau est blanc, ainsi que toute la partie inférieure du ventre, & les cuisses vers la queue. Les narines & la queue sont noires. Elle a le col couvert dessus & dessous, ainsi que la poitrine, de poils si longs, qu'elle paroit avoir une barbe. Les poils qui couvrent les épaules sont aussi longs & noirs. Elle a de chaque côté vers les flancs une tache grise. Son museau, son front, & ses oreilles sont semblables à celles d'un *Bellier.* Ses cornes sont arrondies en dessus, applaties en dessous, & représentent en quelque façon un demi cercle.

Digitized by Google

13. La Chevre de Sirie.

Hircus cornibus minimis, erectis, parumper retrorsùm incurvis, auriculis longiſſimis, pendulis... Capra Syriaca.

Capra auribus pendulis longiſſimis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 32. ſp. 11.*
Capra Mambrina, ſeu Syriaca Geſneri, auribus ad terram ferè demiſſis. *Raj. Syn. Quadr. p. 81. No. 8.*
Capra auribus demiſſis. *Jonſt. Quadr. p. 57. Fig. T. 26. ſub illo nomine.*
Capra Mambrina. (*Fig. bona*).
Capra Mambrina. *Geſn. Quadr. p. 271.*
Capra Indica, aut Mambrina, aut Syriaca potiùs. *Geſn. Quadr. Fig. p. 1098.* (*Fig. bona*).
Capra Indica à recentioribus quibuſdam *Mambrina* cognominata. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 18.* (*Fig. bona*).

Elle eſt un peu plus grande que la *Chevre domeſtique*. Sa couleur eſt un fauve clair : ſes cornes ſont noires, longues de 2 ½ doigts, élevées, & un peu recourbées en arriere ; mais on la diſtingue très aiſément de toutes les autres eſpeces de ſon genre par ſes grandes & longues oreilles qui pendent juſqu'à terre. On la trouve ſur la montagne de *Mambre* en *Syrie*.

Capram domeſticam magnitudine antecellit. Pilo dilutè fulvo veſtitur. Cornua nigra ſunt, 2 ½ digitorum longa, erecta, & parumper retrorsùm incurva. In eo autem ab omnibus aliis ſui generis ſpeciebus maximè differt, quòd auriculas longiſſimas, uſque ad terram pendulas, habeat. Habitat in *Mambre*, *Syriæ* monte.

14. La Chevre de la Nouvelle Espagne.

Hircus cornibus teretibus, erectis, ab imo ad ſummum ſpiraliter intortis... Capra Novæ Hispaniæ.

Tragulus Mazame, ſeu Cervus cornutus, ex Novâ Hiſpaniâ. *Klein. Quadr. p. 21.*
Mazame ſeu Cervus cornutus ex Novâ Hiſpaniâ. *Seb. vol. 1. p. 69. Fig. T. 42. F. 3.* (*Fig. optima*).
Mazame ſeu Cervus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 324.* (*Fig. mala*). *Cornua ramoſa, quod malè.*
Maçame. *Jonſt. Quadr. p. 63.*

Pilus

Pilus totius corporis ſubruffus eſt, paulò tamen dilutior in capite & ventre. Caput habet & collum brevia & craſſia; auriculas magnas, & flaccidas; caudam craſſam & obtuſam. Cornua gerit teretia, erecta, parumper arcuata, ab imo ad ſummum ſpiraliter intorta. Habitat in *novâ Hiſpaniâ.*

Tout ſon corps eſt couvert d'un poil rouſſâtre: celui qui couvre la tête & le ventre eſt d'un roux moins foncé. Elle a la tête & le col gros & courts; les oreilles grandes & pendantes; la queue groſſe & obtuſe. Ses cornes ſont rondes, élevées, un peu courbées en arc, & cannelées en ſpirale du haut au bas. On la trouve dans la *nouvelle Eſpagne.*

15. La Chevre de Créte

Hircus laniger, cornibus teretibus, erectis, ab imo ad ſummum ſpiraliter intortis... Capra Cretensis.

Ovis cornibus erectis ſpiralibus. *Linn. Syſt. nat. ed. 6. g. 33. ſp. 2.*
Aries ſtrepſiceros cornibus erectis, & in ambitu canaliculatis, Cretenſis. *Klein. Quadr. p. 14.*
Ovis ſtrepſiceros Cretica Bellonii. *Raj. Syn. Quadr. p. 75. N°. 3.*
Cretenſis aries ſtrepſiceros nominatus. *Bell. Obſ. p. 20. Fig. p. 21.* [*Fig. bona*].
Strepſiceros Bellonii. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 37.* [*Fig. bona*].
Aries Cretenſis. *Aldrov. Quadr. Bis. p. 406. Fig. p. 407.* (*Fig. bona*).
Ovis Cretenſis. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 45.* [*Fig. bona*].

Ovis domeſticæ magnitudinem adæquat, eique ſimillima eſt in omnibus, exceptis cornibus, quæ non, ut *Ovibus*, reflexa ſunt, ſed teretia, recta, erecta, & ab imo ad ſummum ſpiraliter intorta. Habitat in *Creta*, & præſertim in *Monte Ida.*

Elle eſt de la grandeur de la *Brebis domeſtique*, & elle lui reſſemble en tout, excepté en ſes cornes, qui au lieu d'être contournées, comme dans les *Brebis*, ſont rondes, droites & cannelées en ſpirale du haut au bas. On la trouve en *Créte*, & ſur tout ſur le *Mont Ida.*

X.

Genus Arietis.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ

X.

Le Genre du Bellier.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents inciſi-

Digitized by Google

ves à la mâchoire ſupérieure, d'en avoir huit à l'inférieure :
D'avoir le pied fourchu :
Des cornes ſimples,
Tournées en arriere.

ſuperiore nulli, in inferiore octo :
Pes bifulcus :
Cornua ſimplicia ;
Retrorsùm verſa.

Obſ. Le grand nombre de nos Brebis domeſtiques, ſur-tout les femelles, n'ont point de cornes ; mais ces Animaux nous ſont trop familiers, pour que, malgré le défaut de ce caractere générique, nous puiſſions nous y méprendre.

Obſ. Plerœque Oves domeſticæ, præſertim fœminæ, carent cornibus ; ſed nobis nimis nota ſunt hæc Animalia, ùt hujus characteris generici defectus nos in errorem inducat.

** 1. LA BREBIS DOMESTIQUE.

Aries laniger, caudâ rotundâ, brevi... OVIS DOMESTICA.

Ovis cornibus compreſſis lunatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 33. ſp. 1. Faun. Suec. Linn. N°. 43.*
Ovis domeſtica, cujus mas Aries dicitur, fœtus Agnus. *Raj. Syn. Quadr. p. 73. No. 1.*
Sloane. vol. II. p. 328.
Aries, Ovis, Vervex, Agnus. *Klein. Quadr. p. 15.*
Ovis. *Aldro. Quadr. Bis. p. 370.*
Geſn. Quadr. p. 872. Fig. p. 873. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 14. [Fig. bona].
Jonſt. Quadr. p. 38.
Charlet. Exer. p. 8.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 242.
Rzac. Auct. p. 332.
Aries. *Geſn. Quadr. p. 912.*
Jonſt. Quadr. Fig. T. 22. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 9.
Vervex. *Geſn. Quadr. p. 925.*
Jonſt. Quadr. Fig. T. 22. [Fig. bona].
Charlet. Exer. p. 9.
Agnus. *Geſn. Quadr. p. 927.*
Jonſt. Quadr. Fig. T. 22. (Fig. bona).
Charlet. Exer p. 9.

Les François appellent le mâle BELLIER ; *lorſqu'il eſt châtré*, MOUTON ; *la femelle*, BREBIS ; *le jeune*, AGNEAU.
Les Latins le mâle, ARIES ; *lorſqu'il eſt châtré*, VERVEX ; *la femelle*, OVIS ; *le jeune*, AGNUS.
Les Hebreux le mâle, AIL, & EEL ; *la femelle*, ZON, ZONER ; *le jeune*, KLEBES. *Geſn. Aldro.*

Digitized by Google

Les Chaldéens le mâle, DIKERIN ; *la femelle*, ANA ; *le jeune*, IMAR. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs le mâle, Κριὸς ; *la femelle*, Οἶς.
Les Arabes le mâle, KABSA ; *la femelle*, GENAS ; *le jeune*, ELG. *Gesn. Aldro.*
Les Sarrasins, GANEME. *Gesn. Aldro.*
Les Perses le mâle, NERAMEISCH ; *la femelle*, GOSPAND ; *le jeune*, BARAH. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols le mâle, CARNERO ; *la femelle*, OVEIA ; *le jeune*, CORDERO. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens le mâle, MONTONE, *ou* ARIETE ; *la femelle*, PECORA ; *le jeune*, AGNA, AGNO, AGNELLO. *Gesn. Aldro.*
Les Suisses le mâle, HERMAN. *Gesn. Aldro.*
Les Illyriens OWCZE, *ou* SKOP. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, OWCA. *Rzac.*
Les Allemands le mâle, WIDER ; *la femelle*, SCHAAFF ; *le jeune*, LAMB ; L'MBLIN. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Flamands le mâle, WIDER ; *la femelle*, SCHAEF ; *le jeune*, LAM. *Aldro.*
Les Suedois, FOAR. *Linn.*
Les Anglois le mâle, RAM, *ou* TUP ; *la femelle*, SHEEPE ; *le jeune*, LAMBE, *ou* HOGG. *Gesn. Aldro.*
Les Ecossois, HEIRTH. *Aldro.*
Les Habitans de Madagascar, AGARONE, *Aldro.*

Ovis est animal ita notum, ut descriptione non indigeat. Habitat in omnibus ferè locis cultis.

La Brebis est trop connue, pour qu'il soit nécessaire d'en faire la description. On la trouve dans presque tous les lieux habités.

** 2. LA BREBIS A LARGE QUEUE.

Aries laniger, caudâ latissimâ... OVIS LATICAUDA.

Ovis cornibus compressis, lunatis. Ovis laticauda. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 33. sp. 1.*
Ovis laticauda Arabica. *Raj. Syn. Quadr. p. 74. N°. 2.*
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 15. [Fig. bona, excepta caudâ]. Aldro. Quadr. Bis. p. 404.
Ovis Arabica. *Jonst. Quadr. p. 44. Fig. T. 23. [Fig. bona].*
Aries sive Ovis Orientalis. *Klein. Quadr. p. 14.*
Ovis Turcica. *Charlet. Exer. p. 9. Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 243.*
Les Italiens l'appellent PECORA D'ARABIA CON LA CODA LARGA. *Gesn.*
Les Allemands, SCHAAFFUSZ ARABIA MIT EINEM BREITEN SCHWANTZ. *Gesn.*

Digitized by Google

Elle eſt un peu plus grande que la précédente: elle en diffère encore par ſa queue très épaiſſe & extrêmement large. J'en ai vû qui avoient 1 pied de large & 3 pouces d'épaiſſeur: elles avoient à peu près la figure d'un couſſin. On la trouve en *Afrique*, en *Syrie*, & en *Arabie*.

A precedente differt magnitudine, quâ eam paulùm antecellit, & caudâ craſſiſſimâ & latiſſimâ. Hujuſmodi caudas vidi 1 pede latas, & 3 pollicum craſſas. Cubital figurâ ſuâ ſat benè imitabantur. Habitat in *Africâ*, *Syriâ*, & *Arabiâ*.

3. La Brebis a longue queue.

Aries laniger, caudâ longiſſimâ... Ovis longicauda.

Ovis Arabica altera. *Raj. ſyn. Quadr. p.* 74.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 15. [*Fig. bona*].
Ovis Arabiæ longicauda. *Aldrov. Quadr. Biſ. p.* 404. *Fig. p.* 405. [*Fig. mala*].
Ovis Arabica. *Jonſt. Quadr. p.* 44. *Fig. T.* 23. [*Fig. bona*].
Les Italiens l'appellent Pecora d'Arabia, con la coda longa. *Geſn.*
Les Allemands, Anderley Schaaffusz Arabia, mit einem langen Schwantz. *Geſn.*

Celle-ci ne différe de la *Brebis domeſtique* que par la longueur de ſa queue, qui a quelquefois juſqu'à 3 pieds de long. On la trouve en *Arabie*.

Hæc ab *Ove domeſticâ* differt tantùm longitudine inſolitâ caudæ, quæ interdùm 3 pedes longa eſt. Habitat in *Arabiâ*.

4. La Brebis d'Afrique.

Aries piloſus, pilis brevibus veſtitus... Ovis Africana.

Ovis Africana pro vellere lanoſo pilis brevibus hirtis veſtita. *Raj. Syn. Quadr. p.* 75. *N°.* 4.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Ovis Æthiopica. *Charlet. Exer. p.* 9.

Elle reſſemble à la *Brebis domeſtique* par la forme extérieure du corps; mais au lieu d'avoir, comme elle, le corps couvert de laine, elle l'a couvert de poils courts. On la trouve en *Afrique*.

Quoad formam corporis externam *Ovibus domeſticis* perſimilis eſt; ſed loco lanæ, corpus pilis brevibus veſtitur. Habitat in *Africâ*.

Digitized by Google

5. La Brebis de Guinée.

Aries pilosus, pilis brevibus vestitus, jubâ longissimâ, auriculis longis pendulis... Ovis Guineensis.

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 33. sp. 3.*
Ovis Guineensis sive Angolensis Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 75. N°. 5.*
Sloane. Vol. II. p. 328.
Aries Guineensis. *Klein. Quadr. p. 14.*
Jonst. Quadr. Fig. T. 46. [*Fig. bona*].
Barr. Hist. Fr. Eq. p. 149.
Aries Guineensis, sive Angolensis. *Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 234.* (*Fig. bona*).
Aries albus Judæorum. *Klein:*
Caper Mambrinus. *Charles. Exer. p. 10.*
Les Congois l'appellent Memeriam Bacala. *Marcgr.*

Ovis domesticæ magnitudinem æquat. Sicut illa, colore variat. Occipitium magis prominet: auriculæ longæ sunt & pendulæ; caput crassum; cornua parva, deorsùm, usque ad oculos, incurvata, & quasi torta. Cauda usque ad suffragines. Lanâ caret; sed pilis brevibus universum corpus, excepto collo inferiore longissimis pilis obsito, vestitur. Habitat in *Guinea* & *Brasilia*.

Elle est de la grandeur de notre *Brebis domestique*. Elle varie en couleur, comme elle. Le derriere de sa tête est plus élevé: ses oreilles sont longues & pendantes; sa tête grosse; ses cornes petites, recourbées en arriere, comme tortillées, & revenant jusqu'aux yeux. Sa queue lui descend jusqu'aux jarrêts. Elle n'a point de laine: tout son corps est couvert de poils très courts, excepté la partie inférieure du col, qui est couverte de poils très longs. On la trouve en *Guinée* & au *Brésil*.

XI.

Genus Bovinum.

Hujus character est:
Dentes incisores in maxillâ

XI.

Le Genre des Bœufs.

Son caractere est
De n'avoir point de dents inci-

sives à la mâchoire supérieure, d'en avoir huit à l'inférieure :

superiore nulli, in inferiore octo :

D'avoir le pied fourchu :
Des cornes simples,
Tournées vers les côtés.

Pes bisulcus :
Cornua simplicia,
Ad latera versa.

** 1. Le Bœuf domestique.

Bos cornibus levibus, teretibus, sursùm reflexis... Bos domesticus.

Bos cornibus teretibus flexis. Taurus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 34. sp. 1. Faun. Suec. Linn. N°. 44.*
Bos domesticus. *Raj. syn. Quadr. p. 70. N°. 1.*
Jonst. Quadr. p. 26. Fig. T. 13. 14. 15. (Fig. bonis).
Sloane. Vol. II. p. 327.
Charlet. Exer. p. 8.
Bos. *Aldrov. Quadr. Bif. p. 13. Fig. p. 36. (Fig. bona).*
Gesn. Quadr. Fig. p. 24. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 12. (Fig. bona).
Raei. Hist. Nat. Pol. p. 237.
Raei. Auct. p. 329.
Taurus domesticus cum Vacca. *Klein. Quadr. p. 10.*
Taurus. *Gesn. Quadr. Fig. p. 103. [Fig. bona].*
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 10. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 8.
Vacca. *Gesn. Quadr. Fig. p. 25. (Fig. bona).*
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 11. [Fig. bona].
Charlet. Exer. p. 8.
Vitulus. *Gesn. Quadr. p. 124.*
Taureau. *Hist. Nat. Gen. & Part. ed. in-quarto. Tom. IV. p. 474. Fig. Pl. XIV. & ed. in-12. Tom. VIII. p. 138. Fig. Pl. IV. [Fig. tres bonnes.]*
Les François appellent le mâle Taureau ; *lorsqu'il est châtré*, Bœuf ; *la femelle*, Vache ; *le jeune*, Veau.
Les Latins le mâle, Taurus ; *lorsqu'il est châtré*, Bos ; *la femelle*, Vacca ; *le jeune*, Vitulus.
Les Hébreux le mâle, Schor ; *lorsqu'il est châtré*, Aleph ; *la femelle*, Baka ; *le jeune*, Egel. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens le mâle, Thor, *ou* Tora ; *la femelle*, Torata ; *le jeune*, Egela. *Gesn. Aldro.*
Les Arabes le mâle, Taur ; *le jeune*, Egela. *Gesn.*
Les Grecs, Βοῦς.

Digitized by Google

Les Eſpagnols le mâle, TORO BUYREZIO ; *lorſqu'il eſt châtré*, BUEY ; *la femelle*, VACA ; *le jeune*, TERNERA. *Geſn. Aldro.*

Les Italiens le male, TORO ; *lorſqu'il eſt châtré*, BUE ; *la femelle* VACCA ; *le jeune*, VITELLO. *Geſn. Aldro.*

Les Illyriens, WUL. *Geſn. Aldro.*

Les Polonois, WOL. *Rzac.*

Les Allemands le mâle, STIER ; *lorſqu'il eſt châtré*, OCHSS, ou RIND ; *la femelle*, KŪ, ou KŪHE ; *le jeune*, KALB. *Geſn. Aldro.*

Les Flamands le mâle, STIER ; *lorſqu'il eſt châtré*, OS ; *la femelle*, KOE ; *le jeune*, CALF. *Aldro.*

Les Suédois, KO, NÖT. *Linn.*

Les Anglois le mâle, BULL ; *lorſqu'il eſt châtré*, OX ; *la femelle*, COW ; *le jeune*, CALF. *Raj. Geſn. Aldro.*

Bos eſt Animal ità notum, ut deſcriptione non indigeat. A reliquis ſui generis differt cornibus ſuis levibus & minimè rugoſis, ſurſùm reflexis. Habitat ubique in locis cultis. Ampliſſimè deſcribitur in libro cui titulus : *Hiſtoire Nat. Gén. & Part.* Ed. *in-4°. Vol. IV. p.* 474. *& ſeq.* & Ed. *in-12. Vol. VIII. p.* 138. *& ſeq.*

Le Bœuf eſt un Animal ſi connu, qu'il n'eſt pas néceſſaire d'en faire la deſcription. On le diſtingue aiſément de ceux de ſon genre par ſes cornes liſſes, & recourbées en enhaut. On le trouve dans tous les lieux habités. On le trouvera amplement décrit dans l'*Hiſt. Nat. Gén. & Part.* Ed. *in-4°. Tom. IV. p.* 474. *& ſuiv.* & Ed. *in-12. Tom. VIII. p.* 138. *& ſuiv.*

2. LE BUFFLE D'AFRIQUE.

Bos cornibus teretibus, ſurſùm reflexis, inſoſe recurvis. BUBALUS AFRICANUS.

Bos Africanus Bellonii, quem pro Bubalo veterum habet. *Raj. Syn. Quadr. p.* 73. *N°.* 6.

Exiguus Africanus Bos. *Klein. Quadr. p.* 11.

Elegans & parvus Africanus Bos, quem veteres Græci *Bubalum* appellarunt. *Bell. Obſ. Fig. p.* 119. (*Fig. bona*).

Bubalus. *Geſn. Quadr. p.* 330.

Bubalus Africanus. *Charlet. Exer. p.* 8.

Bubalus Africanus Bellonii. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 33. [*Fig. bona*].

Bubalus veterum. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 363. *Fig. p.* 364. (*Fig. bona*). *Jonſt. Quadr. p.* 37. *Fig. T.* 18. *ſub iſto nomine*, Bubalus Africanus. [*Fig. ſat bona*].

Digitized by Google

Silveſtris Juvenca. *Proſp. Alp. Ægypt. Vol. II. p.* 233. *Fig. T.* 14. *Fig.* 2. (*Fig. bona*).

Les Hébreux l'appellent JACHMUR. *Geſn.*

Les Perſes, MOSKANDAZ. *Geſn.*

Sa grandeur tient le milieu entre celles du *Cerf* & du *Chevreuil*. Il a le col court & épais ; la peau qui y pend eſt courte : ſes épaules ſont larges & épaiſſes ; ſes jambes courtes : ſa queue, qui lui deſcend juſqu'aux jarrêts, eſt couverte de poils noirs, une fois plus gros que le crin des Chevaux ; ſes cornes ſont noires, rondes, courbées en enhaut en forme de croiſſant, & leurs deux pointes ſe touchent preſque. Ses poils ſont jaunes, liſſes, & luiſans ; ſon ventre eſt cependant d'un roux jaunâtre ; & ſon dos approche du brun. On le trouve en *Afrique*.

Corpore minor eſt *Cervo* ; ſed *Capreolo* major. Collum habet craſſum & breve, exiguis prædituм palearibus ; armos elatos & plenos ; crura brevia ; caudam ad poplites uſque promiſſam, nigris pilis obſitam, duplo quàm Equini craſſioribus ; cornua nigra, teretia, ſurſùm lunæ creſcentis in modum reflexa, in ſeſe recurva. Pili ejus flavi ſunt, ſplendentes & leves : venter ex ruſſo flaveſcit ; dorſum verò ad fuſcum accedit. Habitat in *Africa*.

3. L'AUROCHS.

Bos cornibus craſſis, brevibus, ſurſùm reflexis, fronte criſpâ. URUS.

Bos cornibus teretibus flexis. Urus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 34. *ſp.* 1.

Urus, Biſon. *Klein. Quadr. p.* 11.

Urus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 70. *N°.* 2.

Aldro. Quadr. Biſ. p. 346. *Fig. p.* 348. [*Fig. mala*], & *p.* 349. (*Fig. ſat bona*).

Geſn. Quadr. Fig. p. 157. [*Fig. mala*].

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 29. [*Fig. ſat bona*]. & *p.* 30. [*Fig. mala*].

Jonſt. Quadr. p. 36. *Fig. T.* 20. [*Fig. ſat bona*].

Charlet. Exerc. p. 8.

Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 228.

Rzac. Auct. p. 323.

Les Allemands l'appellent UROCHS, *ou* AUROCHS. *Raj. Geſn. Aldro.* AVEROCHS. *Rzac.*

Les Illyriens, ZUBR. *Geſn. Aldro.*

Les

Les Polonois & les Lithuaniens, THUR. *Klein. Gesn. Aldro.* TUR; WOTDZIKI. *Rzac.*
Les Flamands, UROS. *Aldro.*
Les Anglois, BULGES, *ou* BUFFES. *Gesn. Aldro.*

Quoad formam corporis externam & colorem, *Bovi domestico* similis est; ab eo autem differt magnitudine, quæ ad Elephantinam accedit; cornuum brevitate, crassitie, & validitate; & fronte crispâ. Habitat in *Polonia*, *Borussia*, *Livonia*, & *Moscovia*.

Il ressemble au *Bœuf domestique* par la forme extérieure du corps & la couleur; mais il en différe par sa grandeur, qui approche de celle de l'Elephant; par ses cornes courtes, grosses, & fortes; & par un bouquet de poils frisés qu'il a sur le front. On le trouve en *Pologne*, en *Prusse*, dans la *Livonie*, & dans la *Moscovie*.

** 4. LE BUFFLE.

Bos cornibus compressis, sursùm reflexis, resupinatis, fronte crispâ... BUBALUS.

Bos cornibus vastis, intortis, resupinatis. Bubalus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 34. sp. 4.*
Bubalus. *Raj. Syn. Quadr. p. 72. No. 5.*
Gesn. Quadr. Fig. p. 139. (Fig. mala).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 13. (Fig. mala).
Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 228.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 239.
Buffelus. *Klein. Quadr. p. 10.*
Charlet. Exer. p. 8.
Buffelus, sive Bubalus vulgaris. *Aldro. Quadr. Bis. p. 365. Fig. p. 366. (Fig. pessima).*
Jonst. Quadr. p. 38. Fig. T. 20. (Fig. bona).
Buffle. *Kolbe. Tom. III. p. 25. Fig. p. 54. f. 3. (Fig. tres bonne).*
Les Grecs l'appellent Βούβαλις.
Les Espagnols, BUFANO. *Klein. Gesn. Aldro.*
Les Italiens, BUFALO. *Raj. Gesn.*
Les Allemands, BUFFEL. *Gesn. Aldro.*
Les Illyriens, BAUWOL. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, BAWOL. *Rzac.*
Les Anglois, BUGILL. *Gesn. Aldro.*

Digitized by Google

Il eſt plus grand que le *Bœuf domeſtique* ; il a le corps plus épais, & plus fort ; la peau très dure ; la tête petite, à proportion du corps. Il porte ſur le front un bouquet de poils friſés. Tout ſon corps eſt couvert de poils noirs, ou noirâtres ; ſes cornes ſont noires, groſſes, un peu applaties, recourbées en enhaut, & un peu couchées ſur le dos. On le trouve en *Italie* dans l'*Etat Eccléſiaſtique*, & dans le Royaume de *Naples*.

Bove domeſtico major eſt ; corpore craſſiore & robuſtiore; cute duriſſimâ ; capite parvo, reſpectu corporis ; fronte criſpâ. Pilus totius corporis eſt niger, aut nigricans, ſicut & cornua, quæ craſſa ſunt, paululùm compreſſa, ſurſùm reflexa, & parumper reſupinata. Habitat in *Italia* in *Statu Eccleſiaſtico*, & Regno *Neapolitano*.

5. Le Biſon blanc.

Bos cornibus ſurſùm reflexis, jubâ longiſſimâ... Biſon albus.

Biſon albus Scoticus, vel Calydonius. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 122. *Fig. p.* 123.
Aldro. Quadr. Biſ. p. 357.
Biſon Scoticus. *Jonſt. Quadr. p.* 37.

Il ne differe du *Bœuf domeſtique*, que parce qu'il eſt tout blanc, & qu'il a le col garni de poils très longs. On le trouve en *Ecoſſe*, dans la partie de la forêt de *Calydoine*, appellée *Cummirland*.

A *Bove domeſtico* differt colore, qui per univerſum corpus albus eſt, & jubâ in collo longiſſimâ. Habitat in *Scotiâ*, in eâ parte *Calydoniæ* ſylvæ, quæ *Cummirland* appellatur.

6. Le Biſon.

Bos cornibus ſurſùm reflexis, dorſo gibboſo, jubâ, barbâque longiſſimis... Biſon.

Bos jubâ longiſſimâ dorſo gibboſo. Biſon. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 34. *ſp.* 3.
Taurus Ferus. *Klein. Quadr. p.* 11.
Biſon. *Raj. Syn. Quadr. p.* 71. *No.* 3.
Geſn. Quadr. p. 143.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 31. (*Fig. bona*).

Digitized by Google

Aldro. Quadr. Biſ. p. 353. *Fig. p.* 355. [*Fig. bona*].
Jonſt. Quadr. p. 36. *Fig. T.* 17. *ſub illo nomine*, Biſon jubatus. [*Fig. bona*].
Charlet. Exer. p. 8.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 214.
Les Grecs l'appellent Βίσων.
Les Allemands, WISENT. *Raj. Geſn. Aldro. Jonſt.*
Les Polonois, ZUBER. *Geſn. Rzac.*
Les Lithuaniens, SUBER. *Geſn.*

Bovem domeſticum magnitudine circiter æquat : ab illo autem differt cornuum amplitudine, barbâ longiſſimâ, collo ad armos uſque jubis horrido, & dorſo in gibbum aſſurgente. Habitat in *Germaniâ*.

Il eſt à peu près de la grandeur du *Bœuf domeſtique* : il en différe par la grandeur de ſes cornes, par ſa grande barbe, par les longs poils dont ſon col eſt couvert juſqu'aux épaules, & par la boſſe qu'il a ſur le dos. On le trouve en *Allemagne*.

7. LE BISON D'AMERIQUE.

Bos cornibus ſurſùm reflexis, dorſo gibboſo, capite pilis longiſſimis obſito... BISON AMERICANUS.

Bos jubâ longiſſimâ, dorſo gibboſo. Taurus Mexicanus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 34. *ſp.* 3.
Biſon Indicus. *Klein. Quadr. p.* 13.
Taurus Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 587. (*Fig. bona*).
Taurus Quiviræ regionis. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 10.
Taurus Quiviræ Provinciæ. *Jo. de Laet. p.* 303.
Taurus Quivirenſis. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 181. (*Fig. bona*).
Biſon Ameriquain. *Cat. App. Fig. p.* 20. (*Fig. tres bonne*).
Euffle. *Cat. Rec. des Bêtes. p.* 27.

Bovis domeſtici altitudinem non attingit. Femora & crura habet brevia & craſſa ; caput amplum, ſicut & pectus, corporis poſteriore parte multò ſtrictiore ; caudam 1 pede longam, per totam longitudinem nudam, extremitate tantùm pilis longis obſitam ;

Il eſt moins haut que le *Bœuf domeſtique*. Ses cuiſſes & ſes jambes ſont courtes & groſſes ; ſa tête large, ainſi que ſa poitrine ; & la partie poſtérieure de ſon corps étroite : ſa queue, qui a un pied de long, n'a de poils qu'une touffe de longs crins à ſon extrémité : ſes cornes ſont groſſes à leur ra-

Digitized by Google

cine, recourbées en enhaut, & rentrantes en dedans. Il a ſur le dos une boſſe très groſſe & très élevée. La couleur de ſon poil eſt un brun noirâtre : tout ſon corps eſt couvert, en hyver ſeulement, d'un poil long & rude, qui tombe en été, & laiſſe voir une peau noire & ridée : il n'y a que la tête qui demeure velue toute l'année. Le poil qui eſt ſur le front du mâle, eſt long d'un pied, épais, & friſé. On le trouve en *Amérique*. Il ſe tient éloigné des endroits habités, & près des montagnes.

cornua in exortu craſſa, ſurſùm reflexa, introrſùm recurva ; gibbum in dorſo craſſum & elatum. Pilorum color ex fuſco nigreſcit : per hiemem tantùm corpus univerſum veſtitur pilis longiſſimis, rigidis, quos æſtate amittit, unde cutis nigra, rugoſa, detecta remanet ; caput verò per totum annum pilis longis obſitum eſt. Frons maris pilis uno pede longis, denſis, & criſpis donatur. Habitat in *Americâ* longè à locis cultis, & propè montes.

8. Le Bœuf Sauvage.

Bos cornibus deorsùm inflexis, jubâ ſuprà collum longiſſimâ. Bonasus.

Bos jubâ longiſſimâ, cornibus in ſe flexis. Bonaſus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 34 ſp. 2.*

Bonaſus. *Raj. Syn. Quadr. p. 71. N°. 4.*

Geſn. Quadr. p. 145. (*caput in ea Fig. ſed cornua malè contorquentur*).

Geſn. Icon. Quadr. p. 32. [*ibi ineſt eadem capitis figura, ut ſuprà ; ſed cranium & cornua benè figurantur*].

Aldro. Quadr. Biſ. p. 358. *Fig. p.* 361. (*eædemſunt figuræ ac in Geſn. Iconibus. p.* 32.)

Jonſt. Quadr. p. 37. *Fig. T.* 18. (*Fig. bona, ſi jubam haberet*) ; & *T.* 19. (*in T.* 18 *juba caret, quod malè ; in* 19 *verò cornua malè contorquentur*).

Charlet. Exer. p. 8.

Les Grecs l'appellent Βόνασος.

Les Allemands, Wilde Buffel. *Geſn.*

Les Bohémiens, Loni. *Geſn.*

Les Péoniens, Monops. *Geſn.*

Il eſt de la grandeur du *Bœuf domeſtique* ; mais il eſt plus court, & plus large. La partie ſupérieu-

Bovis domeſtici magnitudine eſt ; ſed latior & brevior. Colli pars ſuperior, à cervi-

ce ad armos usque, jubata est, ut *Equi*. Capronæ ad oculos usque propendent. Cornua pulchrè & splendidè nigra sunt, & deorsùm inflexa. Cauda brevis est. Color toto ferè corpore flavus. Habitat in *Pæoniâ*, monte *Messapo*.

re de son col est garnie, depuis la tête jusqu'aux épaules, de poils très longs : ceux du devant de la tête lui descendent jusqu'aux yeux. Ses cornes, qui sont d'un beau noir, sont recourbées en enbas. Sa queue est courte. Son poil est jaune presque partout le corps. On le trouve en *Péonie* sur le mont *Messapus*.

SECTIO II.

Ea quorum cornua sunt ramosa.

IN illâ Sectione unicum est Genus, scilicet *Cervinum*.

XII.

Genus Cervinum.

Hujus character est
Dentes incisores in maxillâ superiore nulli, in inferiore octo :
Pes bisulcus :
Cornua ramosa.

Obs. In hoc Genere Ruminantium mares omnes cornua ramosa gerunt; fœminæ verò sunt acornes, si duas excipias, scilicet *Rangiferam fœminam*, & *Cervam Groenlandicam*

SECTION II.

Ceux dont les cornes sont branchues.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, qui est celui des *Cerfs*.

XII.

Le Genre des Cerfs.

Son caractere est
De n'avoir point de dents incisives à la mâchoire supérieure; d'en avoir huit à l'inférieure :
D'avoir le pied fourchu :
Des cornes branchues.

Obs. Dans ce Genre de Ruminants, tous les mâles ont des cornes branchues; les femelles au contraire, si l'on en excepte celles du *Rhenne* & du *Cerf de Groenland*, n'ont point du tout de cornes.

** 1. Le Cerf.

Cervus cornibus teretibus, ad latera incurvis... Cervus.

Cervus cornibus ramosis, teretibus, incurvis. Cervus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 3.*
Faun. suec. Linn. No. 38.
Cervus nobilis. *Klein. Quadr. p. 23.*
Cervus. *Raj. Syn. Quadr. p. 84. No. 1.*
Aldro. Quadr. Bis. p. 769. Fig. p. 774. (Fig. bona).
Gesn. Quadr. Fig. p. 354. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. p. 43. Fig. p. 44. (Fig. bona).
Jonst. Quadr. p. 58. Fig. T. 32. & 35. (Fig. sat bonis).
Mus. Worm. p. 338.
Charlet. Exer. p. 11.
Rzac. Hist. nat. Pol. p. 216.
Rzac. Auct. p. 308.
Les François appellent le mâle Cerf ; *la femelle*, Biche ; *& le jeune*, Faon.
Les Latins le mâle, Cervus ; *la femelle*, Cerva ; *le jeune*, Hinnulus.
Les Hébreux le mâle, Aial ; *la femelle*, Aial ; Aiala ; aielet ; *le jeune*, Ofer. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, Aiela. *Gesn. Aldro.*
Les Arabes, Aial. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Ελαφος.
Les Perses, Gevazen. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols le mâle, Ciervo ; *la femelle*, Cierva. *Gesn. Aldrov.*
Les Italiens le mâle, Cervo ; *la femelle*, Cerva. *Gesn. Aldrov.*
Les Allemands le mâle, Hirts, *ou* Hirs, *ou* Hirsch ; *la femelle*, Hinde, *ou* Hindin ; *le jeune*, Hinde Kalb. *Gesn. Aldrov. Rzac.*
Les Illyriens, Gelen. *Gesn.*
Les Polonois le mâle, Jelienii ; *la femelle*, Lanii. *Gesn. Aldro.* Jelen. *Rzac.*
Les Suédois, Hiort ; Kronhiort. *Linn.*
Les Anglois, Reddéer : *ils appellent le mâle* Stagg, *ou* Hart ; *la femelle*, Find ; *le jeune*, Calf. *Raj. Gesn.*

Le Cerf est un animal si connu, qu'il n'est pas besoin d'en faire une ample description. Il a depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, environ 3 ½ pieds, & depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 6 pieds. Ses cornes ont environ 2 ½ pieds

Cervus est animal ita notum, ut amplâ descriptione non indigeat. A parte superiore dorsi ad terram usque, 3 ½ pedum altus est ; ab extremitate verò oris ad caudam, 6 pedes longus. Cornua ipsius 2 ½ pedes circiter longa

Digitized by Google

sunt, parumper ad latera incurvantur, suntque teretia & ramosa, & quisque ramus in acutum desinit. Caput habet oblongum; oculos & auriculas sat magnas; collum longum & gracile; caudam brevem; crura maximè gracilia. Pilus ei mollis, in dorso ex ruffo flavescit; in ventre parumper candicat. Dorsi color in fœminis, præsertim in *Hinnulis*, plerumque maculis albis variegatur. Habitat in sylvis.

de long; elles sont un peu courbées sur les côtés, & sont rondes & branchues; & chaque branche se termine en pointe. Sa tête est longue; ses yeux & ses oreilles assez grandes: son col est long & effilé; sa queue courte; ses jambes très menues. Son poil est doux au toucher, & est d'un roux jaunâtre sur le dos, & blanchit un peu sous le ventre. La couleur du dos est le plus souvent variée de taches blanches dans les femelles, & sur tout dans les jeunes. On le trouve dans les forêts.

2. LE CERF D'ALLEMAGNE.

Cervus cornibus teretibus, ad latera incurvis, collo infrà juba-to... CERVUS GERMANICUS.

Tragelaphus. *Aldro. Quadr. Bis. p.* 857. *Fig. p.* 858.
Jonst. Quadr. p. 63.
Charlet. Exer. p. 12.
Tragelaphus, idest, Hirco-Cervus. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 1101.
Tragelaphus quorumdam. *Gesn. Icon. Quadr. p.* 46. *Fig. p.* 47.
Hippelaphus. *Jonst. Quadr. Fig. T.* 35.
Les Allemands l'appellent BRANDHIRTS. *Gesn. Charlet.*

Præcedente major est. Præterea ab eo differt, quòd habeat collum pilis longis vestitum; & colore, qui in suprema dorsi parte cinereus est, & in ventre nonnihil nigrescens. Habitat in *Misenæ* saltibus, *Boëmiæ* vicinis.

Il est plus grand que le précédent. Il en diffère en outre parce qu'il a le col garni de longs poils, & par sa couleur, qui est grise sur le dos, & un peu noire sous le ventre. On le trouve dans les forêts de *Misene*, proche la *Bohême*.

Digitized by Google

3. Le Cerf de Canada.

Cervus cornibus teretibus, ab imo ad ſummum cute pilosâ tectis... Cervus Canadensis.

Cervus Canadenſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 84.
Klein. Quadr. p. 23.
Cerf de Canada. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 2. *p.* 67. *Fig. Pl.* 45. (*Fig. bonne*).

Il a, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, 4 pieds. Ses cornes ſont longues de 3 pieds : elles ſont rondes & branchues, & couvertes d'un bout à l'autre d'une peau fort dure & garnie d'un poil épais & court, de même couleur que celui du corps, qui eſt d'un fauve un peu obſcur. Du reſte il reſſemble aſſez à notre Cerf. On le trouve dans le *Canada*.

A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 4 pedes altus eſt. Cornua 3 pedes longa, teretia ſunt, ramoſa, ab imo ad ſummum tecta cute undique obſita pilis brevibus & denſis, ejuſdem coloris ac pili corporis, qui ſunt obſcurè fulvi. In reliquis Cervo noſtrati ſimilis eſt. Habitat in *Canada*.

4. Le Cerf de Groenland.

Cervus cornibus teretibus, ab imo ad ſummum cute pilosâ tectis, naſo piloſo... Cervus Groenlandicus.

Caprea Goenlandica. *Raj. Syn. Quadr. p.* 90. *No.* 8.
Daim de Groenlande. *Edwards. Part.* 1. *Fig. p.* 51. (*Fig. bonne*).

Il eſt beaucoup plus épais que ne le ſont tous les Animaux de ce genre. Par la proportion de toutes ſes parties, il reſſemble plus à un *Veau*, qu'à un *Cerf*. Il a, depuis le haut des épaules juſqu'à terre, environ 3 pieds. Son col eſt beaucoup plus court, & ſes jambes plus groſſes qu'elles ne ſont ordinairement dans le genre des *Cerfs* : ſa queue eſt courte;

Multò craſſior eſt quàm alia omnia hujus generis Quadrupeda. Craſſitie ſuorum omnium partium, *Vitulo* magis ſimilis eſt, quàm *Cervo*. A parte ſuperiore humerum uſque ad terram, 3 circiter pedes altus eſt. Collum multò brevius, & crura craſſiora, quàm in Cervino genere eſſe ſolent. Cauda brevis ; oculi

ſac

sat magni ; cornua 1 ½ pede circiter longa, teretia sunt, ramosa, & sicut in precedente, tecta ab imo ad summum cute pilis fulvis undique obsitâ ; & (quod ei maximè singulare) nasus pilis undique tectus est, in ea etiam parte, quæ in aliis hujus generis cute nudâ & humidâ tegitur. In æstu pili ei breves sunt, molles & dilutè cinerei ; in hieme verò, inter hos primos proveniunt alii pili longi & rigidi, ex fulvo, fusco, & albo variegati. Hujus speciei fœmina cornigera est sicut & mas. Habitat in *Groenlandiâ.*

ses yeux assez grands : ses cornes sont longues d'environ 1 ½ pied ; elles sont rondes & branchues, & couvertes, comme dans le précédent, d'un bout à l'autre d'une peau garnie de poils fauves. Mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est son nez qui est tout-à-fait garni de poils, même dans cette partie qui, dans les autres n'est qu'une peau nue, & humide. Il est couvert en été d'un poil doux & court, d'un joli petit gris ; & en hyver, il sort du fond de ce premier poil, d'autres poils longs & rudes, variés de fauve, de brun, & de blanc. La femelle de cette espece a des cornes comme le mâle. On le trouve dans le *Groenland.*

** 5. Le Chevreuil.

Cervus cornibus teretibus erectis... Capreolus.

Cervus cornibus ramosis teretibus erectis. Capreolus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 6.*
Faun. Suec. Linn No. 41.
Cervus Minimus, Capreolus : Cervulus. Caprea. *Klein. Quadr. p.* 24.
Caprea Plinii, Capreolus vulgò. *Raj. Syn. Quadr. p.* 89. *No. 6.*
Caprea Plinii, sive Capreolus. *Aldro. Quadr. Bis. p.* 378.
Caprea, sive Capreolus, sive Dorcas. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 324. & 1098. (*Fig. sat bonis*).
Gesn. Icon. Quadr. p. 48. *Fig. p.* 49. (*Fig. sat bona*).
Caprea Plinii. *Jonst. Quadr. p.* 54. *Fig. T.* 33. *sub isto nomine*, Capreolus Marinus. (*Fig. sat bona*).
Capreolus ; Dorcas. *Mus. Worm. p.* 339.
Dorcas. *Charlet. Exer. p.* 12.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 217.
Rzac. Auct. p. 309.
Chevreuil. *Kolbe. Tom. III. p.* 34. *Fig. p.* 4. *F.* 5.

Digitized by Google

Les Hébreux appellent le mâle ZEBI ; *la femelle*, ZEBIAH ; *le jeune*, OPHEN. *Gesn.*
Les Chaldéens, THABIA. *Gesn.*
Les Arabes, THABIU. *Gesn.*
Les Grecs, Δορκας. *Gesn.*
Les Perses, AHU *Gesn.*
Les Espagnols, ZORLITO, *ou* CABRONZILLO MONTES. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens le mâle, CAPRIOLO, *ou* CAVRIOLO ; *& la femelle*, CAPRIOLA, *ou* CAVRIOLA. *Gesn.*
Les Allemands, REECH ; *ils appellent le mâle* REECHBOCK ; *& la femelle*, REECHGEISS. *Gesn. Aldro. Raj.*
Les Illyriens, SRNA, *ou* SARNA. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, SARN ; SARNA ; KOZA LESNA. *Raj.*
Les Danois RAADIUR. *Worm.*
Les Suédois, RADIUR. *Linn.*
Les Anglois, ROE-DEER. *Raj.*

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, 2 pieds de haut ; & depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ $3\frac{1}{2}$ pieds ; ses cornes ont 8 pouces de long ; elles sont droites, rondes & branchues, & chaque petite branche se termine en pointe : ses oreilles sont longues de $4\frac{1}{2}$ pouces : sa queue est courte. La couleur de ses poils est variée de brun, de gris & de blanc sale. Le brun domine un peu sur le dos ; & le ventre est tout d'un blanc sale. On le trouve dans les forêts.

Obs. Les Chevreuils du Brésil, décrits par *Marcgrave*, *Hist. Br. p.* 235. & *Pison*, *Hist. Nat. p.* 97. sous les noms de *Cuguacu-Eté* & *Cuguacu-Apara*, ne me paroissent être qu'une variété de cette espece, ainsi que les deux petits Cerfs cités par *Barrere*, *Hist. Fr. Eq. p.* 151. l'un sous le nom de *Biche des bois*, & l'autre sous celui de *Biche des Palétuviers*.

A parte superiore dorsi ad terram usque, 2 pedum altus est ; ab extremitate oris ad caudam, $3\frac{1}{2}$ pedum circiter longus. Cornua, 8 pollices longa, erecta sunt, teretia & ramosa ; & unusquisque ramus in acumen desinit ; auriculæ $4\frac{1}{2}$ pollices longæ ; cauda brevis. Pilorum color ex fusco, cinereo, & sordidè candido variegatur. In dorso magis fuscus est : in ventre verò sordidè albicat. Habitat in Sylvis.

Obs. Capreoli Brasiliani à *Marcgravio*, *Hist. Bra. p.* 235. & *Pisone*, *Hist. Nat p.* 97. descripti, sub istis nominibus, *Cuguacu-Eté*, & *Cuguacu-Apara*, hujus speciei varietates mihi videntur, sicut & duo cervi à *Barrerâ*, *Hist. Fr. Eq. p.* 151. citati, unus sub titulo, *Cervus major corniculis brevissimis*, alter sub isto, *Cervus minor palustris corniculis brevissimis*.

Digitized by Google

* 6. Le Karibou.

Cervus cornibus rectis, ad basim ramo unico antrorsùm verso.

Cervus Burgundicus. *Jonst. Quadr. Fig. T.* 55. (*Fig. sat bona*).

Nullibi descriptionem ipsius inveni; caput tantummodo vidi; 14 circiter pollices longum est; auriculæ 4 pollices. Cornua recta 10 pollices longa, ad basim ramo unico $2\frac{1}{2}$ pollices longo, antrorsùm verso donantur. Pili breves, ex fulvo fusci, caput obtegunt. Habitat in *Canadâ*.

Je ne l'ai trouvé décrit nulle part. Je n'en ai jamais vû que la tête, qui a environ 14 pouces de long; les oreilles 4 pouces. Les cornes sont droites, & longues de 10 pouces; elles ont à leur base une petite branche longue de $2\frac{1}{2}$ pouces, tournée vers le devant. La tête est couverte d'un poil court, d'un fauve rembruni. On le trouve en *Canada*.

* 7. Le Daim.

Cervus cornuum unica & altiore summitate palmata... Dama vulgaris.

Cervus cornibus ramosis, compressis, summitatibus palmatis. Dama. *Linn. syst. nat. ed. 6. g.* 31. *sp.* 5.
Faun. Suec. Linn. N°. 40.
Cervus Platyceros, vel Platyceros simpliciter dictus; Dama vulgò. *Raj. Syn. Quadr. p.* 85. *N°.* 2.
Sloane. Vol. II. p. 328.
Cervus palmatus, Dama; Dama-Cervus. *Klein. Quadr. p.* 25.
Dama. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p.* 217.
Dama vulgaris. *Aldro. Quadr. Bis. Fig. p.* 741. (*Fig. mala*).
Jonst. Quadr. p. 55. *Fig. T.* 31. *sub isto nomine*, Dama-Cervus. (*Fig. sat bona*).
Dama recentiorum. *Rzac. auct. p.* 308.
Dama vulgaris, sive recentiorum. *Gesn. Quadr. p.* 335. *Fig. p.* 1100. (*Fig. bona*).
Platyceros. *Gesn. Icon. Quadr. p.* 50. *Fig. p.* 51. (*Fig. bona*).
Daim. *Kolbe. Tom. III. p.* 39.
Les Espagnols l'appellent Gamo, *ou* Corza. *Aldrov. Gesn.*
Les Italiens, Daino, *ou* Danio. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Allemands, Damhirsch. *Raj. Jonst. Rzac.* Dam, *ou* Dämlin, *ou* Damhirts. *Gesn. Aldro.*

Les Polonois, LANII. *Gesn. Aldro.* DANIEL. *Rzac.*
Les Suédois, DOF; DOFHIORT. *Linn.*
Les Anglois, FALLOW-DEER. *Ils appellent le mâle* BUCK ; *la femelle*, DOE ; *le jeune*, FAWN. *Raj.*

Il eſt beaucoup plus petit que notre *Cerf* : il en différe encore par ſes cornes, dont la plus haute branche eſt en palme, & par ſa couleur, qui eſt d'un gris jaunâtre ſur le dos, & blanche ſous le ventre ; & quelquefois cette couleur griſe, ſur tout dans les jeunes, eſt variée de taches blanches.

Obſ. Cette eſpéce varie beaucoup. Les *Daims* de *Virginie* ſont plus grands & plus forts que les nôtres. Ceux d'*Eſpagne* ſont de la grandeur des *Cerfs*, mais ils ſont d'une couleur plus foncée. Il y en a d'autres qui ſont variés de différentes couleurs.

Multò minor eſt *Cervo* noſtrate, à quo etiam differt cornibus, quorum ramus excelſior palmatus eſt, & colore ex cinereo flavicante in dorſo, in ventre albo : qui color cinereus interdum, præſertim in junioribus, maculis albis variegatur.

Obſ. Hujus ſpeciei multæ ſunt varietates. *Virginiana Dama* majores ſunt & validiores noſtratibus. *Hiſpanica Cervorum* magnitudinem adæquant, & coloris ſunt obſcurioris. Dantur aliæ variis coloribus variæ.

* 8. LE RHENNE.

Cervus cornuum ſummitatibus omnibus palmatis... RANGIFER.

Cervus cornibus ramoſis, teretibus, ſummitatibus palmatis. Rangifer. *Linn. Syſt. nat. ed.* 6. *g.* 31. *ſp.* 4.
Faun. Suec. Linn. N°. 39.
Cervus Rangifer. *Raj. Syn. Quadr. p.* 88. *N.* 4.
Klein. Quadr. p. 23.
Cervus palmatus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 37. (*Fig. ſat bona*).
Aldro. Quadr. Biſ. Fig. p. 857. (*Fig ſat bona*).
Cervus mirabilis. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 36. (*Fig. ſat bona*).
Rangifer. *Aldrov. Quadr. Biſ. Fig. p.* 863. (*Fig. peſſima*).
Geſn. Quadr. Fig. p. 950. (*Fig. peſſima*).
Jonſt. Quadr. p. 64. *Fig. T.* 37. (*Fig. peſſima*).
Muſ. Worm. p. 337.
Charlet. Exer. p. 12.
Tarandus. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 859. *Fig. p.* 861. (*Fig. ſat bona*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 57. *Fig. p.* 58. (*Fig. ſat bona*). & *p.* 59. (*Fig. peſſima*).
Charlet. Exer. p. 12.

Digitized by Google

Tarandus Agricolæ, & Eliotæ. *Raj.*
Machlis Plinio. *Raj.*
Les Grecs l'appellent ιππελαφος.
Les Allemands, REIN, *ou* REEN, *ou* REYNER, *ou* RAINGER, *ou* REISSTHIER. *Gesn.*
Les Polonois, RENSCHERON. *Gesn.*
Les Suedois, RHEN. *Linn.*
Les Norvégeois, REINEN, *ou* REINSDIUR. *Worm.*
Les Lapons, REEN. *Gesn.*
Les Anglois, RAIN-DEER. *Raj.*

Ad magnitudinem & figuram *Cervi* quàm proximè accedit: membra tamen ipsius graciliora sunt. Cornua magna, ramosa, juxtà caput teretia, omnibus extremitatibus palmatis, mucronibus in extremo palmarum extantibus. Pilorum color griseus, qui tamen secundùm anni tempus mutat. Hujus speciei fœminæ cornigeræ sunt, sicut & mares; sed cornibus minoribus. Habitat in *Septentrionalibus regionibus.*

Il est à peu près de la grandeur & de la figure d'un *Cerf*: mais tous ses membres sont plus déliés. Ses cornes sont grandes, branchues, rondes proche de la tête, & toutes leurs extrémités sont en palmes terminées par des pointes. La couleur de son poil est grise; elle change cependant selon les saisons. Les femelles de cette espece ont des cornes, mais plus petites que celles des mâles. On le trouve dans tous les pays du *Nord.*

** 9. L'ELAN.

Cervus cornibus ab imo ad summum palmatis... ALCES.

Cervus cornibus acaulibus palmatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 31. sp. 2. Faun. Suec. Linn. N. 37.*
Cervus palmatus. Alce, vera & legitima. Magnum animal vulgò. *Klein. Quadr. p. 24.*
Alce. *Raj. Syn. Quadr. p. 86. No. 3.*
Aldro. Quadr. Bis. p. 866. Fig. p. 869. & 870. (Fig. pessima).
Gesn. Quadr. Fig p. 1. (Fig. sat bona).
Gesn. Icon. Quadr. p. 52. Fig. p. 53. (Fig. sat bona).
Jonst. Quadr. p. 65. Fig. T. 30. & 31. (Fig. sat bona); in eo tamen peccant figuræ Gesneri & Jonstoni, quod pilis suprà collum longissimis, & caruncula sub mento donentur.
Musc. Worm. p. 336.
Alces. *Charlet. Exer. p. 12.*

Alce, ſive Alces. *Rzac. auct. p.* 304.
Alce, ſeu Alces. Equicervus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 212.
Elant. *Hiſt. de l'Acad. T. III. Part. I. p.* 179. *Fig. Pl.* 25. (*Fig. tres bonne*).
Les Grecs l'appellent ΑΛΚΗ.
Les Italiens, GRANBESTIA. *Rzac.*
Les Allemands, ELK, *ou* ELLEND. *Raj. Geſn. Worm. Charlet. Aldrov. Rzac.*
Les Illyriens, LOS, *ou* GELM. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, LOS. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Moſcovites, LOS. *Geſn.* LOZZOS. *Aldro.*
Les Suédois, ÆLG. *Linn.*
Les Danois, ELSDIUR. *Worm.*
Les Anglois, ELK. *Raj. Charlet.*
Les Septentrionaux, ANIMAL MAGNUM. *Hiſt. de l'Acad.*
Les Canadiens, ORIGNAL.

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cheval*. Il a la tête longue; le col court; les lévres, & ſur-tout la ſupérieure, grandes & épaiſſes; l'ouverture de la bouche grande; les oreilles longues & ſemblables à celles d'un *Ane*; la queue très courte; le derriére un peu plus élevé que les épaules; les poils très gros, & longs de 3 pouces. La couleur de tout ſon corps eſt griſe. Ses cornes ſont en palme du haut au bas, & garnies de pointes à leur côté extérieur. On le trouve dans la *Lithuanie*, la *Scandinavie*, la *Moſcovie* & le *Canada*.

Equi magnitudinem ferè attingit. Caput habet longum; collum breve; labia, præſertim ſuperiùs, magna & craſſa; oris rictum magnum; auriculas longas *Aſininis* ſimiles; caudam breviſſimam; clunes humeris parumper altiores; pilos craſſos, 3 pollices longos, cinereos. Cornua ab imo ad ſummum palmata ſunt, mucronibus aliquot in ambitu exteriori extantibus. Habitat in *Lithuaniâ*, *Scandinaviâ*, *Moſcoviâ*, & *Canadâ*.

SECTION III.

Ceux qui n'ont point de cornes.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul genre, qui eſt celui des QUADRUPEDES ruminants à pied fourchu, auxquels j'ai donné le nom de *Chevrotains*.

SECTIO III.

Ea quæ ſunt acornia.

IN illa Sectione unicum eſt genus, ſcilicet QUADRUPEDUM ruminantium pede biſulco, quibus *Traguli* nomen impoſui.

Digitized by Google

XIII.

Genus Traguli.

Hujus character est
Dentes incisores in maxillâ superiore nulli, in inferiore octo:
Pes bisulcus:
Cornua nulla.

XIII.

Le Genre du Chevrotain.

Son caractere est
De n'avoir point de dents incisives à la mâchoire supérieure, d'en avoir huit à l'inférieure:
D'avoir le pied fourchu:
Point de cornes.

** 1. Le Chevrotain des Indes.

Tragulus pilis brevibus suprà fulvis, infrà albicantibus... Tragulus Indicus.

Capra pedibus digito humano angustioribus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g.* 32. *sp.* 4.
Tragulus; Cervula parvula Africana ex Guineâ acornis. *Klein. Quadr. p.* 22.
Tragulus, sive Hinnulus, aut Cervus juvencus pergracilis Africanus, cujus pedes auro circumcluduntur. *Klein. Quadr. p.* 22.
Cerva parvula Africana ex Guineâ, rubida, sine cornibus. *Seb. Vol. I. p.* 70. *Fig. T.* 43. *Fig.* 1. (*Fig. bona*).
Hinnulus, seu Cervus juvencus, pergracilis, Africanus. *Seb. Vol. I. p.* 70. *Fig. T.* 43. *F.* 2. (*Fig. bona*).
Cervus juvencus, perpusillus Guineensis. *Seb. Vol. I. p.* 70. *Fig. T.* 43. *F.* 3. (*Fig. bona*).
Chevre de Congo. *Kolbe. Tom. III. p.* 39.

A parte superiore dorsi ad terram usque, 7 pollicum altus est; à vertice ad caudam, 1 circiter pede longus. Caput 3 pollices longum; auriculæ 1 circiter pollice; cauda brevis, pilis longis dispersisque, ex russo & albo variegatis, vestita. Diameter crurum in parte strictiore 2 tantùm linearum est. Pilus ei brevis & fulvus in parte superiore capitis,

Il a, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, 7 pouces de haut; depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, environ 1 pied. Sa tête a 3 pouces de long; ses oreilles environ 1 pouce. Sa queue est courte, & garnie de poils longs & clair-semés, variés de roux & de blanc. Ses jambes dans l'endroit le plus menu, n'ont que 2 lignes de diamétre. Son

poil eſt court & fauve, mêlé d'un peu de brun dans la partie ſuperieure de la tête, du col & du dos. La gorge, le ventre, & l'intérieur des cuiſſes ſont blancs. Il a en tout 26 dents; ſçavoir, à la mâchoire inférieure 8 dents inciſives, dont les 2 du milieu ſont en forme de ſpatule, & les autres ſont étroites dans toute leur longueur; & 8 molaires, 4 de chaque côté: & à la mâchoire ſupérieure pareil nombre de molaires, & en outre 2 canines, une de chaque côté. On le trouve en *Guinée*, & dans *l'Inde*.

colli & dorſi, ex fuſco admixtus. Guttur, venter, & femorum pars interior albeſcunt. Dentes habet 26, ſcilicet in maxilla inferiore 8 inciſores, quorum duo intermedii ſpatæformes ſunt, cæteri verò per totam longitudinem ſtrictiores; & 8 molares, 4 utrinque: in ſuperiore verò maxillâ molarium parem numerum, & inſuper caninos 2, utrinque unum. Habitat in *Guineâ* & *Indiâ*.

2. Le Chevrotain de Guinée.

Tragulus pilis longiſſimis obſcurè fulvis... Tragulus Guineensis.

Tragulus Guineenſis pilo rubro longiore. *Klein. Quadr. p.* 22.
Cervus Africanus pilo rubro. *Seb. Vol. I. p.* 73. *Fig. T.* 45. *F.* 1. (*Fig. bona*).

Il eſt de la grandeur du précédent; il en diffère par ſes jambes, qui ſont plus longues; & par ſon poil, qui eſt plus long, & d'une couleur fauve beaucoup plus foncée. On le trouve vers les confins de la *Guinée*.

Præcedentis magnitudinem æquat: ab eo tamen differt cruribus longioribus; & pilo longiori, coloris fulvi longè obſcurioris. Habitat in oris *Guineæ*.

3. Le Chevrotain de Surinam.

Tragulus ex ruſſo luteus, maculis albis variegatus... Tragulus Surinamensis.

Tragulus Surinamenſis ſubrubra: Cervula albis maculis notata. *Klein. Quadr. p.* 22.

Cervula

Cervula Surinamensis subrubra, albis maculis notata. *Seb. vol. I. p.* 71. *Fig. T.* 44. *F.* 2. (*Fig. bona*).

Præcedentes magnitudine circiter æquat. Auriculæ magnæ sunt & longæ; cauda brevis & obtusa. Pilus ex ruffo luteus, in dorso & parte colli superiore maculis albis variegatur. Habitat in *Surinamensi Insulâ.*

Il est à peu près de la grandeur des précedens. Ses oreilles sont grandes; sa queue courte & obtuse. Son poil est d'un roux jaunâtre, tacheté de blanc sur le dos & la partie supérieure du col. On le trouve à *Surinam.*

4. Le Chevrotain d'Afrique.

Tragulus in medio capite fasciculum pilosum erectum gerens. Tragulus Africanus.

Capra capite fasciculo tophoso, cavitate infrà oculos. *Linn. syst. nat. ed. 6. g.* 32. *sp.* 10.
Capra Sylvestris Africana Grimmii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 80. *No.* 7.
Tragus, Capra Sylvestris Africana Grimmii. *Klein. Quadr. p.* 19.

Colore est obscurè cinereo. In medio capite fasciculum pilosum erectum gerit. In utroque latere, nasum inter & oculos, duas cavitates exhibet, quæ pinguem & oleosum flavum liquorem continent, qui in nigram materiam coagulatur, odoreque inter castoreum & moschum medio pollet. Habitat in *Africâ.*

La couleur de son poil est un gris foncé. Il porte au milieu du front un bouquet de poils élevé. Entre le nez & les yeux, il a de chaque côté une cavité, qui contient une liqueur jaune, grasse & huileuse, qui devient noire en se coagulant, & qui a à peu près l'odeur du musc. On le trouve en *Afrique.*

5 Le Musc.

Tragulus ad umbilicum folliculum moschiferum gerens. Moschus.

Animal Moschiferum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 127.
Eus. Nieremb. p. 184.
Tragus Moschiferus. Moschus. *Klein. Quadr. p.* 18.
Moschus. *Linn. syst. Nat. ed. 6. g.* 30. *sp.* 1.

Digitized by Google

Moſchi Capreolus. *Geſn. Quadr. p.* 786.
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 52. (*Fig. ſat bona*).
Capra Moſchi. *Aldro. Quadr. Biſ. p.* 743. *Fig. p.* 744 (*Fig. ſat bona*)
Jonſt. Quadr. p. 55. *Fig. T.* 29, *ſub illo nomine*, Capreolus Moſchi. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 101.
Cervus odoratus aliis. *Charlet.*
Hiam, Animal Muſci. *Flor. Sin. Fig. p.* Z. (*Fig. ſat bona*).
Les Chinois l'appellent HIAM. *Boym.*
Les Italiens, CAPRIOLO DEL MUSCO. *Geſn.*
Les Allemands, BISEMTHIER, *ou* BISEMBEECH. *Geſn.*

Il a, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, 3 pieds de long. La tête a plus d'un demi-pied; le front 3 pouces de large; les oreilles, qui reſſemblent à celles de nos *Lapins*, ſont longues de 4 pouces; les jambes de devant de 14 pouces; la queue de 2 pouces au plus. Le muſeau eſt pointu. Toute la partie ſupérieure du corps eſt couverte de poils variés, depuis leur origine juſqu'à leur extrémité, de jaune, de maron, & de blanc. La tête & les jambes ſont brunes; le ventre & le deſſous de la queue blancs. Auprès du nombril eſt une eſpece de petite bourſe, qui contient le muſc, qui a 3 pouces de long, & 2 pouces de large, & s'éléve au-deſſus du ventre d'environ 1 pouce. Elle eſt garnie de poils extérieurement, & intérieurement d'une pellicule, qui renferme le muſc, & qui eſt garnie de glandes, qui, ſelon les apparences, ſervent à en faire la ſécrétion. Il a en tout 26 dents; ſçavoir, à la mâchoi-

A vertice ad caudam, 3 pedes longus eſt. Caput ſemi pedem longitudine ſuperat. Frons 3 pollicum latus. Auriculæ. *Cuniculorum* noſtratium ſimiles, 4 pollices longæ, & erectæ. Crura anteriora 14 pollices longa. Cauda 2 pollices non excedit. Os valde acutum. Corporis pars ſuperior undique tecta eſt pilis è luteis, caſtaneis, & albis portiunculis alternis, à radice ad apicem uſque, variis. Pili in capite & cruribus fuſci, ſeu brunnei; in ventre verò & ſub caudâ albi ſunt. Ad umbilicum folliculus eſt moſcho continendo inſerviens, 3 pollices longus, 2 latus, à ventre ad unius circiter pollicis ſpatium protuberans. Extùs piloſus eſt; in interiore verò ſuperficie ſpecialem habet pelliculam moſchum cingentem, in quâ plures glandulæ, ad moſchi procul dubio ſecretionem inſervientes, reperiuntur. Den-

Digitized by Google

tes habet 26; scilicet in maxillâ inferiore incisores octo, & molares totidem, 4 utrinque; in superiore verò molarium parem numerum, & insuper caninos duos, unum utrinque. Habitat in *Sinensi* regione.

re inférieure 8 dents incisives, & 8 molaires, 4 de chaque côté; & à la mâchoire supérieure même nombre de molaires, & en outre 2 canines, une de chaque côté. On le trouve à la *Chine*.

ORDRE VI.

LES QUADRUPEDES.

Qui ont des dents inciſives aux deux máchoires, & la corne du pied d'une ſeule piéce.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul Genre, qui eſt celui du *Cheval*.

XIV.

Le Genre du Cheval.

Son caractère eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire:
La corne du pied d'une ſeule piéce.

ORDO VI.

QUADRUPEDA.

Dentibus inciſoribus in utraque maxilla & pede ſolidungulo donata.

GENUS *Equinum* unicum eſt ad hunc Ordinem conſtituendum.

XIV.

Genus Equinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex:
Pes ſolidungulus.

** 1. LE CHEVAL.

Equus auriculis brevibus erectis, juba longa... EQUUS.

Equus caudâ undique ſetoſa. Equus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 34.
Equus domeſticus, cicuratus. *Klein. Quadr. p. 4.*
Equus. *Raj. Syn. Quadr. p. 62. No. 1.*
Aldro. Quadr. Solid. p. 12. Fig. p. 21. (Fig. bona).
Geſn. Quadr. p. 442. Fig. p. 443. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 19. (Fig. bona).
Jonſt. Quadr. p. 1. Fig. T. 1, 2, 3 & 4. (Fig. bonis).
Charlet. Exer. p. 3.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 240.
Rzac. Auct. p. 332.
Sloane. Vol. II. p. 327.
Cheval. *Hiſt. Nat. gen. & part. ed. in-4°. Tom. IV. p. 258. Fig. Pl. I; &*

Digitized by Google

ed. in-12. Tom. VII. p. 372. Fig. Pl. I. [Fig. tres bonnes].
Les François appellent le mâle CHEVAL; *lorsqu'il est coupé*, CHEVAL ONGRE; *la femelle*, JUMENT; *le jeune*, POULAIN.
Les Hébreux, le mâle, SUS; *la femelle*, SUSAH. *Aldro. Gesn.*
Les Chaldéens, SUSUATHA. *Aldro. Gesn.*
Les Grecs, ἵππος.
Les Arabes, BAIEL. *Gesn.*
Les Perses, ASBECHA. *Gesn.*
Les Espagnols, & les Italiens, CAVALLO. *Aldro. Gesn.*
Les Allemands, ROSS. *Aldro. Gesn.*
Les Bohémiens, KUN. *Aldro. Gesn.*
Les Illyriens, KOBYLA. *Aldro.*
Les Polonois, KON. *Aldro. Gesn. Rzac.*
Les Suédois, HÄST. *Linn.*
Les Flamands le mâle, PEERT, *ou* HEINST; *lorsqu'il est coupé*, RUYN; *la femelle*, MERRI. *Aldro.*
Les Anglois, HORSE. *Aldro. Gesn.*

Equus est animal ità notum, ut descriptione non indigeat. Amplissimè describitur in Libro cui titulus, *Histoire Naturelle, Générale & Particuliere, avec la Description du Cabinet du Roi, &c.* Ed. *in-4°. Vol. IV. p. 258. & seq.* & Ed. *in-12. Vol. VII. p. 372 & seq.* Habitat ubique terrarum.

Le Cheval est un animal si connu, qu'il n'a pas besoin de description. On le trouvera amplement décrit dans l'*Histoire Naturelle, Générale & Particuliere, avec la Description du Cabinet du Roi, &c.* Ed. *in-4°. Tom. IV. p. 258 & suiv.* & Ed. *in-12. Tom. VII. p. 372 & suiv.* On le trouve partout.

** 2. LE ZÉBRE, OU L'ANE RAYÉ.

Equus auriculis brevibus erectis, juba brevi, lineis transversis versicolor... ZÉBRA.

Equus lineis transversis versicolor. Zebra. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 27. sp. 3.*
Equus ferus genere suo. Zebra. *Klein. Quadr. p. 5. B.*
Zebra. *Raj. Syn. Quadr. p. 64. N°. 4.*
Eus. Nieremb. p. 168.
Zebra Indica. *Aldro. Quadr. Solid. p. 416. Fig. p. 417. (Fig. sat bona).*
Jonst. Quadr. p. 17. Fig. T. 5. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 4.
Ane Sauvage. *Kolbe. Tom. III. Fig. p. 22. [Fig. bonne].*
Les Portugais l'appellent BURRO DO MATTO. *Klein.*

Digitized by Google

Il eſt à peu près de la grandeur d'un petit *Cheval*. Ses oreilles ſont un peu plus longues que celles du *Cheval*; ſa criniere eſt courte. Tout ſon corps eſt rayé de rayes tranſverſales, alternativement noires & jaunes dans le mâle, & alternativement noires & blanches dans la femelle. On le trouve en *Afrique*, & ſur tout au *Cap de Bonne Eſpérance*.

Equum mediocrem magnitudine circiter adæquat. Auriculas habet auriculis *Equinis* paulò longiores; jubam multò breviorem. Per totum corpus lineis tranſvetſis, alternatim nigris & flavis in mare, & alternatim nigris & albicantibus in fœminâ, variegatur. Habitat in *Africâ*, & præſertim in *Cap. B. Sp.*

** 3. L'ANE.

Equus auriculis longis, flaccidis, jubâ brevi... ASINUS.

Equus caudâ extremo ſetoſâ. Aſinus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 2. Faun. Suec. Linn. N°. 35.*
Aſinus. *Raj. Syn. Quadr. p. 63. N. 2.*
Klein. Quadr. p. 6. A.
Aldro. Quadr. Solid. p. 295.
Geſn. Quadr. p. 3. Fig. p. 4. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 20. (Fig. bona).
Jonſt. Quadr. p. 12. Fig. T. 6. [Fig. bona].
Sloane. Vol. II. p 327.
Aſinus domeſticus. *Charlet. Exer. p. 4.*
Ane. *Hiſt. nat. gen. & part. ed. in-4°. Tom. IV. p. 404. Fig. Pl. XI. & ed. in-12. Tom. VIII. p. 40. Fig. Pl. I. [Fig. tres bonnes].*
Les Hébreux l'appellent CHAMOR. *Aldro. Geſn.*
Les Grecs, ὄνος.
Les Perſes, CARE. *Aldro. Geſn.*
Les Eſpagnols, ASNO. *Aldro. Geſn.*
Les Italiens, LASINO. *Geſn.*
Les Allemands, ESEL. *Aldro. Geſn.*
Les Illyriens, OSEL. *Aldro. Geſn.*
Les Suédois, ÅSNA. *Linn.*
Les Anglois, ASSE. *Aldrov. Geſn.*

Il eſt plus petit qu'un *Cheval* d'une taille ordinaire; il a les oreilles beaucoup plus longues, plus larges, & ordinairement pendantes: ſa criniere eſt très

Minor eſt *Equo* magnitudinis vulgaris; auriculas habet multò longiores, latiores, & flaccidas; jubam brevem; caudam caudâ *Equinâ* longio-

rem, in extremitate tantùm setosam. Asini color vulgaris ex cinereo griseus est. Dantur etiam albi, russi, fusci & nigri. Per dorsi longitudinem extenditur linea nigra, alterâ lineâ transversâ etiam nigrâ per scapulas ductâ. Hæ 2 lineæ simul crucem efformant. Habitat ubique, exceptis locis frigidissimis. Amplissimè describitur in Libro cui titulus, *Histoire Naturelle, Générale & Particuliére*, &c. Ed. *in*-4°. *Vol. IV. p.* 404 & *seq.* & Ed. *in*-12. *Vol. VIII. p.* 40 & *seq.*

courte: sa queue est plus longue que celle du *Cheval*, & n'est garnie de crins qu'à son extrémité. Sa couleur la plus ordinaire est un gris cendré: il y en a de roux, de bruns, de blancs, & de noirs. Il a une raye ordinairement noire, qui s'étend sur toute la longueur du dos, & qui est coupée transversalement par une seconde, qui descend sur les deux épaules. Ces 2 rayes ensemble forment une croix. On le trouve par tout, excepté dans les Pays froids. On le trouvera amplement décrit dans l'*Histoire Naturelle, Générale & Particuliére*, &c. Ed. *in*-4°. *T. IV. p.* 404 & *suiv.* & Ed. *in*-12. *Tom. VIII. p.* 40 & *suiv.*

** 4. Le Mulet.

Equus auriculis longis, erectis, jubâ brevi. Mulus.

Equus caudâ extremo setosâ. Mulus. *Linn. syst. nat. ed.* 6. *g.* 27. *sp.* 2, *b. Faun. Suec. Linn. N°.* 35. *a.*
Asinus biformis hybridus. Mulus. *Klein. Quadr. p.* 6. *B.*
Mulus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 64.
Aldro. Quadr. Solid. p. 358.
Gesn. Quadr. p. 794. *Fig. p.* 793. (*Fig. bona*).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 21. [*Fig. bona*].
Jonst. Quadr. p. 15. *Fig. T.* 6. (*Fig. sat bona*).
Charlet. Exer. p. 4.
Sloane. Vol. II. p. 327.
Les François appellent le mâle Mulet; *la femelle*, Mule.
Les Hébreux le mâle, Pered; *la femelle*, Pirdah. *Gesn. Aldrov.*
Les Chaldéens, Cudana. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Ημιονος.
Les Arabes, Beal. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols, & les Italiens le mâle, Mulo; *la femelle*, Mula. *Gesn.*
Les Allemands, Multhier, ou Mulesel. *Gesn.*

Digitized by Google

Les Illyriens, MEZECK. *Gesn. Aldro.*
Les Suédois, MULÅSNA. *Linn.*
Les Anglois, MULE. *Gesn.*

Le Mulet n'eſt pas une eſpece certaine & conſtante qui puiſſe ſe reproduire, mais plutôt une bâtarde, qui provient d'un *Ane* & d'une *Jument*. Il reſſemble beaucoup au pere par la forme du corps, la longueur des oreilles, & la briéveté de la criniére; mais il reſſemble plus à la mere par la grandeur. Comme l'*Ane*, il a la queue longue, & qui n'a des crins qu'à ſon extrémité. Sa couleur la plus ordinaire eſt noire, ou d'un brun noir: il a, comme l'*Ane*, ſur le dos une croix d'une couleur plus foncée.

Mulus non eſt certa & conſtans animalis ſpecies; ſed hybrida, & ſpuria ab *Aſino Equam* ineunte genita, quæ ſibi ſimilem procreare nequit. Quoad formam corporis externam, auricularum longitudinem, jubæ brevitatem patri, quoad magnitudinem matri ſimilis eſt. Sicut *Aſinus* caudam habet longam, in extremitate tantùm ſetoſam. Color ipſius vulgaris eſt niger, vel ex fuſco nigreſcens. Crucem ſaturatioris coloris, ſicut *Aſinus*, in dorſo gerit.

5. L'ANE SAUVAGE.

Equus auriculis longis, jubâ brevi, pelle tuberculis parvis ſcabra... ONAGER.

Equus caudâ extremo ſetoſâ. Onager. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 27. ſp. 2. a.*
Aſinus ſylveſtris; Aſiniferus; Onager. *Klein. Quadr. p. 7. C.*
Onagrus, ſive Aſinus ſylveſtris. *Geſn. Quadr. p. 19.*
Onager. *Raj. Syn. Quadr. p. 63. No. 3.*
Aldro. Quadr. Solid. p. 352.
Jonſt. Quadr. p. 14. Fig. T. 12. [*Fig. cornuta, quod malè*].
Charlet. Exer. p. 4.
Les Grecs l'appellent Οναγρος.
Les Allemands, WALD EZEL. *Geſn.*
Les Anglois, WILD ASS. *Raj.*

Il reſſemble beaucoup à l'*Ane domeſtique*; il n'en différe que par les petits tubercules dont ſa peau eſt couverte. C'eſt avec cette peau que l'on fait ce que nous appellons en François le *Chagrin*.

Aſino domeſtico perquàm ſimilis eſt; in eo tantùm ab illo differt, quòd pellis ejus tuberculis parvis ſit ſcabra, quâ pelle efficitur quod Gallicè *Chagrin* vocatur.

ORDO VII.

Digitized by Google

ORDO VII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ, & pede biſulco donata.

IN hoc Ordine unicum continetur Genus, ſcilicet *Suillum :* in quo Genere dentium inciſorum numerus ſæpiſſimè variat. Hujus enim Generis QUADRUPEDA dentibus inciſoribus, maxillæ ſuperiori, modò 4, modò 5, modò 6; maxillæ verò inferiori modò 4, modò 6, modò 8 donantur. Quæ varietas in numero dentium in errorem inducere nequit, quoniam Genus iſtud unicum eſt quod *dentibus inciſoribus* in utrâque maxillâ, & ſimul *pede biſulco* donetur.

X V.

Genus Suillum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ:
Pes biſulcus.

ORDRE VII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents inciſives aux deux mâchoires, & le pied fourchu.

LE Genre des *Cochons* eſt le ſeul qui compoſe cet Ordre. Il eſt auſſi le ſeul dont le nombre des dents inciſives varie. Les QUADRUPEDES de ce genre ont à la mâchoire ſupérieure tantôt 4, tantôt 5, tantôt 6 dents inciſives; & à la mâchoire inférieure, tantôt 4, tantôt 6, & tantôt 8. Cette variété ne peut point induire en erreur, parce que ce genre eſt le ſeul qui ait des *dents inciſives* aux deux mâchoires, & en même tems le *pied fourchu.*

X V.

Le Genre du Cochon.

Son caractere eſt
D'avoir des dents inciſives aux deux mâchoires:
Le pied fourchu.

Digitized by Google

Obſ. 10. Lorſque le nombre des dents inciſives eſt égal dans les deux mâchoires, il eſt de 4 ou de 6 en chacune.

Obſ. 20. Lorſqu'il eſt inégal, le plus grand nombre eſt toujours à la mâchoire inférieure.

Obſ. 30. Le plus grand nombre de dents inciſives n'excéde jamais l'autre que de 2 au plus, ſçavoir une de chaque côté.

Obſ. 40. Cette variété n'eſt point propre à faire diſtinguer les unes des autres les différentes eſpéces de ce Genre; puiſque dans les individus de la même eſpéce le nombre des dents inciſives varie. J'avois cru dabord qu'elle pourroit indiquer au moins le ſexe; mais il n'en eſt rien; car j'ai obſervé pluſieurs *Cochons domeſtiques* mâles & femelles, & j'ai trouvé dans les deux ſexes indifféremment toutes ces variétés.

Obſ. 50. Les dents inciſives de la mâchoire ſupérieure ſont convergentes; & celles de la mâchoire inférieure, au moins les intermédiaires, ſont couchées obliquement, & avancent en avant.

Obſ. 60. Tous les QUADRUPEDES de ce Genre ont le muſeau allongé, & terminé par un plan arrondi, dans lequel ſont les narines.

Obſ. 10. Si dentium inciſorum numerus ſit æqualis in duobus maxillis, 4 ſunt vel 6 dentes in utraque.

Obſ. 20. Si verò ſit inæqualis, maxilla inferior ſemper majore numero donatur.

Obſ. 30. Major ille numerus dentium inciſorum minorem duobus dentibus tantùm excedit, utrinque uno.

Obſ. 40. Varius ille dentium inciſorum numerus ad diſtinguendas inter ſe hujus generis ſpecies varias inſervire nequit: in diverſis enim ejuſdem ſpeciei individuis variat ille numerus. Ad ſexûs etiam diſtinctionem nequaquam aptus eſt; plures enim *Porcos domeſticos* mares & fœminas obſervavi, in quibus in utroque ſexu indifferenter omnes illas varietates reperi.

Obſ. 50. Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſunt convergentes; in inferiore verò, ſaltem intermedii, obliquè inclinati & prominentes.

Obſ. 60. Omnia hujus Generis QUADRUPEDA roſtrum habent oblongum, in planum rotundum terminatum, in quo ſunt nares.

** 1. LE COCHON DOMESTIQUE.

Sus caudatus, auriculis oblongis, acutis, caudâ piloſâ... Sus DOMESTICUS.

Sus dorſo anticè ſetoſo, caudâ piloſâ. Sus, ſeu Porcus domeſticus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 28. ſp. 1. a.*
Faun. Suec. Linn. N°. 36.
Sus ſeu Porcus domeſticus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 92. N°. 1.*
Sloane. Vol. II. p. 328.

Digitized by Google

Porcus: Sus: Scropha: Verres. *Klein. Quadr. p.* 25.
Sus. *Gesn. Quadr. p.* 982. *Fig. p.* 983. [*Fig. bonis*].
Aldro. Quadr. Bis. p. 937. *Fig. p.* 1006. [*Fig. bona*].
Sus, vel Scropha: Verres. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p.* 24. [*Fig. bonis*].
Sus, Porcus, Scropha, Vertes, & Majalis. *Jonst. Quadr. p.* 70. *Fig. T.* 47. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 13.
Porcus. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p.* 243.
Rzac. Auct. p. 333.
Les François l'appellent PORC. *Ils appellent le mâle* VERRAT; *lorsqu'il est châtré*, COCHON; & *la femelle*, TRUYE.
Les Latins, SUS. *Ils appellent le mâle* VERRES; *lorsqu'il est châtré*, MAIALIS; *la femelle*, SCROPHA; *le jeune*, PORCELLUS.
Les Hébreux, CHASIR. *Gesn.*
Les Chaldéens, CHASIRA. *Gesn.*
Les Arabes, KANISIR. *Gesn.*
Les Grecs, Τὶς, *ou* Χοῖρος.
Les Perses, MAR, *ou* BUK. *Gesn.*
Les Espagnols, PUERCO. *Gesn.*
Les Italiens, PORCO; *le mâle*, VERRO; *lorsqu'il est châtré*, PORCO CASTRATO, *ou* MAIALE; *la femelle*, SCROPHA, *ou* TROIATA. *Gesn.*
Les Allemands, SAW, *ou* SUW; SU; SCHWYN, *ou* SCHWEIN. *Ils appellent le mâle*, ÆBER; *lorsqu'il est châtré*, BARG; *la femelle*, MOS, *ou* LOOSS; *lorsqu'elle est châtrée*, GALTS; *le jeune*, FÅRLE; SEUWLE; *lorsqu'il tette encore*, SPAN FÅRLE. *Gesn.*
Les Polonois, WIEPRZ. *Rzac.*
Les Anglois, HOG; *le mâle*, BOAR; *la femelle*, SOW; *le jeune*, PIG. *Raj. Gesn.*

Sus domesticus est animal satis notum, ut longâ descriptione non indigeat. Pilis rigidis, *setæ* vocatis, toto corpore vestitur. Oculi sunt exigui; auriculæ oblongæ & acutæ. Color vulgaris albicans, interdum ex nigro variegatus.

Le Cochon est un animal assez commun, pour qu'il n'ait pas besoin d'une longue description. Tout son corps est couvert de poils roides que nous appellons *soyes*. Ses yeux sont petits; ses oreilles oblongues & pointues. Sa couleur est ordinairement blanchâtre, quelquefois variée de noir.

Digitized by Google

** 2. Le Cochon de la Chine.

Sus caudatus, ventre ad terram usque propendente, caudâ pilosâ... Sus Sinensis.

Sus dorso anticè setoso, caudâ pilosâ. Sus Chinensis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g 28. sp. 1. d.*

Il est plus petit que le précédent; il en diffère aussi par ses jambes courtes, & parce que son ventre pend presque jusqu'à terre. Il varie en couleur. Il y en a qui sont variés de noir & de blanc; d'autres sont de la couleur du *Sanglier*, c'est-à-dire, noirs, mêlés d'un peu de blanchâtre.

Præcedente minor est; ab illo etiam differt crurum brevitate, & ventre ferè ad terram usque propendente. Colore variat. Dantur ex albo & nigro variegati; dantur etiam colore *Apri*, scilicet è nigro paululùm canescentes.

** 3. Le Sanglier.

Sus caudatus, auriculis brevibus, subrotundis, caudâ pilosâ... Aper.

Sus dorso anticè setoso, caudâ pilosâ. Sus Agrestis, sive Aper. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 28. sp. 1. e.*
Faun. Suec. Linn. No. 36.
Sus Agrestis, sive Aper. *Raj. syn. Quadr. p. 96. No. 2.*
Aper, Porcus sylvestris. *Klein. Quadr. p. 25.*
Aper simpliciter, vel Aper Agrestis: Sus ferus vel sylvaticus. *Gesn. Icon. Quadr. p. 81. Fig. p. 82. (Fig. bona).*
Aper. *Gesn. Quadr. p. 1039. Fig. p. 1040. (Fig. bona).*
Aldro. Quadr. Bis. p. 1013. Fig. p. 1025. (Fig. bona).
Jonst. Quadr. p. 74. Fig. T. 47. & 48. [Fig. bonis].
Charlet. Exer. p. 13.
Aper, seu Verres sylvaticus. *Raj. Hist. Nat. Pol. p. 213.*
Aper, seu Sus sylvaticus. *Raj. aucl. p. 305.*
Les François appellent le mâle. Sanglier; *la femelle*, Laye; *le jeune*, Marcassin.
Les Grecs l'appellent Καπρος, *ou* Χοιρος ἀγριος.
Les Espagnols, Puerco sylvestre, *ou* Puerco montes, *ou* Javali. *Gesn.*
Les Italiens, Porco Sylvatico, *ou* Cinghiale, *ou* Cinghiare. *Gesn.*
Les Allemands, Wild Schwein. *Gesn. Raj.*
Les Illyriens, Weprz. *Gesn.*

Digitized by Google

Les Polonois, WIEPRZ LESNY. *Rzac.*
Les Suédois, WILL-SWIN. *Linn.*
Les Anglois, WILD BOAR, *ou* WILD-SWINE. *Raj.* BORE. *Gesn.*

Suem domesticum magnitudine circiter adæquat. Dentes habet caninos, (Gallicè *Défenses*) multò longiores; auriculas breviores, subrotundas, & nigras; cujus etiam coloris sunt & cauda & pedes. Per totum corpus vestitur pilis rigidis, è nigro paulùm canescentibus. Habitat in sylvis.

Il est à peu près de la grandeur du *Cochon domestique*. Il a les dents canines, (appellées en François, *Défenses*) beaucoup plus longues; les oreilles plus courtes, arrondies & noires, ainsi que les pieds & la queue: tout le reste de son corps est couvert de poils roides & noirs, mêlés d'un peu de blanchâtre. On le trouve dans les forêts.

4. LE COCHON DE GUINÉE.

Sus caudatus, auriculis longis & acuminatis, caudâ nudâ. SUS GUINEENSIS.

Sus dorso ponè setoso, caudâ nudâ. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 28. sp. 2.*
Porcus Guineensis Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 96. No. 3.*
Porcus Guineensis. *Klein. Quadr. p. 26.*
Jonst. Quadr. p. 73. Fig. T. 46. [*Fig. bona*].
Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 230. [*Fig. bona*].

Figurâ est ut nostrates *domestici Sues*: ab eis tamen differt, quòd habeat auriculas longas, planè acutas, & prolongatis acuminibus; & caudam longam usque ad talos propendentem, pilorum expertem. Setis omninò caret; sed totum corpus tegitur pilis brevibus, ruffis splendentibus. Attamen versùs caudam in dorso, & circà collum paulò longiores habet pilos. Habitat in *Guineâ*, & *Brasiliâ*.

Il a la figure de nos *Cochons domestiques*: Il en diffère par ses oreilles, qui sont très longues, & terminées par une pointe longue & aiguë; & par sa queue, qui lui descend jusqu'aux talons; & qui est tout à fait dénuée de poils. Il n'a point du tout de soyes; mais tout son corps est couvert de poils courts, d'un roux brillant. Il a aussi quelques poils plus longs sur le dos vers la queue, & vers le col. On le trouve en *Guinée*, & au *Brésil*.

Digitized by Google

5. Le Sanglier des Indes Orientales.

Sus caudatus, dentibus caninis ſuperioribus ab origine ſurſùm verſis, arcuatis, caudâ floccosâ... APER ORIENTALIS.

Sus dentibus duobus fronti innatis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 28. ſp. 4.*
Porcus Indicus, Babyrouſſa dictus. *Raj. ſyn. Quadr. p. 96. No. 4.*
Porcus Babyrouſſa. *Klein. Quadr. p. 25.*
Babyrouſſa, ſeu Porcus Indicus. *Charlet. Exer. p. 14.*
Babyrouſſa. *Bont. Ind. Ori. Fig. p. 61.* [*Fig. mala*].
Aper Indicus orientalis, Babi Roeſa dictus. *ſeb. Vol. I. p. 80. Fig. T. 50. F. 2.* (*Fig. optimâ*).
Les Habitans de l'Iſle de Boëro l'appellent BABI-ROESA. *Seba.*

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cerf*, & il reſſemble aſſez au *Cochon* par ſa figure. Sa tête eſt oblongue & étroite; ſon muſeau long; ſes oreilles petites & pointues; ſes yeux petits; ſes jambes longues & déliées; ſa queue longue, friſée, & terminée par un bouquet de poils. Son corps eſt couvert de poils courts, laineux, & très doux au toucher: ceux qui garniſſent le dos ſont ſoyeux, & plus rudes. Sa couleur eſt ou blanchâtre, ou d'un brun mêlé de gris. Ses dents canines ſupérieures ſont ſingulieres: elles tendent vers le haut dès leur origine, & enſuite ſont courbées en arc. Lorſque l'animal eſt vieux, elles vont lui percer la peau au deſſous des yeux. Ses dents canines inférieures ſont très longues & reſſemblent aux *défenſes* des *Sangliers*. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

Cervum magnitudine circiter adæquat, & *Porcum* formâ corporis ſat benè imitatur. Caput habet oblongum & anguſtum; roſtrum prolixum; auriculas parvas, & acutas; oculos parvos; crura longa & gracilia; caudam prolixam, criſpatam, & in floccum deſinentem. Pili breves, quaſi lanei, & molliſſimi totum ejus corpus obtegunt: rigidiores tamen & magis ſetoſi ſunt qui dorſum veſtiunt. Color eſt albicans, aut fuſcus & griſeus. Dentes habet caninos ſuperiores maximè ſingulares: ab origine ſurſùm vertuntur, & deindè arcuantur. Cùm ſeneſcit animal, ipſi infrà oculos cutem perforant. Canini inferiores ſunt longiſſimi, & *Aprorum* caninis (Gallicè *défenſes* dictis) ſimiles. Habitat in *Indiâ Orientali*.

Digitized by Google

6. Le Sanglier du Méxique.

Sus ecaudatus, folliculum ichorosum in dorso gerens... Aper Mexicanus.

Sus dorso Cystifero, caudâ nullâ. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 28. sp. 3.*
Porcus Moschiferus umbilicum in dorso habens. *Klein. Quadr. p. 25.*
Sus umbilicum in dorso habens. *Aldro. Quadr. Bis. p. 939.*
Sus minor umbilico in dorso. *Barr. Hist. Fr. Eq. p. 161.*
Tajacu, seu Aper Mexicanus Moschiferus. *Raj. Syn. Quadr. p 97.*
Tajacu. *Pison. Hist. nat. Fig. p. 98.* [*Fig. bona, si caudam non haberet*].
Tajacu; Caaigoara Brasilienſibus. *Maregr. Hist. Br. Fig. p. 229.* (*Fig. eadem, ut suprà*].
Porcus Americanus. *Charlet. Exer. p. 14.*
Zainus. *Jonst. Quadr. p. 75. Fig. T. 46. sub isto nomine*, Zainus, S. Tajacu, Porcus Sylvester. [*Fig. ut suprà*].
Eus. Nieremb. Fig. p. 170. (*Fig. eadem*).
Aper Indicus, Zainus; aliis Coja-Metl. *Mus. Worm. p. 340.*
Quauhtla Coymatl. Quapizotl. Aper Mexicanus. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 637.* [*Fig. bona*].
Coyametl, seu Quauhcoyametl. *Fern. Hist. N. Hisp. p. 8.*
Sanglier appellé *Pecaris. Des March. Tom. III. p. 312.*
Les François de la Guiane l'appellent Cochon noir. *Barr.*
Les Mexiquains, Musk-Hog. *Klein.*

Porco domestico magnitudine cedit. Collum habet breve & crassum; auriculas erectas, & acuminatas, 3 circiter pollices longas; oculos parvos; caudam nullam. Corpus undique obsitum est setis *porcinis* crassioribus, è nigro canescentibus, vel è nigro & incano variegatis; quæ setæ in imis lateribus breviores, paulatim longitudine augentur ad medium usque dorsum, ubi nonnullæ 5 aut 6 digitos longæ sunt. Ab aliis

Il est un peu plus petit que le *Cochon domestique*. Il a le col court & épais; les oreilles droites, pointues, & longues d'environ 3 pouces; les yeux petits. Il n'a point du tout de queue. Tout son corps est couvert de soyes plus grosses que celles des *Cochons ordinaires*, noires, mêlées d'un peu de blanchâtre. Ces soyes sont courtes vers le bas des côtés, & elles sont de plus en plus longues à mesure qu'elles s'approchent du dos, où il y en a qui ont 5 ou 6 doigts de longueur.

Digitized by Google

Il différe principalement des autres eſpeces de ce genre par une eſpece de bourſe qu'il a ſur le dos vers la partie poſtérieure, d'où découle une liqueur d'une odeur déſagréable. On le trouve au *Mexique*, dans la *Guiane*, & au *Bréſil*.

hujus generis ſpeciebus præcipuè differt folliculo, quem versùs clunes in dorſo gerit, ex quo ingrati odoris liquor emanat. Habitat in *Mexico*, *Guianâ*, & *Braſiliâ*.

ORDO VIII.

ORDO VIII.

QUADRUPEDA

Dentibus incisoribus in utrâque maxillâ, & tribus digitis ungulatis in singulis pedibus donata.

RHINOCEROS solus hunc Ordinem constituit.

XVI.

Genus Rhinocerotis.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ duo, à se invicem plurimùm remoti:
In singulis pedibus digiti tres ungulati:
Cornu in naso.

Obs. Uniuscujusque maxillæ pars anterior aliquo modo plana est, vel potiùs quasi quadratim truncata; & unusquisque dens incisorius in angulis, partibus maxillarum anterioribus & lateralibus constitutis, situs est. Dentes caninos non habet; sed 12 sunt molares in utrâque maxillâ, 6 utrinque.

ORDRE VIII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & trois doigts ongulés à chaque pied.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul QUADRUPEDE, qui est le *Rhinoceros*.

XVI.

Le Genre du Rhinoceros.

Son caractere est
D'avoir à chaque mâchoire deux dents incisives, très éloignées l'une de l'autre:
Trois doigts ongulés à chaque pied:
Une corne sur le nez.

Obs. La partie antérieure de chacune de ses mâchoires est en quelque façon applatie, ou plûtôt comme coupée quarrément, & chacune des dents incisives est placée à peu-près dans un des angles formés par le devant des mâchoires & leurs côtés. Il n'a point de dents canines; mais il a à chaque mâchoire 12 dents molaires, 6 de chaque côté.

Digitized by Google

** 1. Le Rhinoceros.

RHINOCEROS.

Rhinoceros cornu unico conico. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 25. ſp. 1.*
Rhinoceros. *Raj. Syn. Quadr. p. 122.*
Klein. Quadr. p. 26.
Geſn. Quadr. p. 952. Fig. p. 953. (*Fig. mala*).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 60. [*Fig. mala*].
Aldro. Quadr. Biſ. p. 878. Fig. p. 884. [*Fig. mala*].
Jonſt. Quadr. p. 66. Fig. T. 38. (*Fig. mala*).
Muſ. Worm. p. 336.
Charlet. Exer. p. 12.
Abada, ſive Rhinoceros. *Bont. Ind. Ori. p. 50. Fig. p. 51.* [*Fig. ſat bona, ſi digiti ungulati eſſent*].
Naricornis Catelani. *Klein.*
Rhinoceros. *Kolbe. Tom. III. p. 15. Fig. p. 14.* (*Fig. mauvaiſe*).
Porte-Corne. *Klein.*
Les Hébreux l'appellent Reem. *Geſn.*
Les Chaldéens, Karas, *ou* Karasch. *Geſn.*
Les Grecs, Πίνκερως.
Les Perſes, Elkerkedom. *Klein.*
Les Italiens, Rhinocerote. *Klein.*
Les Polonois, Nozorozec; Zebati. *Klein.*
Les Suédois, Enhörning. *Linn.*
Les Habitans du Cap de B. Eſp. Tuabba; Nabba. *Klein.*
Les Indiens, Sanda Benambt. *Geſn.* Gomela. *Klein.*
Les Habitans de Java, Abada; Noemba. *Klein.*

Il a, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à terre, environ 6 pieds; depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 12 pieds: le tour de ſon corps eſt égal à ſa longueur. Sa tête eſt oblongue; ſes yeux petits; ſes oreilles ſemblables à celles d'un *Cochon*: ſa lévre ſupérieure, qu'il peut étendre & retirer à volonté, eſt beaucoup plus longue que l'inférieure, & pointue. Il porte une corne ſur le nez; (Quelques Au-

A parte ſuperiore dorſi ad terram uſque, 6 pedes circiter altus eſt; ab extremitate oris ad caudam, 12 pedes circiter longus: ambitus corporis longitudini æqualis. Caput habet oblongum; oculos parvos; auriculas *porcinis* ſimiles; labium ſuperius, quod extendere & contrahere poteſt, inferiore multò longius, & valdè acutum; in naſo cornu unum, (quandoque duo, ſecundùm Authores quoſ-

dam) ; caudam 2 pedes longam. Cutis ex cinereo nigrescit, estque admodum rugosa, cum profundis plicaturis in collo, dorso, lateribus & cruribus. Pilos non habet, nisi in caudâ, & auriculis. Habitat in *Africæ* desertis, inque regnis *Bengalæ*, & *Patanæ Asiæ*.

teurs prétendent qu'il en a quelquefois deux). Sa queue est longue de 2 pieds. Sa peau est d'un gris presque noir, très raboteuse, avec des plis considérables au col, sur le dos, aux côtés, & aux jambes. Il n'a des poils qu'aux oreilles, & à la queue. On le trouve dans les déserts de l'*Afrique*, & dans les Royaumes de *Bengale*, & de *Patane* en *Asie*.

Digitized by Google

ORDRE IX.

LES QUADRUPEDES

Qui ont deux dents inciſives à chaque mâchoire, & quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul QUADRUPEDE, qui eſt le *Cabiai*.

XVII.

Le Genre du Cabiai.

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire:
Quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Obſ. Il n'a point de dents canines; mais ſes dents molaires ſont ſingulieres: il en a 8 à chaque mâchoire, 4 de chaque côté, chacune deſquelles équivaut à trois; car elles ſont fendues à demi, chacune en trois parties, & repréſentent 3 dents attachées les unes aux autres.

ORDO IX.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ duobus, & quatuor digitis ungulatis in pedibus anticis, & tribus in poſticis donata.

UNICUM QUADRUPEDEM continet hic Ordo, ſcilicet, *Hydrocharum*.

XVII.

Genus Hydrocheri.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:
Quatuor digiti ungulati in pedibus anticis, & tres in poſticis.

Obſ. Dentibus caninis caret. Dentes verò molares maximè ſunt ſingulares: 8 ſunt in quâlibet maxillâ, 4 utrinque: unuſquiſque dens tribus æquivalet dentibus; tripartitus enim eſt ſecundùm dimidiam altitudinem, treſque dentes inſeparabiles repræſentat.

Digitized by Google

1. Le Cabiai.

HYDROCHŒRUS.

Capybara Brasilienſibus: Porcus fluviatilis, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 126.
Capybara Brasilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 230. (*Fig. bona*).
Capybara. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 99. (*Fig. bona*).
Porcus fluviatilis. *Jonſt. Quadr. p.* 73. *Fig. T.* 60. (*Fig. bona*).
Sus maximus paluſtris. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 160.
Cochon d'eau. *Des March. T. III. p.* 314.
Les Européens de la Guiane l'appellent Cochon d'eau. *Des March.*
Les Guianois, Cabiai, & Cabionara. *Barr.*
Les Indiens, Capybara. *Des March.*

Bimum *Porcum* magnitudine circiter exæquat. Longitudo corporis, à capite ad anum, circiter 2 pedum eſt. Caput 7 aut 8 pollices longum, & totidem ferè craſſum; os craſſum & obtuſum; maxilla inferior ſuperiore brevior; oculi magni nigri; auriculæ parvæ, parumper acutæ. Barbam habet *felinam*, pilis longis & rigidis compoſitam: caudâ caret. In ſingulis pedibus anterioribus quatuor habet ungulas, quarum media longior eſt, duæ laterales breviores, & quarta minima; in poſterioribus verò pedibus tres tantùm ungulas, quarum media aliis longior. Pilus totius corporis fuſcus eſt, rigidus, brevis, & denſus. Habitat in *Guianâ* & *Braſiliâ*.

Il eſt à peu près de la grandeur d'un *Cochon* de 2 ans. Il a, depuis la tête juſqu'à l'anus, environ 2 pieds. Sa tête a 7 à 8 pouces de longueur, & preſque autant d'épaiſſeur: ſon muſeau eſt gros & obtus; la mâchoire inférieure plus courte que la ſupérieure; ſes yeux grands & noirs; ſes oreilles petites & pointues. Il a des mouſtaches longues & dures, comme celles d'un *Chat*: il n'a point de queue. Il a à chaque pied de devant 4 ongles: celui du milieu eſt le plus long, les deux des côtés plus courts, & le quatriéme le plus petit; & aux pieds de derriere trois ſeulement, dont le milieu eſt plus long que les deux autres. Tout ſon corps eſt couvert d'un poil brun, rude, court, & aſſez épais. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

Digitized by Google

ORDRE X.

LES QUADRUPEDES

Qui ont dix dents inciſives à chaque mâchoire, & quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

CET Ordre ne contient qu'un ſeul QUADRUPEDE, ſçavoir le *Tapir* ou *Manipouris*.

XVIII.

Le Genre du Tapir, ou Manipouris.

Son caractere eſt
D'avoir dix dents inciſives à chaque mâchoire :
Quatre doigts ongulés aux pieds de devant, & trois à ceux de derriere.

Obſ. La partie antetieure de chaque mâchoire ſe termine en pointe, & eſt garnie de 10 dents inciſives : il n'a point de dents canines ; mais il en a dix grandes molaires à chaque mâchoire, 5 de chaque côté, un peu diſtantes des inciſives : ce qui fait en tout 40 dents.

ORDO X.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utráque maxillá decem, & quatuor digitis ungulatis in pedibus anticis, & tribus in poſticis donata.

UNICUM eſt in hoc Ordine QUADRUPES, ſcilicet *Tapirus*.

XVIII.

Genus Tapiri.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utráque maxillâ decem :
Quatuor digiti ungulati in pedibus anticis, & tres in poſticis.

Obſ. Maxillæ ambæ anteriùs faſtigatæ ſunt, & in qualibet decem ſunt dentes inciſores ; canini nulli ; molares 10, quinque utrinque, magni, ab inciſoribus diſtantes. Summa dentium 40.

Digitized by Google

1. Le Tapir, ou Manipouris.

TAPIRUS.

Tapiierete Brasilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 118.
Klein. Quadr. p. 36.
Jonſt. Quadr. p. 74.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 229. (*Fig. bona*).
Tapiierete. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 101. (*Fig. bona*).
Sus aquaticus multiſulcus. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 161.
Les Portugais l'appellent Anta. *Raj. Jonſt. Marcgr. Piſon.*
Les Guianois, Tapir; Maypoury, *ou* Manipouris. *Barr.*

Magnitudine *Juvencum* ſemeſtrem exæquat. Figurâ corporis quodammodo ad *Porcum* accedit; capite tamen craſſiori, oblongo, ſuperiùs in acumen deſinente; labio ſuperiore quàm inferius multò longiore, præeminente, fiſſuris oblongis donato, quodque validiſſimo nervo contrahere & extendere poteſt. Oculos habet parvos *porcinos*; auriculas obrotundas, majuſculas; caudam breviſſimam, conicam, pilis nudam; crura vix *porcinis* longiora, at craſſiuſcula; in anterioribus pedibus quatuor ungulas nigricantes, quarum media longior eſt, duæ laterales breviores, & quarta exterior minima; in poſterioribus verò pedibus tres tantùm ungulas, quarum media aliis longior. Pili breves ſunt: color ipſorum in junioribus eſt umbræ lucidæ, maculis albis

Il eſt de la grandeur d'un *Veau* de 6 mois. Quant à la figure du corps, il approche de celle d'un *Cochon*; il a cependant la tête plus groſſe, oblongue, & dont la partie ſupérieure ſe termine en pointe. La lévre ſupérieure, qu'il peut étendre & contracter à volonté, eſt beaucoup plus longue que l'inférieure, très élevée, & comme garnie de ſillons dans ſa longueur. Il a de petits yeux de *Cochon*; des oreilles arrondies, aſſez grandes; la queue très courte, conique & dénuée de poils; les jambes à peu près de la longueur de celles d'un *Cochon*, mais un peu plus groſſes: il a à chacun des pieds de devant 4 ongles noirâtres; celui du milieu eſt le plus long, les deux des côtés plus courts, & le quatriéme, qui eſt extérieur, le plus petit; & aux pieds de derriere 3 ſeulement, dont le milieu eſt plus long que les deux autres. Son poil eſt court: dans

Digitized by Google

les jeunes ; il eſt de couleur d'ombre brillante, variée de taches blanches ; & dans les adultes il eſt brun, ou noirâtre, ſans taches. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

variegatus ; in adultis fuſcus ; ſive nigricans, ſine maculis. Habitat in *Guianâ* & *Braſiliâ*.

ORDO XI.

ORDO XI.

QUADRUPEDA

Dentibus incisoribus in utrâque maxillâ, & quatuor digitis ungulatis in singulis pedibus donata.

HIc Ordo, sicut & tres præcedentes, unico QUADRUPEDE constituitur, scilicet *Hippopotamo.*

XIX.

Genus Hippopotami.

Hujus character est

Dentes incisores in utrâque maxillâ quatuor; superiores per paria remoti; inferiores rectè antrorsùm prominentes, intermedii lateralibus multò longiores:

In singulis pedibus digiti quatuor ungulati.

Obs. Hippopotami dentium numerus 44; scilicet incisores 8, 4 in utrâque maxillâ; canini 4, duo utrinque; omnes cilindrici: canini oblique truncati: molares 32, octo utrinque in utrâque maxillâ.

ORDRE XI.

LES QUADRUPEDES

Qui ont des dents incisives aux deux mâchoires, & quatre doigts ongulés à chaque pied.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans les trois précédents, qu'un seul QUADRUPEDE, sçavoir *l'Hippopotame.*

XIX.

Le Genre de l'Hippopotame.

Son caractere est

D'avoir à chaque mâchoire quatre dents incisives; dont les supérieures sont séparées par paires, & les inférieures avancent en avant parallélement à la mâchoire, & les deux du milieu sont beaucoup plus longues que celles des côtés:

Quatre doigts ongulés à chaque pied.

Obs. L'Hippopotame a en tout 44 dents, sçavoir 8 incisives, 4 à chaque mâchoire; 4 canines, 2 de chaque côté; toutes ces dents sont cilindriques: les canines sont comme coupées en biseau: 32 molaires, 8 de chaque côté à chaque mâchoire.

Digitized by Google

* 1. L'HIPPOPOTAME.

HIPPOPOTAMUS.

Hippopotamus. Bupotamus. *Klein. Quadr. p.* 34. *Fig. T.* 3. (*Fig. mala*).
Hippopotamus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 123.
Linn. syst. nat. ed. 6. *g.* 26. *sp.* 1.
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 82. (*Fig. pessima*).
Gesn. Icon. Aquat. Fig. p. 354. (*Fig. eadem, ut suprà*).
Gesn. Pisc. Fig. p. 494. (*Fig. eadem*).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 181. *Fig. p.* 183. & 184. [*Fig. sat bonis*].
Jonst. Quadr. p. 76. *Fig. T.* 49. (*Fig. pessimis*).
Bell. de Aquat. p. 22. *Fig. p.* 23. [*Fig. mala*].
Charlet. Exer. p. 14.
Prosp. Alp. Ægypt: Vol II. p. 246. *Fig. T.* 23. (*Fig. sat bona*).
Hippopotamus Antiquorum. *Colum. Aquat. p.* 28. *Fig. p.* 30. (*Fig. bona*).
Caballus marinus. *Flor. Sin. p. I. Fig. T. I.* (*Fig. bona, exceptis pedibus*).
Cheval marin, ou Hippopotame. *Kolbe. Tom. III. p.* 27. *Fig. p.* 64. *F.* 1. (*Fig. mauv.*).
Bomarin. *Klein.*
Les Grecs l'appellent ιπποποταμος.
Les Egyptiens, FORAS FLEBAR. *Aldrov.*
Les Chinois, HAYMA. *Flor. Sin.*
Les Suédois, BEHEMOT. *Linn.*

Il a, depuis la tête jusqu'à la queue, 13 pieds de long : le diametre vertical de son corps a 3 ½ pieds, & le diametre horizontal 4 ½ pieds. Le tour de son corps est de 13 pieds. Sa tête a 2 ½ pieds de large, & 3 pieds de long ; l'ouverture de la bouche 1 pied ; ses jambes 3 ½ pieds de long depuis le ventre jusqu'à terre, & 3 pieds de tour. Son museau est gros & charnu ; ses yeux petits ; ses oreilles minces, & longues de 3 pouces. Sa queue, qui a un pied de long, est grosse à son origine, & se termine tout à coup en pointe.

Longitudo corporis, à capite ad caudam, 13 pedum est : corporis diameter verticalis 3 ½ pedum, diameter horizontalis 4 ½ pedum. Ambitus corporis longitudini æqualis ; caput 2 ½ pedes latum, 3 pedes longum ; oris rictus 1 pedem ; crura à terrâ ad ventrem 3 ½ pedes longa ; crurum ambitus 3 pedes. Rostrum crassum & carnosum ; oculi parvi ; auriculæ 3 uncias longæ, & tenues. Cauda 1 pede longa, ab origine crassa, & statim in acutum desinens. Cutis admodum

Digitized by Google

crassa, dura, & colore obscuro. Pilos non habet, nisi in extremitate caudæ, & in rostro, in quo est barba *Leoninæ* & *Felinæ* similis. Habitat in *Africâ*, & in *Indo Indiæ* fluvio.

Sa peau est très épaisse, dure, & d'une couleur obscure. Il n'a point de poil, excepté au bout de la queue, & au museau, où il a une moustache pareille à celle des *Lions* & des *Chats*. On le trouve en *Afrique*, & dans l'*Inde* sur le fleuve *Indus*.

Digitized by Google

ORDRE XII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont deux dents inciſives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

LE plus grand nombre des QUADRUPEDES de cet Ordre n'a point de dents canines ; quelques uns en ont. Parmi les uns & les autres, il y en a qui ont des piquans ſur le corps, les autres n'ont que du poil. Ils ſe diviſent en quatre Sections. La premiere contient ceux qui n'ont point de dents canines, & qui ont des piquans ſur le corps, comme le *Porc-Epic*. La ſeconde ceux qui n'ont ni dents canines, ni piquans ſur le corps, mais qui l'ont ſeulement couvert de poils, comme le *Caſtor*, le *Liévre*, le *Rat*, &c. La troiſiéme ceux qui ont des dents canines, & qui n'ont point de piquans ſur le corps, comme la *Muſaraigne* : & la quatriéme ceux qui ont des dents canines, & des piquans ſur le corps, comme le *Hériſſon*.

ORDO XII.

QUADRUPEDA.

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ duobus, & digitis unguiculatis donata.

PLeraque hujus Ordinis QUADRUPEDA dentibus caninis carent ; quædam verò illis dentibus donantur. Ex utriſque quædam habent corpus aculeatum, vel aculeis tectum, alia ſunt corpore tantummodò piloſo. In quatuor Sectiones dividuntur. Prima continet ea quæ dentibus caninis carent, quæque corpus aculeatum habent, ſicut *Hyſtrix*. Secunda ea quæ nec dentes caninos, nec corpus aculeatum, ſed tantummodò piloſum habent, ſicuti *Caſtor*, *Lepus*, *Mus*, &c. Tertia ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeis deſtitutum habent, ut *Muſaraneus*. Quarta denique ea quæ dentes caninos habent, & corpus aculeatum, vel aculeis tectum, ſicut *Erinaceus*.

Digitized by Google

SECTIO I.

Ea quæ dentibus caninis carent ; quæque corpus aculeatum habent.

UNICO Genere, scilicet *Hystricis*, constituitur hæc Sectio.

X X.

Genus Hystricis.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeatum.

Obs. Omnium hujus Generis specierum dentes incisores contigui sunt & cultrati.

SECTION I.

Ceux qui n'ont point de dents canines, & qui ont des piquans sur le corps.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul genre, sçavoir celui du *Porc-Epic*.

X X.

Le Genre du Porc-Epic.

Son caractere est
D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Des piquans sur le corps.

Obs. Les dents incisives de toutes les espéces de ce Genre sont contigues & tranchantes.

** 1. LE PORC-EPIC.

Hystrix, capite cristato... HYSTRIX.

Hystrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 17. sp. 1.*
Hystrix. *Gesn. Quadr. p. 631. Fig. p. 632. (Fig. bona, exceptis dentibus).*
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 87. (Fig. eadem, ut suprà).
Aldrov. Quadr. Dig. Viv. p. 471. Fig. p. 474. (Fig. sat bona).
Jonst. Quadr. p. 119. Fig. T. 68. (Fig. bona).
Raj. Syn. Quadr. p. 206.
Charlet. Exer. p. 19.
Mus. Worm. p. 335.
Hystrix Orientalis cristata. *Seb. Vol. I. p. 79. Fig. T. 50. F. 1. [Fig. bona].*
Acanthion cristatus. *Klein. Quadr. p. 66.*
Porc-Epic. *Kolbe. T. III. p. 44. Fig. p. 64. F. 2. [Fig. bonne].*
Hist. de l'Acad. T. III. Part. 2. p. 33. Fig. Pl. 41. (Fig. bonne).

Digitized by Google

Les Grecs l'appellent Τριξ.
Les Eſpagnols, PUERCO-ESPIN. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, HISTRICE, *ou* PORCO SPINOSO. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, PORCUPINE. *Raj.* PORTEPYNE. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, PORCO SPINO. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, MEERSCHWEYN ; DORNSCHWEYN ; STACHELSCHWEYN ; PORCOPICT ; TARAN. *Geſn.*
Les Suédois, PIGG SWIN. *Linn.*

Il a 2 ½ pieds de long, depuis le muſeau juſqu'à l'anus. Ses jambes ſont fort courtes : celles de devant n'ont que quatre pouces depuis le ventre juſqu'à terre, & celles de derriere 6. Sa tête a 5 pouces de long. Sa lévre ſupérieure eſt fendue comme celle d'un *Liévre* : ſes yeux ſont petits ; ſes oreilles reſſemblent à celles de l'homme. Il n'a point de queue. Il a à chaque pied 5 doigts (*a*) : il y en a un de ceux de devant qui eſt fort petit, & dont il n'y a que l'ongle qui paroît au dehors. Le dos & les côtés ſont couverts de piquans un peu courbés comme des alênes, pointus, de différentes longueurs & différentes groſſeurs, variés de blanc, & de brun noirâtre. Il y en a de tout à fait blancs. Les plus gros ſont les moins longs ; ils ont depuis 6 juſqu'à 12 pouces : les autres ont 15 pouces, & ſont flexibles. Il

Longitudo corporis, ab ore ad anum, 2 ½ pedum eſt. Crura breviſſima ; anteriora à ventre ad terram 4 tantùm pollices, poſteriora verò 6 longa ſunt. Caput 5 pollices longum. Labium ſuperius, ut in *Lepore*, fiſſum : oculi parvi : auriculæ auriculis humanis ſimiles : cauda nulla. In ſingulis pedibus 5 ſunt digiti (*a*), quorum unus pedum anteriorum minimus, ungue tantummodò exteriùs apparente. Dorſum & latera teguntur aculeis ad inſtar ſubularum parumper incurvis, acuminatis, longitudine & craſſitie variis, ex nigro, fuſco, & albo diſtinctis : dantur etiam omninò albi. Craſſiores longitudine ſunt minores ; 6 inter & 12 pollices longi ſunt ; tenuiores verò 15 pollicum longitudinem attingunt, & flexibiles ſunt. In

(*a*) Pluſieurs Auteurs ne lui donnent que 4 doigts aux pieds de devant. J'ai vû au *Cabinet du Roi* 2 ſquélétes de cet Animal, dont un avoit 5 doigts aux pieds de devant, & l'autre n'en avoit que 4.

(*a*) Secundùm Authores plurimos 4 ſunt tantùm in pedibus anterioribus digiti. 2 Hyſtricis ſceleta in *Muſeo Regio* vidi, quorum alter in pedibus anterioribus 5 digitis, alter verò 4 tantùm donabatur.

Digitized by Google

parte posteriore capitis & colli pulchra est quasi crista, conflata plurimis aculeis tenuissimis, & flexibilibus, setis *Apri* similibus, longitudine inæqualibus, aliis unius pedis, aliis minùs longis; quorum medietas versùs originem alba est in aliquibus, alterâ medietate cinereâ, in aliis verò viceversâ. Pectus & venter similibus ornantur setis. Habitat in *Africâ*, *Sumatrâ*, & *Javâ*.

a sur le derriere de la tête & du col une espece de panache, formée de quantité de piquans fort déliés & flexibles, assez semblables aux soies du *Sanglier*, & de longueur inégale, quelques uns ayant un pied de long, dont la moitié vers la racine est blanche dans quelques uns & le reste gris, & dans d'autres tout au contraire. La poitrine & le ventre sont couverts de soyes à peu près pareilles. On le trouve en *Afrique*, à *Sumatra*, & à *Java*.

2. Le Porc-Epic de la Nouvelle Espagne.

Hystrix aculeis apparentibus, caudâ brevi & crassâ... Hystrix Novæ Hispaniæ.

Hoitzlacuatzin, seu Tlacuatzin spinosum. Hystrix Novæ Hispaniæ. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p.* 322. (*Fig. sat bona*).
Hoitzlaquatzin. *Eus. Nieremb. Fig. p.* 154. (*Fig. sat bona*).

Canis mediocris magnitudinem adæquat. Totum corpus, exceptis ventre & cruribus, tegitur aculeis peracutis, 3 pollices longis, tenuibus, candentibus & luteis, sed mucronibus nigricantibus; pilis tamen quibusdam mollibus, atris, sed circa exortum candentibus, si caput excipias, intermixtis. Cauda brevis est & crassa, aculeorum à media parte usque ad extremum expers. Hæc caudæ medietas, sicut & venter & crura, pilis tantùm teguntur nigris. Habitat in *Novâ*

Il est de la grandeur d'un *Chien* d'une moyenne taille. Tout son corps, excepté le ventre & les jambes, est couvert de piquans très aigus, longs de 3 pouces, menus, variés de blanc & de jaune, avec la pointe noire. Parmi ces piquans, excepté à la tête, sont quelques poils noirs, terminés par un peu de blanc, & doux au toucher. La queue est courte & grosse; elle n'a point de piquans depuis la moitié de sa longueur jusqu'à son extrémité: cette partie est seulement couverte de poils noirs, ainsi que le ventre & les jambes. On le trou-

Digitized by Google

ve dans la *Nouvelle Eſpagne*, le plus ſouvent ſur les montagnes.

Hiſpanid, ac montoſis gaudet locis.

3. Le Porc-Epic de la Baye de Hudson.

Hyſtrix aculeis ſub pilis occultis, caudâ brevi & craſsâ... Hystrix Hudsonis.

Cavia Hudſonis. *Klein. Quadr. p.* 51.*
Porc-Epic de la Baye de Hudſon. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. p.* 56. *Fig. p.* 58. (*Fig. bonne*).
Edwards. Tom. I. Fig. p. 52. (*Fig. bonne*).
Porc-Epic de l'Amérique Septentrionale. *Cat. App. p.* 30.

Il reſſemble beaucoup au *Caſtor* par ſa taille & ſa groſſeur. Sa tête eſt allongée, comme celle d'un *Lièvre*. Il a le nez plat, & tout à fait couvert de poils courts; les oreilles très courtes, & qui paroiſſent à peine au-deſſus de la fourrure; les jambes courtes; des ongles longs & pointus, 4 aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; la queue d'une longueur médiocre, & aſſez groſſe, plus épaiſſe vers le corps qu'à ſon extrémité, qui eſt blanche en deſſous. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un brun obſcur, aſſez doux au toucher, longs de 4 pouces, plus courts cependant autour de la tête & proche des pattes, & un peu plus longs ſur le derriere de la tête. Sous ces poils ſur la partie ſupérieure de la tête, du corps & de la queue, ſont cachés des piquans blancs, dont les pointes ſont noires & très aigues, & dont les plus

Quoad magnitudinem & craſſitiem *Caſtorem* æmulatur. Caput habet oblongum, *Leporis* capiti ſimile; naſum planum, pilis brevibus omninò tectum; auriculas breviſſimas, ſub pilis ferè occultas; crura brevia; digitos 4 in pedibus anterioribus, 5 in poſterioribus, longis & acutis unguibus munitos; caudam mediocris longitudinis, & craſſam, craſſiorem tamen ad originem quàm in extremitate, quæ infrà eſt alba. Per univerſum corpus veſtitur pilis ſordidè fuſcis, parumper mollibus, 4 pollicum longis, brevioribus tamen circà caput & propè crura, & paulò longioribus in parte capitis poſteriore; ſub quibus pilis in parte ſuperiore capitis, corporis & caudæ, occultantur aculei candentes, mucronibus nigris & peracutis, quorum majores

3 pollices

3 pollices æquant. Præter prædictos pilos molles, quidam sunt intermixti multò longiores, rigidi, & rari, fordidè albo terminati; quibus ope quibusdam in locis aliquid cinerei apparet. Habitat in freto *Hudsonis*, & etiam in omni *Americæ Septentrionali regione.*

longs le sont de 3 pouces. Outre ces poils doux, il y en a quelques uns de beaucoup plus longs, roides & clair-semés, dont le bout est d'un blanc sale; ce qui fait paroître la fourure un peu grisâtre en quelques endroits. On le trouve à la *Baye de Hudson*, & même dans toute la partie *Septentrionale* de l'*Amérique.*

4. Le Porc-Epic d'Amerique.

Hystrix caudâ longissimâ, tenui, medietate extremâ aculeorum experte... Hystrix Americanus.

Hystrix pedibus tetradactylis, caudâ exsertâ prehensili seminudâ. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 17. sp. 2.*
Hystrix Americanus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 208.
Hystrix minor leucophæus. *Barr. Hist. Fr. eq. p.* 153.
Cuandu. *Jonst. Quadr. Fig. T.* 60. (*Fig. bona*).
Pison. Hist. Nat. Fig. p. 99. (*Fig. bona*).
Cuandu Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. Fig, p.* 233. (*Fig. bona*).
Chat épineux. *Des March. T. III. p.* 303.
Les Portugais l'appellent Ourico Cacheiro. *Pison. Marcgr. Des March.* Espinho. *Pison.*
Les Indiens, Cuandu. *Des March.*
Les Habitans de la Guiane, Gouandou. *Barr.*

Corporis longitudo, ab occipitio ad initium caudæ, 1 pedis est; caudæ autem 1 pedis & 5 pollicum; crurum anteriorum circiter 4 pollicum, posteriorum paulò major. Caput habet parvum; rostrum oblongum; oculos rotundos, prominentes, instar carbunculi, fulgidos; auriculas parvas, sub aculeis ferè latitantes; nares patentes; pedes pedibus *Simiarum*

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à la queue, est d'environ 1 pied; celle de sa queue d'un pied 5 pouces; celle des jambes de devant d'environ 4 pouces, & celle des jambes de derriere un peu plus. Sa tête est petite; son museau allongé; ses yeux ronds, élevés & brillants comme des charbons ardents; ses oreilles petites & presque cachées sous les piquans; les narines ouvertes. Ses pieds

approchent de ceux du *Singe* ; il n'a cependant que 4 doigts à chaque pied, & point de pouce. Tout son corps, exceptez ses pieds, est couvert de piquans de 3 ou 4 pouces de longueur, jaunes depuis leur origine jusqu'à la moitié de leur longueur, l'autre moitié noire ou d'un brun roux, terminée par une pointe blanche & très aiguë. Les piquans qui couvrent la tête & les jambes, sont moins longs. Il a autour des narines des poils longs de 3 ou 4 pouces, qui lui font une barbe semblable à celle des *Chats*. Sa queue n'a des piquans que depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur ; l'autre moitié n'est couverte que de quelques poils semblables aux soyes de *Cochon*, & très clair-semés. On le trouve en *Amérique*.

ferè similes, sed 4 tantummodò digitis constantes ; nam pollice caret. Totum corpus, pedibus exceptis, munitum est aculeis 3 aut 4 pollicum longis, ab insitione in cutem ad dimidiam ferè longitudinem flavescentibus, alterâ medietate nigrâ, aut ex rufo fuscâ, cuspide albo & peracuto. Aculei, quibus caput & crura cooperiuntur, minore longitudine donantur. Pilos habet circum nares 3 aut 4 pollicum longos, qui barbam *felinam* ipsi faciunt. Cauda, ab exortu suo ad medietatem tantùm, aculeis munitur, alterâ medietate raris setis, *Porcorum* instar, obsitâ. Habitat in *Americâ*.

5. Le Grand Porc-Epic d'Amerique.

Hystrix caudâ longissimâ, tenui, medietate extrema aculeorum experte... Hystrix Americanus major.

Hystrix longiùs caudatus, brevioribus aculeis. *Barr. Hist. Fr. eq. p.* 153.
Hystrix. *Bont. Ind. Ori. Fig. p.* 54. (*Fig. bona*).
Cuandu major. *Pison. Hist. Nat. p.* 324. *Fig. p.* 325. (*Fig. bona*).
Les Portugais l'appellent Orico Cachero, & Espinho. *Pison.*

Il ne différe du précédent, que parce qu'il est plus grand. On le trouve aussi en *Amérique*.

Magnitudine tantùm, quâ eum antecellit, à præcedente differt. Habitat etiam in *Americâ*.

6. Le Porc-Epic des Indes Orientales.

Hystrix caudâ longissimâ, aculeis undique obsitâ, in extremo panniculatâ... Hystrix Orientalis.

Hystrix pedibus pentadactylis, caudâ exsertâ. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 172 sp. 3.*

Porcus aculeatus sylvestris, sive Hystrix Orientalis singularis. *Seb. Vol. I. p. 84. Fig. T. 52. F. 1. (Fig. optima).*

Acanthion caudâ prælongâ acutis pilis horridâ, in exitu quasi panniculatâ. *Klein. Quadr. p. 67.*

Corpus habet crassum & breve; caput crassum; labium superius, ut in *Lepore*, fissum; oculos magnos splendentes; auriculas parvas, rotundas, intùs omninò nudas; barbam pilis longis & acutissimis conflatam. In singulis pedibus 5 digitis, unguibus crassis & acuminatis munitis, donatur. Pedes posteriores anterioribus sunt longiores, & *Ursinis* similes. Totum corpus, ad extremos usque pedes, tenuissimis & acutissimis munitum est aculeis, quorum, qui supinam corporis partem vestiunt, varios reflectunt colores, pro vario, quo lucis radii incidunt, modo. Caudam habet longissimam, undique obsitam aculeis, quorum, qui extremitatem caudæ cooperiunt, maximè singulares sunt; ex nodis enim veluti articulatis conflati videntur. Horum aculeorum singuli non unius sunt

Il a le corps gros & court; la tête grosse; la lévre supérieure fendue, comme celle d'un *Liévre*; les yeux grands & brillants; les oreilles petites, rondes, & nues intérieurement; une moustache composée de poils longs & très pointus. Il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles gros & aigus. Ses pieds de derriere sont plus longs que ceux de devant, & ressemblent à ceux de l'*Ours*. Tout son corps est hérissé, jusqu'au bout des pieds, de piquans très déliés & très aigus: ceux du dessous du corps paroissent de couleur différente, selon qu'ils reçoivent les rayons de lumiere. Sa queue est très longue, & couverte d'un bout à l'autre de piquans, dont ceux de l'extrémité sont singuliers; car ils semblent composés de nœuds attachés bout à bout les uns des autres. Ces piquans ne sont pas tous de la même longueur, ni de la même grosseur; mais joints ensemble, ils forment comme une espece

Digitized by Google

d'épi. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

longitudinis, nec crassitiei; sed omnes adunati, quasi panniculam referunt. Habitat in *Indiâ Orientali*.

SECTION II.

Ceux qui n'ont ni dents canines, ni piquans sur le corps.

CEtte Section est composée de 6 genres différents, qui se distinguent les uns des autres par la forme de la queue. Les uns l'ont tout à fait platte & écailleuse, comme le *Castor*; d'autres, ou l'ont très courte, ou n'en ont point du tout; & ceux là, ou ont les oreilles longues, comme le *Liévre*, ou ont les oreilles courtes, ou n'en ont point du tout, comme les *Lapins*; d'autres l'ont longue & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît platte, comme l'*Ecureuil*; d'autres l'ont de même longue & couverte de poils, mais rangés de façon qu'elle paroît ronde, comme le *Loir*; d'autres enfin l'ont nue, ou couverte de poils clair semés, comme le *Rat*.

Obs. Les dents incisives de tous les QUADRUPEDES de cette Section, ainsi que de ceux du Genre précédent, sont contigues & tranchantes.

SECTIO II.

Ea quæ dentibus caninis carent, & corpus aculeis destitutum habent.

HÆc Sectio constituitur 6 generibus, formâ caudæ à se invicem discrepantibus: alia enim caudâ donantur omninò planâ & squamosâ, sicut *Castor*; alia vel caudâ brevissimâ, vel caudâ nullâ; inter quæ alia auriculis longis, ut *Lepus*; alia auriculis brevibus, vel nullis, ut *Cuniculus*, prædita sunt; alia caudâ longâ vestitâ pilis ità dispositis, ut caudam planam efficiant, ut *Sciurus*; alia caudâ etiam longâ & vestitâ pilis, sed ità dispositis, ut caudam rotundam efficiant, ut *Glis*; alia denique caudâ nudâ aut raris pilis obsitâ, ut *Mus*.

Obs. Omnium hujus Sectionis QUADRUPEDUM, sicut eorum Generis præcedentis, dentes incisores contigui sunt & cultrati.

Digitized by Google

XXI.

Genus Castoris.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis destitutum:
Cauda plana & squamosa.

Obs. In aliquibus hujus Generis QUADRUPEDIBUS cauda horizontaliter plana est; in aliis verò verticaliter.

XXI.

Le Genre du Castor.

Son caractere est
D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire:
Point de dents canines:
Les doigts onguiculés:
Point de piquans sur le corps:
La queue platte & écailleuse.

Obs. Parmi les QUADRUPEDES de ce Genre les uns ont la queue platte horizontalement; les autres l'ont platte verticalement.

** 1. LE CASTOR, OU LE BIÉVRE.

Castor castanei coloris, caudâ horizontaliter planâ... CASTOR, SIVE FIBER.

Castor caudâ ovatâ planâ. Fiber. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 20. sp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 23.
Castor sive Fiber. *Raj. Syn. Quadr. p. 209.*
Rzac. auct. p. 406.
Castor. Fiber. *Klein. Quadr. p. 91.*
Fiber; Castor; Canis Ponticus. *Gesn. Icon. Aquat. p. 352. Fig. p. 353.* (*Fig. bona*).
Castor. *Gesn. Quadr. Fig. p. 336.* (*Fig. bona*).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 83. (*Fig. mala*). *& p. 84.* (*Fig. bona*).
Gesn. Pisc. p. 219. Fig. p. 220. (*Fig. mala*).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 276. Fig. p. 279. (*Fig. bona*).
Jonst. Quadr. p. 102. Fig. T. 68. (*Fig. bona*).
Mus. Worm. p. 320.
Charlet. Exer. p. 18.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 215.
Fiber. *Bell. de aquat. p. 28. Fig. p. 30.* (*Fig. bona*).
Castor. *Hist. de l'Acad. Tom. III. part. 1. p. 137. Fig. Pl. 19.* (*Fig. bonne*).
Hist. de l'Acad. an. 1704. p. 48.
Cat. App. p. 29.
Les Grecs l'appellent Καστωρ.
Les Espagnols, BEVARO. *Charlet.*
Les Italiens, BIVARO, *ou* BEVERO. *Gesn. Aldro.*

Les Allemands, BIBER. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, & les Polonois, BOBR. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Suédois, BÄFFWER. *Linn.*
Les Flamands, BEVER. *Charlet.*
Les Anglois, BEAVER. *Raj.* BEVER. *Gesn. Aldro.*

Il a environ 2 ½ pieds, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue : le tour de son corps a aussi 2 ½ pieds. Sa queue, qui est plate horizontalement, a 11 pouces de long, & 3 pouces de large vers son milieu, & finit en ovale. Sa tête est ronde, & a 5 ½ pouces, depuis les narines jusqu'à l'occiput. Ses yeux sont petits & noirâtres ; ses oreilles rondes & très courtes, revetues de poil en dehors, & presque nues en dedans ; son col court & épais ; ses jambes très courtes. Il a à chaque pied 5 doigts séparés les uns des autres dans les pieds de devant, & joints ensemble par une forte membrane dans ceux de derriere. Les pieds de devant sont plus petits que ceux de derriere, & représentent une main, dont les ongles sont longs & pointus : ceux des pieds de derriere sont larges & obtus. Tout son corps, excepté sa queue, qui est couverte d'écailles, entre lesquelles sortent quelques petits poils, mais très clair semés, est couvert de poils doux & épais, d'un maron plus foncé dans quelques uns, & plus

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad initium caudæ, 2 ½ pedum ; ambitus corporis totidem. Cauda, quæ horizontaliter plana est, 11 pollices longa, 3 pollicum lata circa medium, in ovalem figuram desinit. Caput rotundum, à naribus ad occipitium 5 ½ pollices longum. Oculi parvi, subnigri ; auriculæ rotundæ, breves, extrorsùm pilosæ, intùs ferè nudæ ; collum breve & crassum ; crura brevia. In singulis pedibus 5 sunt digiti, omnes in anterioribus à se invicem separati, in posterioribus verò validissimâ membranâ inter se connexi. Pedes anteriores posterioribus minores, manum quodammodo referunt. Ungues pedum anteriorum longi sunt & acuti, posteriorum verò lati & obtusi. Totum corpus, exceptâ caudâ, quæ squamis undique tegitur, pilis quibusdam rarissimis intermixtis, vestitur pilis densissimis & mollissimis, in aliquibus saturatioris, in aliis dilutioris cas-

Digitized by Google

tanei coloris (*a*). Habitat in *Occitaniâ*, & in Regionibus *Europæ* & *Americæ Septentrionalibus*.

clair dans d'autres (*a*). On le trouve en *Languedoc*, & dans la partie *Septentrionale* de l'*Europe* & de l'*Amérique*.

** 2. Le Castor blanc.

Castor albus, caudâ horizontaliter planâ... Castor albus.

A præcedente differt colore, qui albus est, cum magnâ maculâ cinereâ, ex rufo paululùm mixtâ, in parte superiore colli, & maculâ simili, sed minori, versus clunes. Pili quoque circà caudæ originem ex flavo rufescunt. Habitat in *Norvegia* & *Canadâ*. Ex Musco *Realmuriano*.

Il différe du précédent par sa couleur. Il est blanc, avec une grande tache grise, mêlée d'un peu de roux, sur la partie supérieure du col, & une pareille, mais plus petite, vers le derriere. Il a aussi plusieurs poils d'un jaune roux autour de l'origine de la queue. On le trouve en *Norvége* & en *Canada*, d'où il a été apporté à M. de *Reaumur*.

** 3. Le Rat musqué.

Castor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus membranis inter se connexis... Mus moschiferus.

Castor caudâ longâ, lanceolatâ, planâ. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 20. sp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 24.
Glis moschiferus. *Klein. Quadr. p. 57.*
Mus Aquaticus Exoticus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p. 217.*
Mus Aquatilis Clusii. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p. 448. (Fig. sat bona).*
Mus Aquaticus Clusii. *Mus. Worm. p. 334.*
Mus Aquaticus. *Jonst. Quadr. Fig. T. 73. (Fig. sat bona).*
Clus. Exot. Fig. p. 375. (Fig. sat bona).
Sorex Moscoviticus, sive odoriferus. *Charlet. Exer. p. 25.*
Animal ex Moscoviâ. *Gaz. Rup. Best. Fig. T. 15.) Fig. bona).*
Les Anglois l'appellent Muscovy, *ou* Musk-Rat. *Raj.*
Les Suédois, Desman. *Linn.*

(*a*) Quidam sunt omninò nigri in *Septentrionalibus* regionibus; & eò saturatior est color quò frigidior est regio quâ inhabitant.

(*a*) Il y en a de tout à fait noirs dans les pays les plus *Septentrionaux*: & en general plus le pays qu'ils habitent est froid, plus leur couleur est foncée.

Digitized by Google

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, 9 pouces; le tour de ſon corps eſt de 7 pouces. Sa tête eſt petite à proportion du corps: la partie ſuperieure de ſon muſeau eſt allongée, comme celle de la *Taupe*; l'ouverture de ſa bouche petite; ſes yeux très petits, & à peine viſibles. Sa queue, qui eſt platte verticalement, a 6 ½ pouces de long, & 8 lignes de large, & ſe termine en pointe obtuſe: elle eſt couverte de très petites écailles, entre leſquelles pouſſent quelques poils. Ses jambes ſont courtes. Il a à chaque pied 5 doigts, tous joints enſemble par de fortes membranes, armés d'ongles longs & forts: les pieds de derriere ſont plus grands que ceux de devant. Tout ſon corps eſt couvert de poils très doux & très épais, d'un brun brillant ſur le dos, & d'un gris blanchâtre & brillant ſous le ventre. Il a une forte odeur de muſc. On le trouve en *Ruſſie*, en *Moſcovie*, & en *Laponie*.

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ originem, 9 pollicum: ambitus 7 pollicum. Caput habet, pro corporis mole, parvum; partem roſtri ſuperiorem, inſtar *Talpæ*, prominulam, oris rictum parvum; oculos valdè exiguos, & vix conſpicuos; caudam verticaliter planam, 6 ½ pollices longam, 8 lineas latam, in apicem obtuſum deſinentem; ſquamis minimis, pilis quibuſdam intermixtis, tectam; crura brevia. Pedes ſinguli in 5 digitos ſunt diviſi, omnes validis membranis inter ſe connexos, longis & validis unguibus munitos: pedes poſteriores anterioribus ſunt majores. Totum corpus veſtitur pilis molliſſimis & denſiſſimis, fuſcis & ſplendentibus in dorſo, & ex albo cinereſcentibus & ſplendentibus in ventre. Moſchum maximè redolet. Habitat in *Ruſſiâ*, *Moſcoviâ* & *Laponiâ*.

** 4. Le Rat musqué de Canada.

Caſtor caudâ verticaliter planâ, digitis omnibus à ſe invicem ſeparatis... Mus moschiferus Canadensis.

Rat muſqué. *Hiſt. de l'Acad. an.* 1725. *p.* 323. *Fig. Pl.* 11. [*Fig. aſſez bonne*].

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue,

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium,

finitium, 1 pedis; ambitus 10 circiter pollicum. Caput habet oblongum, à naribus ad occipitium 2 ½ pollices longum; oculos magnos; auriculas brevissimas; caudam verticaliter planam, 9 pollices longam, & 10 circiter lineas latam, in apicem obtusum desinentem, squamis minimis tectam, pilis quibusdam intermixtis; crura brevia. Pedes singuli in 5 digitos sunt divisi, omnes à se invicem separatos, validis unguibus munitos, pollice distincto: pedes posteriores anterioribus majores. Totum corpus vestitur pilis mollissimis & densissimis, in parte corporis superiore & in thorace rufis, sed saturatiùs in dorso, in gutture & ventre ex albo flavicantibus. Moschum maximè redolet. Habitat in *Canadâ*.

1 pied: le tour de son corps est d'environ 10 pouces. Sa tête est oblongue, & a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 2 ½ pouces: ses yeux sont grands; ses oreilles très courtes. Sa queue, qui est platte verticalement, a 9 pouces de long, & environ 10 lignes de large, & se termine en pointe obtuse: elle est couverte de très petites écailles, parmi lesquelles poussent quelques poils: ses jambes sont courtes. Il a à chaque pied 5 doigts, tous séparés les uns des autres, armés d'ongles forts, le pouce bien distinct: ses pieds de derriere sont plus grands que ceux de devant. Tout son corps est couvert de poils très doux & très épais: toute la partie supérieure du corps, ainsi que la poitrine, est d'un roux, plus foncé sur le dos qu'ailleurs: la gorge & le ventre sont d'un blanc jaunâtre. Il a une forte odeur de musc. On le trouve en *Canada*.

XXII.

Genus Leporinum.

Hujus character est

Dentes incisores in utrâque maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis destitutum:
Cauda brevissima, vel nulla:

Auriculæ longæ.

XXII.

Le Genre du Lièvre.

Son caractere est

D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire:
Point de dents canines:
Les doits onguiculés:
Point de picquants sur le corps:
La queue très courte, ou point de queue:
Les oreilles longues.

Digitized by Google

** 1. Le Liévre.

Lepus caudatus, ex cinereo rufus... Lepus.

Lepus caudâ abrupta, pupillis atris. Lepus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 19. sp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 19.
Lepus vulgaris cinereus. *Klein. Quadr. p. 51.*
Lepus. *Raj. Syn. Quadr. p. 204.*
Gesn. Quadr. Fig. p. 681. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 104. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 347.
Jonst. Quadr. p. 109. Fig. T. 65. (Fig. bona).
Mus. Worm. p. 321.
Charlet. Exer. p. 23.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 219.
Rzac. auct. p. 311.
Liévre. *Kolbe. Tom. III. p. 62.*
Les François appellent le mâle Liévre; *la femelle*, Hase; *le jeune*, Lévraut.
Les Hébreux l'appellent Arnebet. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, Arneba. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Λαγως.
Les Arabes, Ernab. *Gesn. Aldro.*
Les Sarrasins, Arneph. *Gesn. Aldro.*
Les Perses, Kargos. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols, Liébre. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, Lepre, *ou* Lievora. *Gesn. Aldro.*
Les Illyriens, Zagicz. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, Hass, ou Haas. *Gesn. Aldro.* Hase. *Rzac.*
Les Polonois, Zaiac. *Rzac.*
Les Suédois, Hare. *Linn.*
Les Anglois, Hare. *Raj. Gesn.*

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, environ 1 pied 9 pouces : le tour de son corps est d'environ 14 pouces. Sa tête est oblongue, & a depuis les narines jusqu'à l'occiput 3 $\frac{1}{2}$ pouces; ses oreilles 4 pouces; sa queue 2 $\frac{1}{2}$ pouces, & est noire en dessus, & blanche en dessous. Sa lévre supérieure est fendue :

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, circiter 1 pedis & 9 pollicum; ambitus circiter 14 pollicum. Caput habet oblongum, à naribus ad occipitium 3 $\frac{1}{2}$ pollices longum; auriculas 4 pollices; caudam suprà nigram, infrà albicantem, 2 $\frac{1}{2}$ pollicibus

Digitized by Google

longam ; labium superius fissum ; oculos magnos ; crura posteriora anterioribus longiora ; in pedibus anterioribus digitos 5, in posterioribus 4, omnes validis unguibus munitos ; plantam pedum villosam. Totum corpus vestitur pilis mollibus & densis, ex cinereo rufis, excepto in ventre, ubi albicant. Habitat in totâ *Europâ*.

ses yeux sont grands ; ses jambes de derriere plus longues que celles de devant. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere, tous armés d'ongles forts ; le dessous des pieds velu. Tout son corps est couvert de poils doux & épais, variés de roux & de gris, excepté sous le ventre, où ils sont blancs. On le trouve dans toute l'*Europe*.

** 2. Le Liévre blanc.

Lepus caudatus, planè candidus... Lepus albus.

Lepus albissimus, toto nitens in corpore candor. *Klein. Quadr. p.* 51.
Lepus albus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p.* 349.
Lepus candidus. *Jonst. Quadr. p.* 111.

Æstate præcedenti simillimus est ; hieme verò in toto corpore candidus. Habitat in *Alpibus* & *Septentrionalibus* regionibus.

Il ressemble au précédent pendant l'été ; & l'hyver il est tout blanc. On le trouve dans les *Alpes*, & dans les Pays du *Nord*.

3. Le Liévre noir.

Lepus caudatus, planè niger... Lepus niger.

Lepus niger. *Klein. Quadr. p.* 52.
Lepus planè niger. *Mus. Worm. p.* 321.

A *Lepore vulgari* non differt, nisi quod totus sit niger, exceptis pedum extremitatibus, quæ ad cœruleum tendunt.

Il ne différe du *Liévre ordinaire* qu'en ce qu'il est tout noir, excepté l'extrémité des pieds, qui est bleuâtre.

Digitized by Google

** 4. Le Lapin de notre pays.

Lepus caudatus, obſcurè cinereus... Cuniculus noſtras.

Lepus caudâ abruptâ, pupillis rubris. Cuniculus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 19. ſp. 3.*
Faun. Suec. Linn. N°. 101.
Lepuſculus: Cuniculus, terram fodiens. *Klein. Quadr. p. 52.*
Cuniculus. *Raj. Syn. Quadr. p. 205.*
Geſn. Quadr. Fig. p. 394. (Fig. bona).
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 105. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 382. Fig. p. 385. (Fig. bona).
Jonſt. Quadr. p. 111. Fig. T. 65. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 23.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 240.
Lapin. *Kolbe. Tom. III. p. 62.*
Les Hébreux l'appellent Saphan. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, Thapsa. *Geſn.*
Les Grecs, Δασύπους.
Les Arabes, Vebar. *Geſn.*
Les Perſes, Besangerah. *Geſn.*
Les Eſpagnols, Conéio. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Conigliо. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, Kralik, *ou* Krolyk. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Künigle; Künele; Künlein. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, Krolik. *Rzac.*
Les Suédois, Kanin. *Linn.*
Les Flamands, Koniin. *Charlet.*
Les Anglois, Rabit, *ou* Cony. *Raj. Geſn. Aldro.*
Les François appellent le jeune Lapreau.

Il reſſemble au *Liévre* par la forme du corps; mais il eſt plus petit. Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, 1 ½ pied: le tour de ſon corps eſt d'environ 1 pied. Sa tête a, depuis les narines juſqu'à l'occiput, 3 ½ pouces; ſes oreilles autant; ſa queue, qui eſt noire en deſſus & blanche en deſſous, 2 ½ pouces. Il a, comme le *Liévre*, la lévre ſupérieure fendue; les

Formâ corporis externâ *Leporem vulgarem* refert; ſed illo minor eſt. Ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 1 ' pede longus eſt: ambitus corporis 1 circiter eſt pedis. Caput, à naribus ad occipitium, 3 ½ pollices longum; auriculæ totidem; cauda, quæ ſuprà nigra eſt infrà candida, 2 ' pollices longa. Labium ſuperius habet, ut in *Lepore*,

fissum; oculos magnos; crura posteriora anterioribus longiora; in pedibus anterioribus digitos 5, in posterioribus 4; plantas pedum villosas. Per universum corpus vestitur pilis mollibus & densis, ex cinereo fuscis, excepto ventre, in quo albicant. Habitat in totâ *Europâ*.

yeux grands; les jambes de derriere plus longues que celles de devant; 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere; le dessous du pied velu. Tout son corps est couvert de poils doux & épais, variés de brun & de gris, excepté sous le ventre, où ils sont blancs. On le trouve en toute l'*Europe*.

** 5. Le Riche.

Lepus caudatus, dilutè cinereus.

Colore à præcedente differt: pilis dilutè cinereis per universum corpus vestitur. Ex museo *Realmuriano*.

Il différe du précédent par sa couleur: tout son corps est couvert de poils d'un très joli petit-gris. Il est dans le Cabinet de M. *de Reaumur*.

** 6. Le Lapin d'Angora.

Lepus caudatus, pilis tenuissimis & longissimis toto corpore vestitus... Cuniculus Angorensis.

Pilis tenuissimis & longissimis ab aliis hujus generis speciebus distinguitur. Habitat in *Angora*. Ex museo *Realmuriano*.

Il différe des autres especes de son genre par la longueur & la finesse de ses poils. On le trouve à *Angora*, d'où il a été apporté à M. *de Reaumur*.

7. Le Liévre du Brésil.

Lepus ecaudatus... Lepus Brasilianus.

Lepus caudâ nullâ. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 19. sp. 1.*
Cuniculus Brasilienſis Tapeti dictus. *Raj. Syn. Quadr. p. 205.*
Tapeti Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. p. 223. Fig. p. 224.* (*Fig. bona; ſi caudam non haberet*).
Tapeti. *Piſon. Hist. Nat. Fig. p. 102.* [*Fig. eadem ut ſuprà*].
Cavia Cobaya, Cuniculi Brasilienſis ſpecies. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 63.* (*Fig. eadem*).

Il reſſemble à *notre Liévre* par la forme du corps : il eſt de la même couleur ; cependant un peu plus brun. Il a un peu de roux ſur le front ; & la gorge, la poitrine, & le ventre ſont blancs. Quelques uns ont un cercle blanc autour du col. Il n'a point de queue. On le trouve au *Bréſil*.

Quoad formam corporis externam *Lepori vulgari* ſimilis eſt : iiſdem ac ille pilis & colore, ſed paulò fuſciore. In fronte rufeſcit paululùm ; ſub gutture, pectore, & ventre albicat. Quidam circulum album habent circà collum. Caret caudâ. Habitat in *Braſiliâ*.

XXIII.

Le Genre du Lapin.

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de picquants ſur le corps :
La queue très courte, ou point de queue :
Les oreilles courtes, ou point d'oreilles.

XXIII.

Genus Cuniculi.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo :
Canini nulli :
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis diſtitutum :
Cauda breviſſima, vel nulla :
Auriculæ breves, vel nullæ.

1. LE LAPIN DE JAVA.

Cuniculus caudatus, auritus, rufeſcens, fuſco admixto... CUNICULUS JAVENSIS.

Cavia Javenſis. *Klein. Quadr. p.* 50.
Liévre de Java. *Cat. App. Fig. p.* 18. [*Fig. bonne*].

Il eſt de la groſſeur d'un *Liévre*. Il a la tête petite à proportion du corps ; les yeux grands & ſortants ; les oreilles ſemblables à celles d'un *Rat* ; toute la partie poſtérieure du corps groſſe & épaiſſe ; les jambes longues. Tout ſon corps eſt couvert d'un

Leporis magnitudinem attingit. Caput habet pro mole corporis parvum ; oculos magnos & prominentes ; auriculas auriculis *Murinis* ſimiles ; poſteriorem corporis partem craſſam ; crura longa. Per univerſum corpus

Digitized by Google

vestitur pilis rufescentibus, paululùm fusco admixto. In pedibus anterioribus 4 digitis, exteriore breviſſimo, in posterioribus verò tribus tantùm donatur. Habitat in *Javâ* & *Sumatrâ*.

poil roussâtre, mêlé d'un peu de brun. Il a aux pieds de devant 4 doigts, dont l'extérieur est fort court, & 3 à ceux de derriere. On le trouve à *Java* & à *Sumatra*.

** 2. L'AGOUTY.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo & fusco mixtis, rigidis vestitus.

Cuniculus omnium vulgatiſſimus, Aguti vulgò. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 153.
Mus ſylvestris Americanus Cuniculi magnitudine, Porcelli pilis & voce. *Raj. Syn. Quadr. p.* 226.
Cavia Aguti, vel Acuti Braſilienſibus. *Klein. Quadr. p.* 50.
Aguti, vel Acuti Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 224. [*Fig. bona*].
Aguti, vel Acuti, Cuniculi Braſilienſis ſpecies. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 63. [*Fig. bona*].
Acuti, ſive Agouti. *Jo. de Laet. p.* 551.
Aguti. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p.* 102. (*Fig. bona*).
Les Braſiliens l'appellent vulgairement COTIA. *Marcgr. Piſon.*
Les Habitans de la Guiane, AGOUTY. *Barr.*

Magnitudine & formâ *Cuniculum noſtratem* æmulatur; auriculas tamen habet breves & rotundas; os acutum; maxillam inferiorem ſuperiore breviorem; labium ſuperius fiſſum; oculos nigros; caudam breviſſimam, & ferè glabram; crura anteriora posterioribus paulò breviora. In pedibus anterioribus 4 habet digitos, in posterioribus 3 tantùm, acutis unguibus munitos. Per univerſum corpus vestitur pilis rigidis, ſplendentibus, ex rufo & fusco mixtis, cum pauxillo

Il est de la grandeur & de la forme de *notre Lapin*; mais il a les oreilles rondes & courtes; le museau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la supérieure; la lévre supérieure fendue; les yeux noirs; la queue extrémement courte, & presque sans poils; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derriere. Il a aux pieds de devant 4 doigts, & 3 à ceux de derriere, armés d'ongles aigus. Tout son corps est couvert de poils rudes au toucher, brillants, mêlés de roux & de brun avec un peu de noir

ſur le dos, & un peu plus jaunâtres ſous le ventre. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

nigro in dorſo; in ventre autem magis flaveſcentibus. Habitat in *Guianâ* & *Braſiliâ*.

3. Le Lapin d'Amerique.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis rufis rigidis veſtitus... Cuniculus Americanus.

Cuniculus Americanus. *Seb. Vol. I. p. 67. Fig. T. 41. F. 2. (Fig. bona).*
Cavia Surinamenſis. *Klein. Quadr. p. 50.*

Il eſt un peu plus petit que *notre Lapin*. Il a les oreilles courtes & rondes; la tête groſſe; le col long; & la queue très courte. Ses pieds ſont fendus en 4 doigts, armés d'ongles pointus & recourbés. Tout ſon corps eſt couvert de poils roux, rudes, & picquants comme des *ſoyes*, ſurtout ceux du dos. On le trouve en *Amerique*.

Noſtrate Cuniculo paulò minor eſt. Auriculas habet breves & rotundas; caput craſſum; collum longum; caudam breviſſimam. Pedes in 4 fiſſi ſunt digitos, acutis & incurvis unguibus munitos. Totum corpus tegitur pilis ruſis, rigidis, *ſetarum* inſtar, pungentibus, præcipuè per dorſum. Habitat in *Americâ*.

** 4. Le Pak.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis obſcurè fulvis, rigidis, lineis ex albo flaveſcentibus ad latera diſtinctis... Paca.

Cuniculus major paluſtris, faſciis albis notatus. *Barr. Hiſt Fr. eq. p. 152.*
Mus Braſilienſis magnus Porcelli pilis & voce, *Paca* dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 226.*
Cavia Paca Marcgravii. *Klein. Quadr. p. 50.*
Paca Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 224. (Fig. bona).*
Paca Cuniculi Braſilienſis ſpecies. *Jonſt. Quadr. p. 111. Fig. T. 63. [Fig. bona].*
Paca. *Piſon. Hiſt. nat. Fig. p. 101. (Fig. bona).*
Jo. de Laet. p. 551.
Les Habitans de la Guiane l'appellent Ourana, & Pak. *Barr.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium,

initium, 1 circiter pedis est; caput, à naribus ad occipitium, 4 pollices longum, crassum; maxilla inferior superiore brevior. Barbam habet prolixam *Leporinam*; auriculas breves & acutas; caudam brevissimam; crura anteriora posterioribus paulò breviora; in singulis pedibus digitos 5, quorum interior pedum anteriorum minimus est, & ab aliis 4 remotus: posteriorum pedum digiti 3 intermedii majores, exterior parvus, & à 3 intermediis parumper remotus, interior verò minimus, à 3 intermediis adhuc remotior. Totum corpus vestitur pilis brevibus, rigidis, supernè obscurè fulvis, tribus lineis longitudinalibus ex albo flavescentibus ad latera distinctis, infernè verò ex albo flavescentibus. Habitat in *Guianiâ* & *Brasilid.*

1 pied de long : sa tête est grosse, & a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 4 pouces : sa mâchoire inférieure est plus courte que la supérieure. Il a une grande barbe de *Liévre*; des oreilles pointues, & tres courtes, ainsi que sa queue; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derriere; 5 doigts à chaque pied, dont l'intérieur des pieds de devant est tres petit, & articulé plus haut que les 4 autres : les 3 doigts du milieu des pieds de derriere sont les plus grands, l'extérieur est petit, & articulé un peu plus haut que les 3 du milieu, l'intérieur est encore plus petit, & articulé plus haut que l'extérieur. Son corps est couvert de poils courts, rudes au toucher, d'un fauve foncé en dessus, avec de chaque côté 3 bandes étroites longitudinales d'un blanc jaunâtre, & en dessous de ce même blanc jaunâtre. On le trouve dans la *Guiane* & au *Brésil.*

5. Le Lapin de Norvege.

Cuniculus caudatus, auritus, ex flavo, rufo & nigro variegatus... Cuniculus Norvegicus.

Mus caudâ abruptâ, corpore fulvo nigroque vario. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 26.
Mus Lemingus, Norvagicus, Olai magni, Wormii Musei. *Klein. Quadr. p. 58.*
Mus Norvagicus, vulgò *Leming*, Wormii Musei. *Raj. Syn. Quadr. p. 227.*

Mus. Worm. p. 322. Fig p. 325. [Fig. optimâ].
Mus Norvegicus. *Charlet. Exer. p. 25.*
Leem. *Aldro. Quadr. Dig. Viv p. 436.*
Jonst. Quadr. p. 116.
Les Suédois l'appellent FJÄLLMUS; SABELMUS. *Linn.*
Les Lapons, LUMMICK. *Linn.*

Il reſſemble à un *Rat* par la forme du corps; mais il en différe en ce qu'il a la queue extrémement courte, & couverte de poils. Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 5 pouces de long. Son muſeau eſt pointu; ſes yeux ſont petits & noirs; ſes oreilles courtes, obtuſes, & un peu inclinées vers le dos. Il a autour du muſeau des poils longs & roides, qui lui font une eſpece de mouſtache. Ses jambes de devant ſont beaucoup plus courtes que celles de derriere: il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles aigus & recourbés, dont le milieu eſt plus long que les autres, qui ſont d'autant plus courts qu'ils en ſont plus éloignés. La couleur de ſon poil eſt variée de noir, de jaune & de roux: la partie antérieure de ſa tête eſt noire; le ſommet eſt jaune; le col & les épaules noires; le reſte du corps eſt roux, marqué de quelques taches noires de différentes figures; le ventre eſt d'un blanc jaunâtre: l'ordre, la figure, & la grandeur des taches varient dans les différents individus. Il a en tout 16 dents, ſça-

Formâ corporis *Rattum* repræſentat; ab eo tamen differt cauda breviſſimâ & pilosâ. Longitudo corporis, ab extremitate oris ad caudæ initium, eſt 5 circiter pollicum. Os habet acuminatum; oculos parvos, nigros; auriculas breves, & obtuſas, paululùm in dorſum reclinantes. Os cingunt pili multi longi & rigidi, myſtacis inſtar. Crura anteriora poſterioribus multò ſunt breviora: pedes ſinguli 5 prædíti ſunt digitis, acutis & incurvis unguibus munitis, quorum medius longiſſimus, reliquis utrinque ab hâc longitudine eò magis diſcedentibus, quò magis ſunt à medio remoti. Pilorum color ex nigro, flavo, & ruſo variegatur: capitis pars anterior nigricat; vertex flaveſcit; hinc collum & ſcapulæ nigræ; corpus reliquum rufeſcit, intermixtis quibuſdam maculis nigris variarum figurarum; venter eſt albicans ad flavedinem tendens: in variis autem individuis macularum ordo figura, & magnitudo variant. 16

dentibus donatur, 4 scilicet inciſoribus, 2 in utrâque maxillâ, & 12 molaribus, 6 etiam in utrâque maxillâ, 3 utrinque. Habitat in *Norvegiâ* & *Laponiâ*.

voir 4 inciſives, 2 à chaque mâchoire, & 12 molaires, 6 à chaque mâchoire, 3 de chaque côté. On le trouve en *Norvege*, & en *Laponie*.

6. Le Lapin d'Allemagne.

Cuniculus caudatus, auriculis nullis, cinereus... Cuniculus Germanicus.

Mus caudâ brevi, capite inauri. *Linn ſyſt. nat. ed. 6. g. 21. ſp. 3.*
Mus Noricus, vel Citellus. *Raj. Syn. Quadr. p. 220.*
Klein. Quadr. p. 56. Not. 48.
Geſn. Quadr. p. 835.
Geſn. Icon. Quadr. p. 113.
Mus Noricus Agricolæ. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 235.*
Rzac. auct. p. 317.
Mus Citellus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 436.*
Les Allemands l'appellent Zysel. *Geſn. Aldro.* Ziesel. *Rzac.*
Les Bohémiens, Sisel. *Rzac.*
Les Polonois, Susel. *Rzac.*

Corpus habet, ut *Muſtela vulgaris*, longum & tenue. Caret auriculis; ſed non caret foraminibus, quibus ſonum recipit. Caudâ breviſſimâ donatur. Color pilorum cinereus eſt. Habitat in *Bohemiâ*, *Auſtriâ*, *Hungariâ*, & *Poloniâ*.

Il a le corps long & effilé, comme la *Belette*. Il n'a point d'oreilles; mais il a, à leur place, des trous, par leſquels il entend. Sa queue eſt tres courte. La couleur de ſon poil eſt griſe. On le trouve en *Bohême*, en *Autriche*, en *Hongrie*, & en *Pologne*.

**7. Le Lapin des Indes.

Cuniculus ecaudatus, auritus, albus aut rufus, aut ex utroque variegatus... Cuniculus Indicus.

Cuniculus Indus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 106.* [*Fig. ſat bona, ſi tantum numerum digitorum non haberet*].
Cuniculus Indicus. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 63.* [*Fig. ſat bona*].
Euſ. Nieremb. Fig. p. 160. (*Fig. Geſneri*).

Digitized by Google

Porcellus Indicus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p.* 391. [*Fig. Gesneri*]. *Jonst. Quadr. p.* 112. *Fig. T.* 64. (*Fig. bona*). *Rzac. aucl. p.* 333.

Porcellus Indicus, sivè Guineensis. *Charlet. Exer. p.* 24.

Mus cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis. *Linn. Syst. nat. ed.* 6. *g.* 21. *sp.* 1.

Mus, seu Cuniculus Americanus & Guineensis, Porcelli pilis & voce, *Cavia Cobaya* Brasilienſibus dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 223.

Cavia Cobaya Brasilienſibus : quibuſdam Mus Pharaonis ; Tatu pilosus, Porcellus, Mus Indicus. *Klein. Quadr. p.* 49.

Cavia Cobaya Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. Fig. p.* 224. (*Fig sat bona*).

Cavia Cobaya. *Pison. Hist. Nat. Fig. p.* 102. (*Fig. sat bona*).

Les François l'appellent Cochon d'Inde.

Les Allemands, Indianisch-Künele, *ou* Indisch-Seüle. *Gesn.* Meer-Ferckel ; Meer-Schwein. *Rzac.*

Les Polonois, Swinka Zamorska. *Rzac.*

Les Suédois, Marswin. *Linn.*

Les Anglois, Guiny Pig. *Raj.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, 9 ½ pouces ; depuis les narines juſqu'à l'occiput, 2 pouces 4 lignes : le tour de ſon corps eſt de 8 pouces. Il a la lévre ſupérieure fendue, comme le *Liévre* ; l'ouverture de la bouche petite ; les oreilles courtes, rondes, ouvertes, tranſparantes, & preſque dénuées de poils ; les jambes courtes : il ne lui paroît point de queue. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 3 à ceux de derriere. Ses poils ſont doux au toucher : leur couleur eſt différente dans différents individus : les uns ſont tout à fait blancs ; d'autres tout à fait roux ; d'autres variés de blanc & de roux ; quelques-uns ont des taches noires. On le trouve en *Europe* dans les maiſons, en *Guinée*, & au *Bréſil*.

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad anum uſque, 9 ½ pollicum ; ambitus 8 pollicum ; caput, à naribus ad occipitium, 2 pollices cum 4 lineis longum. Labium ſuperius, ut in *Lepore*, fiſſum eſt ; oris rictus parvus ; auriculæ breves, ſubrotundæ, patulæ, pellucidæ, & glabræ ferè ; crura brevia ; caudæ veſtigium nullum. Pedes anteriores in 4, poſteriores verò in 3 digitos diviſi. Pili ad tactum molles : color in individuis variis varius : alia omninò alba ſunt ; alia omninò rufa ; alia ex albo & rufo variegata ; quædam ex nigro maculata. Habitat in *Europâ* domeſticus, in *Guineâ*, & *Braſiliâ*.

Digitized by Google

8. Le Lapin du Brésil.

Cuniculus ecaudatus, auritus, ex cinereo rufus... Cuniculus Brasiliensis.

Cuniculus Brasiliensis, *Aperea* dictus, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 206.
Cuniculus Indicus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. Fig. p.* 393. (*Fig. bona*).
Cavia Aperea. *Klein. Quadr. p.* 50.
Aperea, Cuniculi species. *Jonst. Quadr. Fig. T.* 63. [*Fig. bona*].
Aperea Brasilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 223. (*Fig. bona*).
Aperea. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 103. (*Fig. bona*).
Les Flamands l'appellent Veldratte, *ou* Boschratte. *Marcgr.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad anum uſque, 1 eſt circiter pedis: diameter 7 digitorum. Barbam habet *Leporinam*; labium ſuperius fiſſum; auriculas breves & ſubrotundas. Caret caudâ. Crura anteriora 3 circiter digitos longa ſunt; poſteriora paulò longiora. 4 habet in pedibus anticis digitos unguibus parvis munitos, in poſterioribus 3, quorum medius reliquis longior. Color totius corporis, excepto ventre, in quo albicat, *Leporinus*. Habitat in *Braſiliâ*.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, environ 1 pied: le diametre de ſon corps eſt de 7 doigts. Il a, comme le *Liévre*, une mouſtache, & la lévre ſupérieure fendue. Ses oreilles ſont courtes & rondes. Il n'a point de queue. Ses jambes de devant ont environ 3 doigts de long, & celles de derriere un peu plus. Il a 4 doigts aux pieds de devant, armés de petits ongles, & 3 à ceux de derriere, dont le milieu eſt le plus long. La couleur de ſes poils, exceptez ceux du ventre, qui ſont blancs, eſt la même que celle de nos *Liévres ordinaires*. On le trouve au *Bréſil*.

XXIV.

Genus Sciuri.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo:

XXIV.

Le Genre de l'Ecureuil.

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives à chaque mâchoire:

Digitized by Google

Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de picquants sur le corps :
La queue longue, & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroit platte.

Canini nulli :
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis destitutum :
Cauda longa, vestita pilis ità disposítis ut caudam planam efficiant.

** 1. L'Ecureuil.

Sciurus rufus, quandoque griseo admixto... Sciurus Vulgaris.

Sciurus palmis solis saliens. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 18. sp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 21.
Sciurus vulgaris. *Raj. Syn. Quadr. p. 214.*
Sciurus vulgaris rubicundus. *Klein. Quadr. p. 53.*
Sciurus. *Gesn. Quadr. p. 955. Fig. p. 956. (Fig. bona).*
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 110. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 396. Fig. p. 398. [Fig. sat bona].
Jonst. Quadr. p. 113. Fig. T. 66. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 24.
Raç. Hist. Nat. Pol. p. 224.
Raç. auct. p. 320.
Pirolus, Spiriosus, Scutulus quorumdam. *Klein.*
Les Grecs l'appellent Σκιουρος.
Les Espagnols, Harda, *ou* Esquilo. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens Schirivolo. *Gesn.* Schirato, *ou* Schiratolo. *Aldro.*
Les Allemands, Eychorn, *ou* Eychhorn, *ou* Eichhermlin. *Gesn. Aldro. Raç.*
Les Illyriens, Wewerka. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, Wyewyorka. *Gesn. Aldro. Raç.*
Les Suedois, Ikorn. *Linn.*
Les Anglois, Squyrrell. *Gesn. Aldro.*

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, 7 ½ pouces : sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 2 pouces ; sa queue de 8 pouces. Ses oreilles sont courtes & couvertes de poils très longs. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous armés

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudam usque, 7 ½ pollicum ; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum ; caudæ 8 pollicum. Auriculæ breves sunt & pilis longissimis ornatæ. 4 sunt in pedibus anterioribus digiti, in posterioribus verò 5, om-

Digitized by Google

nes longis, incurvis, & acutis unguibus muniti: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevissimus & obtusus. Universum corpus, exceptis gutture & ventre albicantibus, vestitur pilis omninò rufis, vel cum pauco griseo admixto. Caudam habet pilis longissimis ornatam, quâ suprà dorsum reflexâ, se tegit & inumbrat. Habitat in *Europâ*.

d'ongles longs, recourbés, & aigus : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle très court & obtus. Tout son corps est couvert de poils roux, ou d'un roux mêlé de gris, exceptez la gorge & le ventre, qui sont blancs. Sa queue est ornée de poils très longs ; & lorsqu'il la releve par dessus son dos, elle lui couvre tout le corps. On le trouve en *Europe*.

** 2. L'Ecureuil blanc de Siberie.

Sciurus albus, Sibericus.

Sciurum vulgarem magnitudine circiter æquat : ab eo autem differt colore, qui per universum corpus albus est. Habitat in *Siberia*. Ex museo *Realmuriano*.

Il est à peu près de la grandeur de l'*Ecureuil ordinaire* : il en différe en ce qu'il est tout blanc. On le trouve en *Siberie*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

3. L'Ecureuil noir.

Sciurus niger.

Sciurus niger. *Klein. Quadr. p.* 53.
Quauhtechallotl. *Fern. Hist. N. Hisp. p.* 8.
Quauhtechallotl Thlilticc. Sciurus Mexicanus. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p.* 582. (*Fig. sat bona*).
Quauhtechallotl Thlilticc, sivè Tlilocotequiflin dictus. *Jonst. Quadr. p.* 113.
Ecureuil noir. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 73. [*Fig. très bonne*].

Præcedentes magnitudine superat : ab eis etiam colore differt : multi sunt omninò nigri ; alii vel naso, vel pedibus, vel caudæ apice, vel

Il est plus grand que les précédents : il en différe encore par sa couleur : plusieurs sont tout noirs ; quelques uns ont le nez blanc ; d'autres les pieds ; d'au-

Digitized by Google

tres le bout de la queue ; d'autres ont un collier blanc. On le trouve au *Mexique*.

denique torque albis donant tur. Habitat in *Mexico*.

4. L'Ecureuil varié.

Sciurus ex candido cinereus... Sciurus varius.

Sciurus varius, *Varus* vulgò dictus. *Aldro. Quadr. Dig. Viv. p.* 403. *Fig. p.* 405. (*Fig. sat bona*).
Sciurus Scythicus. *Gesn. Icon. Quadr. p.* 111.
Sciurus, sive Mus Ponticus. *Charlet. Exer. p.* 24.
Mus Ponticus, seu Venetus, vulgò *Varius*. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 839. (*Fig. bona*).
Rzac. Auct. p. 318.
Mus Ponticus, *Varius* dictus. *Jonst. Quadr. p.* 113.
Mus Lassicus Mathioli. *Aldro. Jonst.*
Les Italiens l'appellent Vare. *Gesn.*
Les Allemands, Fech, *ou* Vech. *Gesn. Aldro.* Grau-Werck. *Rzac.*
Les Polonois, Popieliza. *Aldro. Jonst. Rzac.*

Il ressemble à l'*Ecureuil ordinaire* par sa grandeur & sa figure ; mais il en différe par sa couleur, qui est variée de blanc & de gris, & par les poils de sa queue, qui ne sont pas si longs. On le trouve en *Europe*.

Magnitudine & figurâ *Sciurum vulgarem* æmulatur; ab eo autem differt colore, qui in candido cinereus est, & caudâ non adeo amplâ. Habitat in *Europâ*.

**5. L'Ecureuil d'Amerique.

Sciurus obscurè cinereus... Sciurus Americanus.

Sciurus caudâ teretiusculâ, auribus subrotundis, nudis. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g.* 18. *sp.* 3.
Sciurus Americanus. *Klein. Quadr. p.* 54.
Seb. Vol. I. p. 78. *Fig. T.* 48. *F.* 5. (*Fig. optima*).

Il est un peu plus petit que l'*Ecureuil ordinaire* : il en différe encore par sa couleur, qui est un gris obscur dans la partie supérieure du corps, & un gris blanc dans la partie inférieure ; & par

Sciuro vulgari magnitudine cedit : ab eo etiam differt colore, qui obscurè cinereus est in parte corporis superiore, in inferiore verò ex-cinereo albus ; & pilis caudæ brevioribus,

Digitized by Google

brevioribus, & ad rufum accedentibus. Habitat in *Americâ.*

les poils de sa queue, qui sont plus courts, & un peu roussâtres. On le trouve en *Amerique.*

** 6. L'Ecureuil de Virginie.

Sciurus cinereus, auriculis ex albo flavicantibus... Sciurus Virginianus.

Sciurus Virginianus cinereus major. *Raj. Syn. Quadr. p.* 215.
Klein. Quadr. p. 53.
Grand Ecureuil gris. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 74. [*Fig. bonne*].
Les Anglois l'appellent Great Grey Virginia Squirrel. *Raj.*

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 11 circiter pollicum. Corpus habet & membra corpore & membris *Sciuri vulgaris* crassiora; caput & auriculas breviores; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus verò 5; auriculas intùs nudas, extùs verò pilis ex albo flavicantibus vestitas. Partes corporis superior & crurum exterior sunt cinereæ; corporis verò inferior & crurum interior ex cinereo candidæ: diversi illi colores separantur tæniis longitudinalibus rufis, in lateribus utrinque sitis. Cauda, quæ vestitur pilis longissimis cinereis, versùs extremum ex nigro & albo variis, in dorsum reflexa, totum corpus cooperit. Habitat in *Virginiâ* & *Carolinâ.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, est d'environ 11 pouces. Il a le corps & les membres plus épais que nos *Ecureuils ordinaires*; la tête & les oreilles plus courtes; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. Ses oreilles sont nuës intérieurement, & extérieurement couvertes de poils d'un blanc jaunâtre. La partie supérieure de son corps, & l'extérieur de ses jambes sont d'un joli gris; la partie inférieure du corps, & l'intérieur des jambes d'un gris blanc: une bande rousse s'étend de chaque côté selon leur longueur, & sépare ces deux couleurs. Sa queue est revetue de très longs poils gris, variés de noir & de blanc vers leur extrémité; & lorsqu'elle est relevée vers le dos, elle couvre tout le corps. On le trouve à la *Virginie* & à la *Caroline.*

V.

Digitized by Google

7. L'Ecureuil du Brésil.

Sciurus coloris ex flavo & fusco mixti, tæniis in lateribus albis... Sciurus Brasiliensis.

Sciurus Brasiliensis. *Marcgr. Hist. Br. p.* 230.

Il est de la grandeur & de la figure de l'*Ecureuil ordinaire*. Sa queue est aussi longue que son corps, & lorsqu'elle est relevée vers le dos, elle peut le couvrir entiérement. Il a la prunelle de l'œil bleuâtre; les oreilles courtes & rondes; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous armés d'ongles longs & aigus, dont ceux du milieu sont plus longs que les autres: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un petit ongle noir. La couleur de tout son corps, exceptez la gorge & le ventre, qui sont blancs, est mêlée de jaune pâle, & de brun: il a outre cela de chaque côté une bande étroite longitudinale blanche. Sa queue est revêtue de longs poils variés de noir & de blanc. On le trouve au *Brésil*.

Longitudine & figurâ *Sciurum vulgarem* æmulatur. Caudam habet ejusdem cum corpore longitudinis, quâ in dorsum reflexâ, corpus cooperiri potest; oculorum pupillam cœrulescentem; auriculas breves & obrotundas; 4 in anterioribus pedibus digitos, in posterioribus 5, omnes longis & acutis unguibus munitos, quorum medii reliquis longiores: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est parvulus & niger. Color totius corporis, exceptis gutture & ventre albis, est expallidè flavo, & fusco mixtus: in utroque latere tæniam habet longitudinalem albam. Cauda pilis longis vestitur ex nigro & albo mixtis. Habitat in *Brasiliâ*.

8. L'Ecureuil de la Nouvelle Espagne.

Sciurus obscurè cinereus, tæniis in dorso albicantibus... Sciurus Novæ Hispaniæ.

Sciurus rarissimus, ex Novâ Hispaniâ, tæniis albis. *Klein. Quadr. p.* 53. *Seb. Vol. I. p.* 76. *Fig. T.* 47. *Mus F.* 2. *Fœm. F.* 3. (*Fig. bonis*).

Digitized by Google

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 5 ½ circiter pollicum: cauda longitudine corpus antecellit. Auricularum ambitus pilis deſtituitur. Color totius corporis, exceptis ore & inferiore corporis parte cinereis, eſt obſcurè *Murinus*. Dorſum albicantes 7 in mare, 5 tantùm in fœminâ percurrunt tæniæ longitudinales, indè & per caudam quoque, quæ longis diffuſiſque pilis tegitur, extenſæ: harum albedinem nigricantes pili intermixti variegant. Habitat in *Novâ Hiſpaniâ*.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à la queue, environ 5 ½ pouces: ſa queue eſt plus longue que tout ſon corps. Le contour de ſes oreilles eſt denué de poils. Sa couleur, exceptez ſon muſeau & la partie inférieure de ſon corps, qui ſont d'une couleur cendrée, eſt un gris de *Souris* foncé. Le mâle a ſur le dos 7, & la femelle ſeulement 5 bandes longitudinales blanchâtres, entremêlées de poils preſque noirs: ces bandes s'étendent auſſi ſur la queue, qui eſt garnie de grands poils clair ſemés. On le trouve dans la *Nouvelle Eſpagne*.

9. L'Ecureuil de la Caroline.

Sciurus rufus, tæniis in dorſo nigris, tæniis ex albo flavicantibus intermixtis... Sciurus Carolinensis.

Sciurus ſtriatus. *Klein. Quadr. p.* 53.
Sciurus Lyſteri. *Raj. Syn. Quadr. p.* 216.
Ecureuil de Terre. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 75. (*Fig. bonne*).

Dimidio minor eſt *Sciuro vulgari*. Oculos habet magnos & nigros; auriculas obrotundas: cauda pilis, quàm in aliis ſpeciebus multò brevioribus, & rufis veſtitur: corpus ejuſdem coloris eſt. In medio dorſo tænia longitudinalis extenditur nigra, & inſuper in utroque latere duæ tæniæ etiam nigræ, tertiâ tæniâ ex albo flavicante in

Il eſt plus petit de moitié que l'*Ecureuil ordinaire*. Il a les yeux grands & noirs; les oreilles arrondies; les poils de la queue beaucoup plus courts que dans les autres eſpeces, & roux, ainſi que ceux du corps: il a en outre une bande longitudinale noire placée ſur le milieu du dos; & de chaque côté deux autres de même couleur, entre leſquelles eſt une troiſiéme bande d'un

Digitized by Google

blanc jaunâtre. On le trouve dans les bois de la *Caroline*, & de la *Virginie*.

illis inclusâ. Habitat in *Carolinæ* & *Virginiæ* sylvis.

** 10. L'ECUREUIL PALMISTE, *vulgairement*, RAT PALMISTE.

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in dorso flavicantibus... SCIURUS PALMARUM; MUS PALMARUM *vulgò*.

Mustela Africana. *Raj. Syn. Quadr. p.* 216.
Clus. Exot. Fig. p. 112. [*Fig. sat bona*].
Jonst. Quadr. p. 105.
Eus. Nieremb. Fig. p. 172. (*Fig. sat bona*).
An Mus Indicus arboreus striatus? *Raj. Syn. Quadr. p.* 230.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 5 pouces : sa tête a, depuis les narines jusqu'à l'occiput, 1 pouce 5 lignes de long; & sa queue environ 6 pouces, & se termine en pointe. Ses oreilles sont courtes & arrondies. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. Tous les poils de son corps sont variés de roux & de noir; ceux de sa queue de noir & de jaunâtre en dessus, & en dessous ils sont d'un jaune roux, ayant de chaque côté 2 bandes étroites longitudinales noires, & terminées par une bande longitudinale blanchâtre : il a aussi sur le dos 3 bandes jaunâtres, qui s'étendent dans toute sa longueur, sçavoir une de chaque côté, & l'autre au milieu. On le trouve en *Asie*, en *Afrique*, & en *Amerique*.

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 5 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pollicis & 5 linearum; caudæ, quæ in acumen desinit, 6 circiter pollicum. Auriculas habet breves & subrotundas; 4 in pedibus anticis digitos, 5 verò in posticis. Pili corporis ex rufo & nigro variegantur : pili caudæ suprà ex nigro & flavicante, infrà verò sunt ex flavo rufi, cum duobus tæniis longitudinalibus in utroque latere nigris, extrà tæniâ etiam longitudinali albicante utrinque terminati : 3 sunt insuper in dorso secundùm ipsius longitudinem tæniæ flavicantes, in utroque scilicet latere una, altera in medio dorso. Habitat in *Asiâ*, *Africâ*, & *Americâ*.

Digitized by Google

11. L'ECUREUIL DE BARBARIE.

Sciurus coloris ex rufo & nigro mixti, tæniis in lateribus alternatim albis, & fuscis aut nigris... SCIURUS GETULUS.

Sciurus Getulus Cati apud Gesnerum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 216.
Klein. Quadr. p. 54.
Sciurus Getulus. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p.* 112. (*Fig. bona*).
Aldrov. Quadr. Dig. Viv. p. 405. *Fig. p.* 406. (*Fig. bona*).
Jonst. Quadr. p. 113. *Fig. T.* 67. *Fig. bona*).
Sciurus, sive Mus Getulus. *Charlet. Exer. p.* 24.

Sciuri vulgaris magnitudinem non attingit; nec auriculas exstantes habet, ut ille, sed depressas magis, breviores & orbiculares. Pilorum color, excepto in ventre, in quo ex cinereo albus, ex rufo & nigro mixtus est. Eum, ab armis ad caudam, per latera albæ fuscæque tæniæ in aliquibus, & albæ & nigræ in aliis alternatim decentissimè pingunt, respondentibus etiam in caudâ tæniis, nisi siquando expansâ caudâ, propter pilorum raritatem eædem disparent. Habitat in *Barbariâ*.

Il est un peu plus petit que l'*Ecureuil ordinaire*: il n'a pas les oreilles si relevées, mais plus basses, plus courtes, & arrondies. La couleur de ses poils, excepté ceux du ventre, qui sont gris-blancs, est mêlée de roux & de noir. Il a sur les côtés, depuis les épaules jusqu'à la queue, des bandes alternativement blanches & brunes dans quelques uns, & alternativement blanches & noires dans d'autres: ces bandes s'étendent aussi sur la queue; mais lorsqu'elle est étendue, elles disparoissent, parce que les poils sont trop clair-semés. On le trouve en *Barbarie*.

** 12. L'ECUREUIL VOLANT.

Sciurus obscurè cinereus aut rufescens, cute ab anticis cruribus ad postica membranæ in modum extensâ, volans... SCIURUS VOLANS.

Sciurus hypocondriis prolixis volitans. *Linn. Syst. nat. ed.* 6. *g.* 18. *sp.* 2.
Faun. Suec. Linn. No. 22.

Digitized by Google

Sciurus Americanus volans. *Raj. Syn. Quadr. p.* 215.
Sciurus petauriſta volans. *Klein. Quadr. p.* 54.
Sciurus volans. *Seb. Vol. I. p.* 67. *Fig. T.* 41. *F.* 3. (*Fig. optima*).
Mus Ponticus aut Scythicus, Sciurus-ve alius, quem volantem cognominant. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 111. (*Fig. ſat bona*).
Mus Ponticus, Scythicus, volans. *Rzac. auct. p.* 315.
Quimichpatlan, ſeu Mus volans. *Jonſt. Quadr. p.* 114.
Aſſapanick à Barbaris dictus. *Jo. de Laet. p.* 82.
Ecureuil volant. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 76. & 77. (*Fig. très bonnes*).
Ecureuil volant, connu ſous le nom de *Rat de Pont* ou de *Tartarie* de Geſner. *Tranſ. Phil. an.* 1733. *p.* 35. *Fig. Pl.* 1. (*Fig. très bonne*).
Les Polonois l'appellent Wiewiorka Latalaca. *Rzac.*
Les Moſcovites, Letaga. *Rzac.*
Les Ruſſes, Polatucha. *Rzac.*
Les Suédois, Flygande Ikorn. *Linn.*
Les Anglois, Flying Squirrel. *Raj.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 5 pouces; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 15 lignes; celle de ſes oreilles de 5 lignes; & celle de ſa queue de 5 pouces 3 lignes. Il a les oreilles rondes; les yeux grands & noirs; une mouſtache compoſée de poils noirs longs d'un pouce & demi; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous garnis d'ongles pointus & recourbés. La peau des côtés, qui eſt attachée aux jambes de devant & à celles de derriere ſelon leur longueur, peut être étendue comme une membrane: c'eſt par ſon moyen qu'il peut parcourir en l'air un grand eſpace; car il vole la longueur de 40 toiſes: il ne peut en volant ni s'élever, ni garder la ligne horizontale; mais il deſ-

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, eſt circiter 5 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 linearum; auricularum 5 linearum; caudæ 5 pollicum cum 3 lineis. Auriculas habet rotundas; ingentes & nigros oculos; myſtacem pilis nigris 1 ½ pollicem longis conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus verò 5, omnes acutis & incurvis unguibus munitos. Laterum cutis, quæ cruribus anterioribus & poſterioribus ſecundùm ipſorum longitudinem connectitur, inſtar membranæ extendi poteſt: ope illius loca maximè à ſe diſtantia facilè ſaltu attingit; 40 enim ſexpedarum longitudinem volatu, vel potiùs ſaltu percurrit. Volando aut ſurſùm tendere, aut horizon-

Digitized by Google

taliter aerem percurrere nequit, sed deorsùm obliquè tendit. Pili densissimi sunt & mollissimi, suprà corpus aut obscurè cinerei aut rufescentes, infrà verò albicantes: pili caudæ ejusdem ferè coloris ac corporis pars superior. Habitat in *Poloniâ*, *Laponiâ*, *Finlandiâ*, *Novâ Hispaniâ*, *Virginiâ*, & *Canadâ*.

cend obliquement. Ses poils, qui sont tres épais & tres doux au toucher, sont d'un gris obscur ou roussâtres en dessus du corps, & blanchâtres en dessous: ceux de sa queue sont à peu près de la même couleur que le dessus du corps. On le trouve en *Pologne*, en *Laponie*, en *Finlande*, dans la *Nouvelle Espagne*, en *Virginie*, & en *Canada*.

** 13. L'ECUREUIL VOLANT DE SIBERIE.

Sciurus dilutè cinereus, cute ab anticis cruribus ad postica membranæ in modum extensâ, volans... SCIURUS SIBERICUS VOLANS.

A præcedente differt magnitudine quâ eum antecellit, cauda breviori, & colore per universum corpus dilutè cinereo. Habitat in *Siberiâ*. Ex Museo *Realmuriano*.

Il différe du précédent en ce qu'il est un peu plus grand, qu'il a la queue plus courte, & par sa couleur, qui est partout le corps d'un joli petit gris. On le trouve en *Siberie*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

14. L'ECUREUIL VOLANT DE VIRGINIE.

Sciurus, cute à capite ad anum membranæ in modum lateraliter extensâ, volans... SCIURUS VIRGINIANUS VOLANS.

Sciurus cute à capite ad caudam relaxatâ volans. *Linn. syst. nat. ed.* 4. *g.* 20. *sp.* 4.
Sciurus Virginianus petauristà. *Klein. Quadr. p.* 55.
Sciurus Virginianus volans. *Seb. Vol. I. p.* 72. *Fig. T.* 44. *F.* 3. (*Fig. optima*).

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, est circiter 5 ½ polli-

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'envi-

Digitized by Google

ron 5 $\frac{1}{2}$ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, d'environ 15 lignes; celle de ses oreilles de 8 lignes; & celle de sa queue de 4 $\frac{1}{2}$ pouces. Il a à chaque pied 5 doigts, armés de petits ongles pointus & crochus; le pouce est séparé des autres doigts. Il peut voler à l'aide de la peau des côtés, qui peut s'étendre comme une membrane: elle commence à avoir cette faculté sous la gorge, de là au sommet de la tête, ensuite aux jambes de devant, & à celles de derriere, & de là à l'anus auprès de l'origine de la queue. La partie supérieure de son corps est rousse, & l'inférieure est d'un cendré qui tire sur le jaune. On le trouve en *Virginie*.

cum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 circiter linearum; auricularum 8 linearum; caudæ 4 $\frac{1}{2}$ pollicum. Pedes singuli in 5 digitos, acutis & incurvis unguiculis munitos, fissi sunt, pollice ab aliis digitis remoto. Ope cutis laterum, quæ à gutture ad cervicem protenditur, indè ad anteriora crura, deindè etiam ad posteriora, & tandem ad anum usque propè caudæ exortum, quæque membranæ instar extendi potest, aerem percurrit. In parte corporis superiore rufescit; in inferiore verò ex cinereo flavescit. Habitat in *Virginiâ*.

XXV.

Le Genre du Loir.

Son caractere est
D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire:
Point de dents canines:
Les doigts onguiculés:
Point de picquants sur le corps:
La queue longue, & couverte de poils rangés de façon qu'elle paroît ronde.

XXV.

Genus Gliris.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ duo:
Canini nulli:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis destitutum:
Cauda longa, vestita pilis ità dispositis ut caudam rotundam efficiant.

1. LE LOIR.

Glis suprà obscurè cinereus, infrà ex albo cinerascens... GLIS. Glis Gesneri & aliorum. *Raj. Syn. Quadr. p.* 229. Glis. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 619. (*Fig. mala*).

Gesn.

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 109. (*Fig. mala*).
Charlet. Exer. p. 25.
Sciurus Epilepticus. *Klein. Quadr. p.* 54.
Loir. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 40. *Fig. Pl.* 7. (*Fig. assez bonne*).
Les Hébreux l'appellent AKBAR. *Gesn.*
Les Chaldéens, AKBERA. *Gesn.*
Les Arabes, PIR, *ou* PHIR. *Gesn.*
Les Espagnols, LIRON. *Gesn.*
Les Italiens, GALERO; GLIERO; *ou* GHIRO. *Gesn.*
Les Suisses, RELL, *ou* RELLMUSS, *ou* GROSSE HASSELMUSS. *Gesn. Raj.*
Les Allemands, GREUL. *Gesn.*
Les Polonois, SCZUZEK. *Gesn.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, $4\frac{1}{2}$ pollicum; caudæ $3\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet magnos; auriculas longas; pedes pedibus *Ratti* ſimiles. Pili in parte corporis ſuperiore ſunt obſcurè cinerei, in inferiore verò ex albo cineraſcentes. Habitat in ſylvis.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, $4\frac{1}{2}$ pouces: ſa queue eſt longue de $3\frac{1}{2}$ pouces. Ses yeux ſont grands; ſes oreilles longues; ſes pieds ſemblables à ceux du *Rat*. La couleur de ſon poil eſt un gris obſcur dans la partie ſupérieure de ſon corps, & un blanc gris dans la partie inférieure. On le trouve dans les forêts.

** 2. LE LÉROT.

Glis ſuprà obſcurè cinereus, infrà ex albo cineraſcens, maculâ ad oculos nigrâ.

Mus Avellanarum major. *Raj. Syn. Quadr. p* 219.
Klein. Quadr. p. 56. *Not.* 48.
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 439.
Jonſt. Quadr. p. 116.
Mus Avellanarum. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 833. (*Fig. bona*).
Rzac. Auct. p. 315.
Mus Avellanarius. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 66. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 25.
Sorex Plinii. *Gesn. Quadr. p.* 834.
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 115. (*Fig. bona*).
Les Eſpagnols l'appellent SORGE, *ou* RATON PEQUENNO. *Gesn.*
Les Allemands, HASERMUSS. *Gesn.* HASELMAUS. *Rzac.*
Les Polonois, MYSZORZECHOWA; KOSZALKA. *Rzac.*

Digitized by Google

Les Flamands, SLAEP RATTE. *Gesn.*
Les Anglois, GREATER DORMOUSE, *ou* SLEEPER. *Raj.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 5 ½ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 15 lignes; celle de ses oreilles de 6 lignes; celle de sa queue de 4 pouces. Il a les yeux grands & noirs; les oreilles arrondies, transparentes, & couvertes de poils extrémement courts; une moustache composée de poils partie noirs & partie blancs; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. La couleur de son poil est un gris obscur dans la partie supérieure du corps, & un blanc gris dans la partie inférieure: autour des yeux est une tache noire, & une autre au-dessous des oreilles. Sa queue, depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, est couverte en dessus de poils variés de roux & de noir, & en dessous d'un roux blanchâtre: dans le reste de sa longueur elle est noire en dessus, & blanche en dessous. On le trouve dans les bois, & dans les endroits où il y a des fruits.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 5 ½ pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 linearum; auricularum 6 linearum; caudæ 4 pollicum. Oculos habet ingentes & nigros; auriculas subrotundas, pellucidas, & pilis brevissimis obsitas; mystacem partim nigris partim albis pilis conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5. Pili in parte corporis superiore sunt obscurè cinerei, in inferiore ex albo cinerascentes: macula est circà oculos nigra, altera macula ejusdem coloris infrà auriculas. Cauda, ab exortu ad mediam longitudinem usque, obsita est in parte superiore pilis ex rufo & nigro variis, in inferiore pilis ex rufo albicantibus, alterâ medietate supernè nigrâ, infernè albâ. Habitat in sylvis, & in locis in quibus fructus crescunt.

** 3. LE CROQUE-NOIX.

Glis suprà rufus, infrà albicans.

Mus caudâ longâ pilosâ, corpore rufo, gulâ albicante. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 9.*

Faun. Suec. Linn. N°. 32.
Mus Avellanarum minor. *Raj. Syn. Quadr. p.* 220.
Aldro. Quadr. Dig. Viv. p. 439. *Fig. p.* 440. (*Fig. bona*).
Jonst. Quadr. p. 116.
Les Italiens l'appellent MOSCARDINO. *Aldro.*
Les Suédois, SKOGSMUS. *Linn.*
Les Anglois, DORMOUSE, *ou* SLEEPER. *Raj.*

Soricem magnitudine æmulatur. Caudam habet corpore paulò longiorem; auriculas breves & rotundas; ingentes & nigros oculos; mystacem pilis nigris & raris conflatum; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5, omnes acutis & incurvis unguibus munitos, excepto pollice pedum posteriorum, qui caret ungue, & ab aliis digitis est remotus. Pili in parte corporis superiore sunt rufi, in inferiore verò albicantes, paululùm flavicante admixto. Habitat in *Europæ* sylvis.

Il est de la grandeur d'une *Souris*. Il a la queue un peu plus longue que le corps; les oreilles courtes & rondes; les yeux grands & noirs; une moustache composée de poils noirs, & clair-semés; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, armés d'ongles crochus & pointus: le pouce des pieds de derriere est séparé des autres doigts, & n'a point d'ongle. La couleur de son poil est rousse dans la partie supérieure du corps, & blanche, mêlée d'un peu de jaunâtre, dans la partie inférieure. On le trouve en *Europe* dans les bois.

4. LA MARMOTTE DE BAHAMA.

Glis fuscus... MARMOTA BAHAMENSIS.

Cavia Bahamensis. *Klein. Quadr. p.* 50.
Lapin de Bahama. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 79. (*Fig. bonne*).

Nostrate Cuniculo paulò minor est. Auriculas habet & pedes auriculis & pedibus *Murinis* similes. Color pilorum fuscus. Habitat in *Bahamâ*.

Elle est un peu plus petite que *notre Lapin*. Elle a les oreilles & les pieds semblables à ceux du *Rat*. La couleur de ses poils est brune. On la trouve à *Bahamâ*.

Digitized by Google

5. La Marmotte d'Amérique.

Glis fuſcus, roſtro è cinereo cœruleſcente... Marmota Americana.

Glis Marmota, Americanus. *Klein. Quadr. p. 56.*
Monax, ou Marmotte d'Amérique. *Edwards. Tom. II. Fig. p. 104 (Fig. tres bonne).*
Marmotte Amériquaine. *Cat. app. p. 28.*

Elle eſt environ de la groſſeur de *notre Lapin*. Elle a les yeux noirs & à fleur de tête; les oreilles courtes & rondes; une mouſtache compoſée de poils roides comme des *ſoyes*, & en outre de pareils poils de chaque côté de la tête, un peu au-delà des coins de la bouche; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, tous très longs, & armés d'ongles longs & pointus. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un brun plus foncé ſur le dos, un peu plus clair ſur les côtés, & encore plus clair ſur le ventre. Le muſeau eſt d'un cendré clair & bleuâtre: les ongles, les doigts & les pieds juſqu'au talon ſont noirs. La queue, qui a plus de la moitié de la longueur du corps, eſt couverte de poils bruns & noirâtres. On la trouve en *Amérique*, & ſurtout à *Maryland*.

Noſtratis Cuniculi magnitudinem circiter æquat. Oculos habet exſtantes & nigros; auriculas breves & rotundas; myſtacem pilis *ſetarum* inſtar rigidis conflatum, & præterea ſimiles pilos in utroque capitis latere ultrà oris angulos; 4 in pedibus anterioribus digitos, in poſterioribus 5, omnes longiſſimos, longis & acutis unguibus munitos. Per univerſum corpus veſtitur pilis fuſcis ſaturatiùs in dorſo, dilutè in lateribus, in ventre dilutiùs. Roſtrum ex dilutè cinereo cœruleſcit: ungues, digiti, & pedes ad talum uſque nigricant. Cauda, quæ pluſquam mediam corporis longitudinem attingit, pilis veſtitur fuſcis & nigreſcentibus. Habitat in *Americâ*, & præſertim in *Marglandiâ*.

Digitized by Google

** 6. La Marmotte de Pologne.

Glis flavicans, capite rufescente... Marmota Polonica.

Mus Alpinus. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p.* 233.
Rzac. Auct p. 327.
Mus Montanus quorumdam. *Rzac.*
Les Italiens l'appellent Marmontana. *Rzac.*
Les Allemands, Murmelthier. *Rzac.*
Les Polonois, Bobak; Swiszez. *Rzac.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 1 ½ pedis est; capitis, à naribus ad occipitium, 4 pollicum; caudæ totidem. Auriculas habet brevissimas & rotundas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevissimus & obtusus: pedum posteriorum digiti 3 intermedii duobus lateralibus sunt longiores. Universum corpus pilis flavicantibus vestitur, capite tamen & caudâ paululùm rufescentibus. Habitat in *Polonid.*

Elle a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 1 ½ pied: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 4 pouces: sa queue est de la même longueur. Ses oreilles sont très courtes & rondes. Elle à 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere; à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle très court & obtus: les 3 doigts du milieu des pieds de derriere sont plus longs que les 2 autres. Tout son corps est couvert de poils jaunâtres: sa tête est un peu rousse, ainsi que sa queue. On la trouve en *Pologne.*

** 7. La Marmotte des Alpes.

Glis pilis è fusco & flavicante mixtis vestitus... Marmota Alpina.

Glis, Marmota Italis. Mus Alpinus Plinii. *Klein. Quadr. p.* 56.
Mus caudâ elongatâ nudâ, corpore rufo. Marmota. *Linn. Syst. nat. ed.* 6. *g.* 21. *sp.* 11.
Mus Alpinus Plinii, Marmota Italis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 221.
Mus Alpinus, sive Marmota. *Aldro. Quadr. dig. viv. Fig. p.* 445. [*Fig. sat bona*].

Digitized by Google

Charlet. Exer p. 19.

Mus Alpinus. *Geſn. Quadr. p.* 840. *Fig. p.* 841. (*Fig. bona*).

Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 108. (*Fig. bona*).

Jonſt. Quadr. p. 117. *Fig. T.* 67. [*Fig. bona*].

Marmotte. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 33. *Fig. Pl.* 7. [*Fig bonne*].

Les Italiens l'appellent MURMONT; MARMOTA; MARMONTANA; VAROZA. *Geſn.*

Les Griſons, MONTANELLA. *Geſn.*

Les Allemands & les Suiſſes, MURMELTHIER; MURMENTLE; MISTBELLERLE. *Geſn.*

Les Suédois, MORMELDIUR. *Linn.*

La longueur de ſon coprs, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 1 ½ pied; celle de ſa tête, depuis les narines juſqu'à l'occiput, de 3 pouces 9 lignes; celle de ſes oreilles de 7 lignes; & celle de ſa queue, depuis ſon origine juſqu'au bout des poils, qui ſont fort longs, de 6 pouces. Elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere, dont les 3 du milieu ſont plus longs que les 2 lateraux. Tout ſon corps eſt couvert de poils rudes, variés de brun & de jaunâtre dans la partie ſupérieure du corps, & tout à fait jaunâtres dans la partie inférieure: ceux de la queue ſont variés de noir & de jaunâtre. On la trouve dans les *Alpes*.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 1 ½ pedis eſt; capitis, à naribus ad occipitium, 3 pollicum cum 9 lineis; auricularum 7 linearum; caudæ, ab exortu ad extremitatem uſque pilorum, qui longiſſimi ſunt, 6 pollicum. Pedes anteriores in 4 digitos fiſſi ſunt, poſteriores verò in 5, quorum 3 intermedii duobus lateralibus ſunt longiores. Univerſum corpus veſtitur pilis rigidis, ex fuſco & flavicante variegatis in parte corporis ſuperiore, in inferiore verò flavicantibus: pili caudæ ex nigro & flavicante variegantur. Habitat in *Alpibus*.

8. LA MARMOTTE DE STRASBOURG.

Glis ex cinereo rufus in dorſo, in ventre niger, maculis tribus ad latera albis... MARMOTA ARGENTORATENSIS.

Mus caudâ elongatâ, corpore cinereo, rutilo nigroque longitudinaliter vario. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 21. *ſp.* 10.

Digitized by Google

Glis Cricetus, Gesneri. *Klein. Quadr. p.* 56.
Cricetus Gesneri. *Raj. Syn. Quadr. p.* 221.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 232.
Rzac. aucl. p. 326.
Cricetus. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 836.
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 113.
Arctomys Palestinæ secundùm Gelenium. *Raj. Gesn.*
Porcellus frumentarius Schwenckfeldii. *Rzac.*
Mus magnus campi quorumdam. *Rzac.*
Auprès de Strasbourg on l'appelle KORNFÄRLE. *Gesn.*
Les Polonois l'appellent SKRZECZEK ; CHOMIK. *Rzac.*
Les Allemands, HAMSTER, *ou* HAMESTER. *Gesn. Rzac.*

Quoad magnitudinem *Rattum* inter & *nostratem Cuniculum* medio pollet. Pedes habet admodùm breves; caudam 8 circiter pollices longam. Capitis pars superior, dorsum, & cauda ex cinereo rufescunt : tempora rutila sunt, sicut & latera : venter est niger, & guttur candidum; & insuper utrumque latus maculis albis tribus numero distinguitur. Habitat in agris circà *Argentoratum*, in *Turingiâ*, *Misniâ* & *Poloniâ*.

Sa grandeur tient le milieu entre le *Rat* & *notre Lapin*. Elle a les pieds très courts, & la queue longue d'environ 8 pouces. Le dessus de la tête, le dos, & la queue sont d'un gris roux : les temples & les côtés sont roux : la gorge est blanche, & le ventre noir ; de plus les côtés sont marqués chacun de 3 taches blanches. On la trouve auprès de *Strasbourg*, dans la *Turinge*, la *Misnie*, & la *Pologne*.

XXVI.

Genus Muris.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ duo :
Canini nulli :
Digiti unguiculati :
Corpus aculeis destitutum :
Cauda nuda, aut raris pilis obsita.

XXVI.

Le Genre du Rat.

Son caractere est
D'avoir deux dents incisives à chaque mâchoire :
Point de dents canines :
Les doigts onguiculés :
Point de piequants sur le corps :
La queue nuë, ou couverte de poils clair semés.

Digitized by Google

Obſ. 1°. Les eſpeces de ce Genre ſe diſtinguent entr'elles par la longueur de leur queue, & par leurs couleurs: les unes ont la queue plus longue que le corps; d'autres ont la queue à peu près de la longueur du corps; & d'autres l'ont beaucoup plus courte. J'appelle la premiere *queue très longue*; la ſeconde *queue longue*; & la troiſiéme *queue courte*. J'entends par la longueur du corps, la diſtance qu'il y a depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue.

Obſ. 2°. Toutes les eſpeces de *Rats* ont les pieds de derriere plus longs que ceux de devant.

Obſ. 1°. Hujus Generis ſpecies coloribus & caudæ longitudine inter ſe diſtinguntur: aliæ caudam habent corpore longiorem; aliæ caudam corporis circiter longitudine; aliæ caudam corpore multò breviorem. Primam *caudam longiſſimam*; ſecundam *caudam longam*; tertiam denique *caudam brevem* vocavi. Per corporis longitudinem, intelligo diſtantiam occipitium inter & caudæ exortum.

Obſ. 2°. Omnes hujus Generis ſpecies pedes habent poſteriores anterioribus longiores.

** 1. LE RAT.

Mus caudâ longiſſimâ, obſcurè cinereus... RATTUS.

Mus caudâ longâ, ſubnudâ, corpore fuſco cineraſcente. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 21. ſp. 6.*
Faun. Suec. Linn. N°. 28.
Mus, Rattus domeſticus. *Klein. Quadr. p.* 57.
Mus domeſticus major, ſive Rattus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 217.
Sloane. Vol. II. p. 330.
Geſn. Quadr. Fig. p. 829. [*Fig. ſat bona*].
Geſn. Icon. Quadr. p. 114. *Fig. p.* 115. (*Fig. ſat bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 415.
Jonſt. Quadr. p. 115. *Fig. T.* 66. *ſub iſto nomine*, Glires. *(Fig. bonis)*.
Sorex. *Charlet. exer. p.* 25.
Guabiru Braſilienſibus. *Maregr. Hiſt. Br. p.* 229.
Les Grecs l'appellent Μῦς.
Les Eſpagnols, RATON. *Geſn. Aldro.*
Les Portugais, RATO DA CASA. *Maregr.*
Les Italiens, RATO DI CASA; PANTEGANA; SOURCO. *Geſn.*
Les Allemands, RATZ. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, SEZUREZ. *Aldro.*
Les Anglois, RAT; RATTE. *Raj. Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 7 pouces; celle de ſa tête,

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 7 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium,

tium, 2 circiter pollicum. Caudam habet corpore longiorem; auriculas magnas subrotundas, & pellucidas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguiculus est brevissimus. Per universum corpus vestitur pilis obscurè cinereis; cauda verò squamis minimis, pilis quibusdam rarissimis intermixtis, tegitur. Dantur & toti albi. Habitat in domibus.

depuis les narines jusqu'à l'occiput, d'environ 2 pouces. Sa queue est plus longue que le corps: ses oreilles sont grandes, arrondies & transparentes. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un petit ongle tres court. Tout son corps est couvert de poils d'un brun obscur, & sa queue de tres petites écailles, entre lesquelles sont quelques poils tres clair-semés. Il y en a qui sont tout à fait blancs. On le trouve dans les maisons.

** 2. La Souris.

Mus caudâ longissimâ, obscurè cinereus, ventre subalbescente... Sorex.

Mus caudâ nudiusculâ, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente.
Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 8.
Faun. Suec. Linn. N°. 31.
Mus minor; Musculus vulgaris domesticus, caudâ tereti longâ. *Klein. Quadr. p. 57.*
Mus domesticus vulgaris, seu minor. *Raj. Syn. Quadr. p. 218.*
Sloane. Vol. II. p. 330.
Mus domesticus communis vel minor. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 114.* (*Fig. sat bona*).
Mus domesticus minor. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 415. Fig. p. 417.* (*Fig. sat bona*).
Jonst. Quadr. p. 115. Fig. T. 66. sub isto nomine, Mures. (*Fig. sat bonis*).
Mus. *Gesn. Quadr. Fig. p. 808.* (*Fig. sat bona*).
Sorex domesticus. *Charlet. exer. p. 25.*
Carucvoca Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. p. 229.*
Les Hebreux l'appellent Acbar. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, Acbera. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Μυάριον, *ou* Μυσκος.
Les Arabes, Phir, *ou* Phar. *Gesn. Aldro.*

Digitized by Google

Les Sarrasins, FARRA. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols, RAT. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, TOPO; SORICE; SORGIO DI CASA. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, MUSZ. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois & les Illyriens, MYSS. *Gesn. Aldro.*
Les Suédois, MUS. *Linn.*
Les Anglois, MOWS. *Gesn. Aldro.* MOUSE. *Raj. Gesn. Aldro.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, est de 2 pouces 9 lignes; celle de sa tête de 11 lignes; celle de ses oreilles de 5 lignes; & celle de sa queue de 3 pouces 4 lignes. Elle a les oreilles larges, arrondies & transparentes; les yeux grands & à fleur de tête; & le même nombre de doigts que le précédent. La couleur de ses poils est un gris obscur dans la partie supérieure de son corps, & un peu blanchâtre dans la partie inférieure. Quelques unes sont tout à fait blanches. On la trouve dans les maisons.

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 2 pollicum cum 9 lineis; capitis 11 linearum; auricularum 5 linearum; caudæ 3 pollicum cum 4 lineis. Auriculas habet latas, subrotundas & pellucidas; oculos magnos exstantes; pedum digitos, ut in præcedente. Pili in parte corporis superiore obscurè sunt cinerei; in inferiore verò paululùm subalbescentes. Dantur & toti albi. Habitat in domibus.

** 3. LE RAT DE BOIS.

Mus caudâ longissimâ, suprà dilutè fulvus, infrà albicans.
MUS SYLVESTRIS.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 7 ½ pouces: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de 2 pouces; & sa queue de 7 ½ pouces: elle est, comme celle du *Rat*, couverte de tres petites écailles, entre lesquelles sont quelques poils tres clair-se-

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 7 ½ pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum; & caudæ 7 pollicum. Cauda verò, sicuti & cauda *Ratti*, squamis minimis, pilis quibusdam rarissimis intermixtis, tegitur. Au-

Digitized by Google

riculas habet auriculis *Ratti* similes. Pedes anteriores in 4, posteriores in 5 digitos fissi sunt : & loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis brevis & obtusus extat. Corporis pars superior, sicut & crurum exterior, sunt dilutè fulvæ ; inferior verò corporis pars, & crurum interior albæ. Habitat in sylvis. Ex Museo *Realmuriano*.

més. Ses oreilles sont semblables à celles du *Rat*. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle tres court & obtus. Toute la partie supérieure du corps, & l'extérieure des jambes sont d'un fauve clair ; & la partie inférieure du corps, & l'intérieure des jambes sont blanches. On le trouve dans les bois. Il est dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

4. Le grand Rat des champs.

Mus caudâ longissimâ, fuscus, ad latera rufus... Mus campestris major.

Mus agrestis major, Macrouros Gesneri. *Raj. Syn. Quadr. p.* 219. *Klein. Quadr. p.* 57. *Not.* 50.
Mus agrestis major. *Gesn. Quadr. p.* 830. *Fig. p.* 1104. (*Fig. sat bona*); *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p.* 116. [*Fig. sat bona*].
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 436.
Mus agrestis. *Rzac. auct. p.* 328.
Les Italiens l'appellent Campagnoli. *Aldro.*
Les Allemands, Feldmusz ; Erdmusz ; Nůlmusz, *ou* Nielmusz. *Gesn. Rzac.*
Les Anglois, Feldmusz. *Gesn.*
Les Polonois, Myss Polna. *Rzac.*

Ratti magnitudinem circiter attingit. Caudam, ut ille, longam habet & crassam ; auriculas rotundas ; caput magnum & rotundum. Pilorum color per universum corpus fuscus est, exceptis lateribus, in quibus rufus. Habitat in agris.

Il est à peu-près de la grandeur d'un *Rat*. Il a, comme lui, la queue longue & grosse : ses oreilles sont rondes ; sa tête grosse & arrondie. Tout son corps est couvert de poils bruns, excepté aux côtés, où ils sont roux. On le trouve dans les champs.

5. La Souris d'Amérique.

Mus caudâ longissimâ, dilutè spadiceus... Sorex Americanus.

Mus Americanus pilis dilutè spadiceis vestitus. *Seb. Vol. I. p.* 177. *Fig. T.* 111. *F.* 6. (*Fig. optimâ*).

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 3 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, d'un pouce; & celle de sa queue de 3 pouces 8 lignes. Elle a le museau un peu pointu; & les oreilles grandes & larges. Tout son corps est couvert de poils d'un bay-rouge clair. On la trouve en *Amérique*.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 3 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pollicis; & caudæ 3 pollicum cum 8 lineis. Rostrum paulò acutum est; auriculæ magnæ & latæ. Pili dilutè spadicei universum corpus vestiunt. Habitat in *Americâ*.

6. Le Rat d'Amérique.

Mus caudâ longissimâ, suprà ex rufo flavescens, infrà albicans; auriculis retrorsùm sitis... Rattus Americanus.

Mus Americanus. *Klein. Quadr. p.* 58. *Seb. Vol. II. p.* 30. *Fig. T.* 29. *F.* 2. (*Fig. bona*).

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ 3 $\frac{1}{2}$ pouces: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, a environ 15 lignes de long; & sa queue 4 pouces: elle est blanchâtre, & hérissée de quelques poils. Ses oreilles sont assez grandes, blanchâtres, & placées plus en arriere que dans les autres espèces de ce genre. Ses pieds de derriere sont plus grands & plus

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 3 $\frac{1}{2}$ circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 circiter linearum; caudæ 4 pollicum. Caudam habet albescentem, pilis quibusdam raris hispidam; auriculas sat magnas, albescentes, plus retrorsùm sitas quàm in aliis hujus generis speciebus; pedes posteriores

anterioribus majores & crassiores. Dorsum & capitis pars superior ex rufo flavescunt: pedes 4 & venter albicant. Habitat in *Americâ*.

gros que ceux de devant. Son dos & la partie supérieure de sa tête sont d'un roux jaunâtre; le ventre & les 4 pieds sont blancs. On le trouve en *Amérique*.

7. Le Rat blanc de Virginie.

Mus caudâ longâ, albus, mystace nigricante... Mus albus Virginianus.

Mus agrestis Virginianus albus. *Klein. Quadr. p.* 57. *Seb. Vol. I. p.* 76. *Fig. T.* 47. *F.* 4. (*Fig. optimâ*).

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 3 ½ circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 15 linearum; caudæ 2 pollicum cum 9 lineis. Caput habet acuminatum, & mystacem pilis longis nigricantibus conflatum; caudam in exortu crassam, in acumen desinentem, pilisque longis & raris obsitam. Per universum corpus vestitur pilis brevibus albis. Habitat in *Virginiâ*.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 3 ½ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 15 lignes; & celle de sa queue de 2 pouces 9 lignes. Il a la tête oblongue, & une moustache composée de poils longs & noirâtres. Sa queue, qui est grosse à son origine, se termine en pointe, & est garnie de poils longs & clair-semés. Tout son corps est couvert de poils blancs & courts. On le trouve en *Virginie*.

8. Le Rat de Norvége.

Mus caudâ longâ, ex dilutè cinereo fuscus... Mus Norvegicus.

Mus ex Norvagiâ cinereo fuscus. *Seb. Vol. II. p.* 64. *Fig. T.* 63. *F.* 5. [*Fig. bona*].
Glis Norvagicus. *Klein. Quadr. p.* 56.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ ex-

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue,

Digitized by Google

environ 4 ½ pouces ; depuis les narines jusqu'à l'occiput, 1 ½ pouce : sa queue a 3 ½ pouces de long. Il a une moustache composée de longs poils. Ses oreillos sont courtes & larges ; son dos large & courbé ; son ventre pendant ; ses cuisses grosses ; ses doigts longs, & armés d'ongles pointus. Tout son corps est couvert de poils d'un cendré clair, tirant sur le brun. On le trouve en *Norvége*.

ortum, 4 ½ circiter pollicum ; capitis, à naribus ad occipitium, 1 ½ pollicis ; caudæ 3 ½ pollicum. Mystacem habet longis pilis conflatum ; auriculas breves & latas ; dorsum latum, incurvum ; ventrem pendulum ; femora crassa ; digitos longos, acutis unguibus munitos. Per universum corpus vestitur pilis ex dilutè cinereo fuscis. Habitat in *Norvegiâ*.

** 9. Le Mulot.

Mus caudâ longâ, suprà è fusco flavescens, infrà ex albo cinerascens.

Mus caudâ longâ, corpore nigro flavescente, abdomine albo. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 7.*
Faun. Suec. Linn. N°. 30.
Mus domesticus medius. *Raj. Syn. Quadr. p. 218.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 4 ½ pouces ; celle de sa tête de 15 lignes ; & celle de sa queue de 3 ½ pouces. Il a les yeux grands, & à fleur de tête ; les oreilles larges, rondes & transparentes ; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle court & obtus. La couleur de ses poils est un brun jaunâtre dans la partie supérieure de son corps, &

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 4 ½ pollicum ; capitis 15 linearum ; caudæ 3 ½ pollicum. Oculos habet magnos & prominentes ; auriculas latas, rotundas, & pellucidas ; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5 : loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevis & obtusus. Pili in parte corporis superiore ex fusco flavescunt ; in inferiore ex albo cinerascunt ; in lateribus capitis ru-

fescunt. Habitat in sylvis, agris, & hortis.

un blanc tirant sur le gris dans l'inférieure : il y a un peu de rousâtre à chaque côté de la tête. On le trouve dans les bois, les champs & les jardins.

10. Le Rat Oriental.

Mus caudâ longâ, rufus, lineis in dorso albicantibus, margaritarum æmulis... Mus Orientalis.

Mus Orientalis. *Klein. Quadr. p.* 57.
Seb. Vol. II. p. 22. *Fig. T.* 21. *F.* 2. (*Fig. optimè*).

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 2 est pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 8 aut 9 linearum; caudæ, 1 $\frac{1}{2}$ pollicis. Auriculas habet brevissimas, sicut & crura; pedes latos; caudam crassam. Pilorum color rufus est, lineis albicantibus margaritarum æmulis per dorsum distinctus. Habitat in *Indiâ Orientali.*

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, environ 2 pouces. Sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, a 8 ou 9 lignes de long; & sa queue 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Il a les oreilles & les jambes tres courtes; les pieds assez larges, & la queue grosse. La couleur de son poil est rousse. Il a sur le dos des rayes blanchâtres, qui paroissent perlées. On le trouve dans les *Indes Orientales.*

** 11. Le Rat d'Eau.

Mus caudâ longâ, pilis suprà ex nigro & flavescente mixtis, infrà cinereis vestitus... Mus aquaticus.

Mus major aquaticus, sive Rattus aquaticus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 217.
Mus, Rattus aquatilis. *Klein. Quadr. p.* 57.
Mus aquatilis, Quadrupes Bellonii. *Gesn. Icon. aquat. Fig. p.* 354. [*Fig. mala*].
Mus aquatilis. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 447.
Mus aquaticus. *Gesn. Quadr. p.* 830.
Jonst. Quadr. p. 117.
Bell. de aquat. p. 35. *Fig. p.* 36. (*Fig. mala*).
Rzac. auct. p. 328.

Digitized by Google

Sorex aquaticus. *Charlet. exer. p. 25.*

Castor caudâ lineari tereti. Rattus aquaticus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 20. sp. 3.*

Faun Suec. Linn. No. 25.

Les Grecs l'appellent Μῦς ὑδρος.

Les Italiens, SORGO MORGANGE. *Gesn. Aldr.*

Les Polonois, MYSS WODNA. *Rzac.*

Les Allemands, WASSER-MUSZ. *Gesn. Aldr. Rzac.* WASSER-RATZ. *Gesn.*

Les Suédois, WATN-ROTTA. *Linn.*

Les Anglois, WATTER-RATTE. *Gesn. Aldr.*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 6 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 2 pouces; celle de sa queue de 4 pouces 3 lignes: le tour de son corps est de 4 $\frac{1}{2}$ pouces. Il a les yeux assez grands; les oreilles courtes, rondes & presque cachées dans ses poils; 4 doigts aux pieds de devant & 5 à ceux de derriere: à la place du pouce, qui manque aux pieds de devant, est un ongle court & obtus. Ses poils sont mêlés de noir & de jaunâtre dans la partie supérieure de son corps, & dans la partie inférieure ils sont cendrez, & mêlez d'un peu de jaunâtre. On le trouve dans des endroits aquatiques.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 6 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2 pollicum; caudæ 4 pollicum cum 3 lineis; ambitus corporis 4 $\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet sat magnos; auriculas breves, rotundas, & ferè in pilis occultas; 4 in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus 5: loco pollicis, quo caret pes anterior, unguis est brevis & obtusus. Pilorum color in parte corporis superiore ex nigro & flavescente mixtus est, in inferiore cinereus, cum pauco flavescente admixto. Habitat in aquosis locis.

12. LE PETIT RAT DES CHAMPS.

Mus caudâ brevi, pilis è nigricante & sordidè luteo mixtis in dorso, & saturatè cinereis in ventre vestitus... MUS CAMPESTRIS MINOR.

Mus caudâ brevi, corpore nigro fusco, abdomine cinerascente. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 21. sp. 4.*

Faun.

Digitized by Google

Faun. Suec. Linn. No. 27.
Mus agrestis capite grandi brachiuros. *Raj. Syn. Quadr. p.* 218.
Mus agrestis capite grandi. *Klein. Quadr. p.* 57. *Not.* 50.
Mus agrestis minor. *Gesn. Quadr. p.* 830.
Gesn. Icon. Quadr. p. 116.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 436.
Les Italiens l'appellent CAMPAGNOLI. *Aldro.*

Soricem magnitudine superat. Corpus habet longius; caput grande; rostrum breve, obtusum; oculos parvos; auriculas breves, latas, subrotundas, in pilis, qui longiores sunt quam in *Sorice*, penè occultatas; caudam pollicis longitudinem non multùm superantem, & pilis quam in *Ratto* crebrioribus, non tamen densis, vestitam; crura perbrevia. Pilorum color è nigricante & sordidè luteo mixtus est in dorso, & saturatè cinereus in ventre. Habitat in agris, in messe frequens.

Il est plus grand que la *Souris*. Il a le corps allongé; la tête grosse; le museau court & obtus; les yeux petits; les oreilles courtes, larges, arrondies, & presque cachées dans ses poils, qui sont un peu plus longs que ceux de la *Souris*. Sa queue n'a gueres plus d'un pouce de long: elle est plus couverte de plois que celle du *Rat*, quoiqu'ils soient encore clair semez. Ses jambes sont courtes. La couleur de ses poils est mêlée de noirâtre & de vilain jaune sur le dos, & d'un gris foncé sur le ventre. On le trouve dans les champs, & sur tout pendant la moisson.

SECTIO III.

Ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeis destitutum habent.

UNICO Genere, scilicet *Musaranei*, constituitur hæc Sectio.

SECTION III.

Ceux qui ont des dents canines, & qui n'ont point de picquants sur le corps.

CETTE Section ne contient qu'un seul Genre, qui est celui de la *Musaraigne*.

Digitized by Google

XXVII.

Le Genre de la Muſaraigne.
(Fig. 2.).

Son caractere eſt
D'avoir deux dents inciſives (Fig. 2. a. b.) à chaque mâchoire:
Des dents canines: (Fig. 2, c.)
Les doigts onguiculés:
Point de picquants ſur le corps.

XXVII.

Genus Muſaranei.
(Fig. 2.).

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ duo: (Fig. 2. a, b.)
Canini præſentes: (Fig. 2. c.)
Digiti unguiculati:
Corpus aculeis deſtitutum.

** 1. LA MUSARAIGNE.

Muſaraneus ſuprà ex fuſco rufus, infrà albicans... MUSARANEUS.

Muſaraneus, roſtro productiore. Mus venenoſus. *Klein. Quadr. p.* 58.
Muſaraneus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 239.
Geſn. Quadr. Fig. p. 844. (*Fig. ſat bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 441. *Fig. p.* 442. [*Fig. mala*].
Jonſt. Quadr. p. 116. *Fig. T.* 66. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 25.
Muſaraneus; Mus cæcus; Mygale. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 116. (*Fig. ſat bona*).
Sorex. Muſaraneus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 22. *ſp.* 1.
Faun. Suec. Linn. No. 33.
Les Bourguignons l'appellent SERY. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Μυγαλή.
Les Eſpagnols, RATON PEQUÉNNO. *Geſn.* MURGANHO. *Aldro.*
Les Italiens, TOPORAGNO. *Aldro.*
Les Griſons, MUSERAING. *Geſn. Aldro.*
Les Savoyards, MUSET, *ou* MUSETTE. *Aldro.*
Les Suiſſes, MUTZBT. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, SPITZMUSS. *Geſn. Aldro.*
Les Siléſiens, BISEM-MUSS. *Geſn.*
Les Illyriens, NIEMEGKA-MYSS. *Geſn.*
Les Polonois, KERET. *Geſn.*
Les Suédois, NÄBBMUS. *Linn.*
Les Anglois, SHREW *Raj. Geſn. Aldro.* SHREW-MOUSE, *ou* HARDY-SHREW. *Raj.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſ-

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ

exortum, 2 ½ pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 9 linearum; caudæ 15 linearum. Nasum habet ultrà maxillam inferiorem multò prominentem, & acutissimum; oculos minimos & nigros; auriculas breves, sicut & crura; in singulis pedibus digitos 5, quorum 3 intermedii pedum posteriorum duobus lateralibus sunt longiores; caudam pilis brevibus vestitam. Pilorum color in parte corporis superiore ex fusco rufus est, in inferiore, sicut & in 4 pedibus, albicans. Dentes habet incisores in utrâque maxillâ binos, acutos; superiores (*Fig.* 2. *a.*) bifidos & uncinatos; inferiores (*Fig.* 2. *b.*) rectè antrorsùm prominentes, apice recurvos: sunt insuper dentes canini in maxillâ superiore 3 utrinque, quorum primus duobus aliis major; & in maxillâ inferiore duo utrinque, quorum primus sequente minor est: dentes molares in maxillâ superiore 4 utrinque, quorum ulterior parvus; & in maxillâ inferiore 3 utrinque: summa dentium 28. Habitat in agris.

qu'à l'origine de la queue, est de 2 ½ pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 9 lignes; celle de sa queue de 15 lignes. Son nez avance beaucoup au delà de la mâchoire inférieure, & est très pointu. Elle a les yeux très petits & noirs; les oreilles & les jambes courtes; à chaque pied 5 doigts, dont les 3 du milieu des pieds de derriere sont plus longs que les 2 lateraux. Sa queue est couverte de poils courts. Toute la partie supérieure de son corps est d'un brun roux, & l'inférieure est blanchâtre, ainsi que les 4 pieds. Elle a à chaque mâchoire 2 dents incisives pointues: les supérieures (*Fig.* 2. *a.*) sont échancrées & crochues; les inférieures (*Fig.* 2. *b.*) avancent droit en avant, & sont un peu courbées vers le bout: elle a en outre 3 dents canines de chaque côté à la mâchoire supérieure, dont la premiere est plus grande que les 2 autres; & 2 de chaque côté à la mâchoire inférieure, dont la premiere est plus petite que la suivante: de plus 4 dents molaires de chaque côté à la mâchoire supérieure, dont la derniere est petite; & 3 de chaque côté à la mâchoire inférieure: en tout 28 dents. On la trouve dans les champs.

Digitized by Google

2. La Musaraigne du Brésil.

Musaraneus fuscus, tribus tæniis in dorso nigris... Musaraneus Brasiliensis.

Musaraneus. *Maregr. Hist. Bt. p.* 229.

La longueur de son corps, depuis l'extrêmité du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 5 doigts; & celle de sa queue d'environ 2 doigts. Son museau est très pointu. Sa couleur est brune; & elle a 3 bandes noires qui s'étendent sur le dos, selon sa longueur, depuis la tête jusqu'à la queue. On la trouve au *Brésil*.

Corporis longitudo, ab extremitate oris ad caudæ exortum, circiter 5 digitorum; caudæ ferè 2. Os habet acutum. Color ipsius est fuscus; & in dorso, secundùm longitudinem, à capite ad caudam, 3 tænias habet nigras. Habitat in *Brasiliâ*.

SECTION IV.

Ceux qui ont des dents canines, & le corps couvert de picquants.

Il n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, sçavoir celui du *Hérisson*.

SECTIO IV.

Ea quæ dentibus caninis donantur, & corpus aculeatum habent.

Unicum Genus, scilicet *Erinacei*, continet hæc Sectio.

XXVIII.

Le Genre du Hérisson. (Fig. 3.).

Son caractere est
D'avoir deux dents incisives (Fig. 3. a, b.) à chaque mâchoire:
Des dents canines:
Les doigts onguiculés:
Le corps couvert de picquants.

XXVIII.

Genus Erinacei. (Fig. 3.).

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ duo: (Fig. 3. a, b.)
Canini præsentes:
Digiti unguiculati:
Corpus aculeatum.

Digitized by Google

** 1. LE HÉRISSON.

Erinaceus auriculis erectis... ERINACEUS.

Erinaceus auriculatus. Echinus terrestris. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 11. sp. 1. Faun. Suec. Linn. No. 16.*
Echinus, sive Erinaceus terrestris. *Raj. Syn. Quadr. p. 231.*
Echinus vel Herinaceus. *Gesn. Icon. Quadr. p. 106. Fig. p. 107. (Fig. bona).*
Echinus terrestris. *Gesn. Quadr. p. 399. Fig. p. 400 [Fig. bona]. Aldro. Quadr. dig. viv. p. 459. Jonst. Quadr. p. 119. Fig. T. 68. sub isto nomine*, Herinaceus. *(Fig. bona). Mus. Worm. p. 334.*
Erinaceus nostras. *Seb. Vol. I. p. 78. Fig. T. 49. F. 1. & 2. (Fig. optimis).*
Erinaceus. *Charlet. Exer. p. 19.*
Herinaceus. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 233. Rzac. auct. p. 326.*
Hericius, Herix Sipontino. *Rzac.*
Acanthion vulgaris nostras. Herinaceus: Echinus. *Klein. Quadr. p. 66.*
Acanthio terrestris Galeni. *Rzac.*
Les Hébreux l'appellent KIPOD. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, KOPEDA. *Gesn.*
Les Grecs, Ex...
Les Espagnols, ERIZO. *Gesn. Aldro.*
Les Portugais, OURISO, *ou* ORICO CACHERO. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, RICCIO, *ou* RIZO. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, IGEL. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, GEIS, *ou* MALOX, *ou* TZWHEREATKO, *ou* OTZHSCHAK. *Gesn.*
Les Polonois, IEZ; ZIEMUY. *Rzac.*
Les Suédois, IGELNOTT. *Linn.*
Les Hollandois; YSEREN VEREKEN. *Gesn.*
Les Anglois, URCHIN, *ou* HEDGEHOG. *Raj. Gesn. Aldrov.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium, 9 pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, 2½ pollicum; caudæ 1 pollicis. Oculos habet parvos & extantes; auriculas latas, rotundas, & erectas; nares crist-

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 9 pouces; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 2 ½ pouces; celle de sa queue d'un pouce. Ses yeux sont petits & à fleur de tête; ses oreil-

les larges, rondes & élevées; ſes narines dentelées comme la crête d'un *Coq*. Il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles: le pouce eſt plus court que les autres. Tout le deſſus du corps, ſçavoir le dos, les côtés, & le ſommet de la tête ſont couverts de picquants durs & pointus, variés de brun & de blanchâtre, dont les plus longs ont environ 1 ½ pouce: & la tête, ſi l'on en excepte le ſommet, la gorge, le ventre, les pieds & la queue ſont couverts de poils bruns ou blanchâtres. Il a à chaque mâchoire 2 longues dents inciſives; les ſupérieures (*Fig. 3. a.*) ſont éloignées l'une de l'autre, & les inférieures (*Fig. 3. b.*) preſque contigues: & en outre de chaque côté de la mâchoire ſupérieure ſont 4 petites dents canines ſéparées par paires, & 5 molaires, dont la premiere & la derniere ſont plus petites que les 3 du milieu; & de chaque côté de la mâchoire inférieure 3 petites dents canines contigues, & couchées obliquement en avant, & 4 molaires, dont la derniere eſt plus petite que les 3 autres: en tout 36 dents. On le trouve dans les bois.

tæ *Galli* inſtar dentatas; in ſingulis pedibus digitos 5 unguibus munitos, pollice aliis digitis breviore. Corporis pars ſuperior, dorſum ſcilicet, latera, & vertex capitis, aculeis teguntur rigentibus & acutis, ex fuſco & albido variis, majoribus 1 ½ pollicem circiter longis: caput verò, vertice excepto, gutturem, ventrem, pedes, & caudam pili aut fuſci aut albidi cooperiunt. Dentes ſunt inciſores in utráque maxillâ duo longi, ſuperiores (*Fig. 3. a.*) à ſe invicem diſtantes, inferiores (*Fig. 3. b.*) ferè contigui: canini in maxillâ ſuperiore 4 utrinque parvi, per paria remoti; in inferiore 3 utrinque parvi, contigui, obliquè antrorsùm inclinati: molares in maxillâ ſuperiore 5 utrinque, quorum anterior & ulterior parvi ſunt, intermediis majoribus; in inferiore 4 utrinque, quorum 3 anteriores majores, & ulterior parvus: ſumma dentium 36. Habitat in ſylvis.

2. Le Hérisson de Siberie,

Erinaceus auriculis planis... Erinaceus Sibericus,

Erinaceus Sibericus. *Seb. Vol. I. p. 79. Fig. T. 49. Mas F. 5. & femina F. 4. (Fig. optimis).*

Acanthion echinatus. Echinus Sibiricus. *Klein. Quadr. p. 66.*

Digitized by Google

Si figura, quam istius speciei *Seba* dedit, magnitudinem naturalem æquet, ab extremitate rostri ad caudæ initium, non ultrà 6 pollices longus est. Auriculas habet breves & planas; rostrum breve, sicut & caudam, quæ 6 linearum longitudinem non superat; in singulis pedibus 5 digitos, pollice aliis breviore. Corporis pars superior vestitur aculeis crassis, brevibus, acuminatis, saturatè rufis, apicibus auro quasi obductis: venter verò tegitur pilis tenuissimis, laneis, dilutè cinereis, & auro quasi obductis. Habitat in *Siberiâ*.

Si la figure, qu'en a donné *Séba*, est de grandeur naturelle, il ne paroît pas avoir plus de 6 pouces, du bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Il a les oreilles courtes & applaties; le museau court, ainsi que la queue, qui a tout au plus 6 lignes de long; à chaque pieds 5 doigts, dont le pouce est plus court que les autres. Toute la partie supérieure de son corps est couverte de picquants gros, courts, pointus, d'un roux foncé, & dont le bout paroît d'un jaune doré: son ventre est garni de poils fins, laineux, d'un cendré clair, & qui semblent dorés. On le trouve en *Siberie*.

3. Le Hérisson de Malacca.

Erinaceus auriculis pendulis... Erinaceus Malaccensis.

Acanthion aculeis longissimis. Hystrix genuina; Porcus aculeatus, Malaccensis. *Klein. Quadr. p. 66.*

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda truncata. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 17. sp 4.*

Porcus aculeatus, seu Hystrix Malaccensis. *Seb. Vol. I. p. 81. Fig. T. 51. F. 1. & 2.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad anum usque, 8 circiter pollicum; capitis, à naribus ad occipitium, $2\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet magnos & lucidos; auriculas nudas ferè, & pendulas; in singulis pedibus 5 digitos unguibus brevibus munitos. Corporis pars supe-

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, environ 8 pouces: sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, est longue de $2\frac{1}{2}$ pouces: ses yeux sont grands & brillants; ses oreilles presque dénuées de poils, & pendantes: il a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles courts. Tout le dessus de son corps est

Digitized by Google

hériſſé de picquants droits & pointus, comme des *aléne*s, de différente longueur, ſçavoir depuis un pouce juſqu'à 6, variés en partie de blanc & de noir, & en partie de blanc & de rouſsâtre : les eſpaces qui ſont entre ces picquants, ſont remplis de poils déliés, longs & ſoyeux : ſa tête eſt couverte de poils courts : ceux de ſon ventre, de ſes jambes, & de ſes pieds ſont déliés, courts, picquants, épais, & roux. On le trouve à *Java*, à *Sumatra*, & ſurtout à *Malacca*.

rior rectis & *jubularum* inſtar acuminatis horret aculeis, à pollicari ad ſeſquipedalem uſque menſuram variæ longitudinis, partim ex albo & nigro, partim ex albo & ſubrufo variegatis : horum interſtitia pilis replentur tenuibus, longis, & *ſetarum* æmulis : caput brevibus pilis obſitum eſt : venter, crura, & pedes pilis rufis, brevibus, tenuibus, acuminatis, & denſis. Habitat in *Javâ*, *Sumatrâ*, & præſertim *Malaccâ*.

4. Le Hérisson d'Amérique.

Erinaceus auriculis nullis... Erinaceus Americanus.

Erinaceus ſubauriculatus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 11. ſp. 2.*
Erinaceus Americanus albus. *Seb. Vol. I. p. 78. Fig. T. 49. F. 3.* [*Fig. optima*].
Echinus Indicus albus. *Raj. Syn. Quadr. p. 232.*
Acanthion echinatus; Erinaceus Americanus albus, Surinamenſis. *Klein. Quadr. p. 66.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 8 pouces de long. Sa tête eſt groſſe & courte : ſon col eſt court, ainſi que ſa queue, qui eſt couverte de très peu de poils. Il ne luy paroit point d'oreilles ; mais il a à leur place des trous, par leſquels il entend. Ses pieds ont chacun 5 doigts armés d'ongles longs, aigus & crochus. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt couverte de

Corpus, ab extremitate roſtri ad caudæ initium, 8 circiter pollices longum eſt. Caput breve & craſſum ; collum breve, ſicut & cauda, quæ raris obſita eſt pilis. Auricularum nullum apparet veſtigium ; ſed loco ipſarum foramina ſunt aperta, quibus ſonum recipit. Pedes ſinguli in 5 fiſſi ſunt digitos longis, acutis, & incurvis unguibus munitos. Corporis pars ſu-

perior

perior aculeis tegitur brevibus, crassis, rigidis, ex cinereo dilutè flavescentibus : capitis pars anterior, venter & pedes vestiuntur pilis setaceis albicantibus: qui ventrem cooperiunt, longiores & molliores sunt, quam qui *Erinacei nostratis* ventrem obtegunt: suprà oculos breves sunt pili obscurè fusci, ad latera verò retrorsùm longi nigricantes. Habitat in *Americâ.*

picquants courts, gros, durs, & d'un cendré tirant sur le jaune passe: le devant de sa tête, son ventre & ses pieds sont couverts de poils soyeux & blanchâtres: ceux qui couvrent son ventre, sont plus longs, & moins rudes, que ceux qui couvrent le ventre de nos *Hérissons ordinaires*: il a au dessus des yeux des poils courts d'un brun foncé, & aux côtés vers le derriere des poils longs & noirâtres. On le trouve en *Amérique.*

ORDRE XIII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont quatre dents inciſives à chaque máchoire, & les doigts onguiculés.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre, les uns ont tous les doigts ſeparés les uns des autres: les autres ont ceux des pieds de devant joints enſemble par une membrane étendue en aîles. Ils ſe diviſent en deux Sections: dans la premiere ſont ceux qui ont tous les doigts ſeparés les uns des autres, comme les *Singes*: dans la ſeconde ſont ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étendue en aîles, comme la *Rouſſette*.

ORDO XIII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ quatuor, & digitis unguiculatis donata.

HUJUS Ordinis QUADRUPEDUM alia ſunt quorum digiti omnes à ſe invicem omninò ſunt ſeparati: alia quorum digiti pedum anteriorum membranâ in alas expansâ inter ſe connectuntur. In duas Sectiones dividuntur: prima continet ea quorum omnes digiti à ſe invicem ſeparati ſunt, ſicut *Simia*: ſecunda ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ in alas expansâ inter ſe connectuntur, ſicut *Pteropus*.

SECTION I.

Ceux dont tous les doigts ſont ſeparés les uns des autres.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, qui eſt celui des *Singes*.

SECTIO I.

Ea quorum digiti omnes à ſe invicem ſeparati ſunt.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, ſcilicet *Simiarum*.

Digitized by Google

XXIX.

Genus Simiæ.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ quatuor:
Digiti unguiculati,
Omnes à se invicem separati:
Pollex distinctus.

Obs. 1°. Omnes Simiarum species ciliis in utraque palpebra donantur: a habent in pectore mammas; & anteriora & posteriora crura brachiis & cruribus *hominum* similia. Pedes anteriores manus *hominum* referunt, & manuum officium præstant: posteriores sunt velut manus majusculæ, & digitis, ut manus, constant, medio longiore; officiumque duplex, tum manuum scilicet, tum pedum præstant.

Obs. 2°. Quædam nullam habent caudam; aliæ caudatæ sunt: ex utrisque aliæ sunt rostro brevi, aliæ rostro productiore: inter caudatas, aliæ caudam brevissimam, aliæ caudam longam habent. In 5 *Stirpes* dividuntur: prima est earum quæ nullam habent caudam, quæ sunt rostro brevi, quæque *Simiæ propriè dictæ* vocantur: secunda earum quæ nullam habent caudam, quæ sunt rostro productiore, quæque *Simiæ Cynocephalæ* dicuntur: tertia earum quæ caudam habent brevissimam, & *Papiones* dictæ sunt: quarta earum quæ caudam habent longam, quæ sunt rostro brevi, quæque *Cercopitheci simpliciter* dicuntur: quinta denique earum quæ cau-

XXIX.

Le Genre du Singe.

Son caractere est
D'avoir quatre dents incisives à chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous separés les uns des autres:
Le pouce bien distinct.

Obs. 1°. Toutes les especes de Singes ont des cils aux deux paupieres, deux mamelles à la poitrine, & les jambes de devant & celles de derriere semblables aux bras & aux jambes de *l'homme*. Leurs pieds de devant ressemblent à la main de *l'homme* & en font l'office: ceux de derriere sont comme de grandes mains; leurs doigts sont semblables à ceux des mains, dont le milieu est le plus long: ils servent selon le besoin & de pieds & de mains.

Obs. 2°. Quelques uns n'ont point de queue; les autres en ont: parmi les uns & les autres, les uns ont le museau court, & les autres l'ont allongé: parmi ceux qui ont une queue, quelques uns l'ont très courte; les autres l'ont longue. Ils se divisent en 5 *Races*: la premiere est de ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau court, qu'on appelle *Singes proprement dits*: la seconde est de ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau allongé, qu'on appelle *Singes Cynocéphales*: la troisiéme est de ceux qui ont une queue très courte, qu'on appelle *Babouins*: la quatriéme est de ceux qui ont une queue longue, & le museau court, qu'on appelle *simplement Cercopithéques*: la cinquiéme est de ceux qui ont une queue longue, & le mu-

Digitized by Google

seau allongé, qu'on appelle *Cercopithéques Cynocéphales.*

dam habent longam, & sunt rostro productiore, quæque *Cercopitheci Cynocephali* nominantur.

Table Méthodique des Singes divisez en cinq Races.

LES Singes ou
- N'ont point de queue; &
  - Le museau court... LE SINGE... *Rac. I.*
  - Le museau allongé... LE SINGE CYNOCÉPHALE... *Rac. II.*
- Ont une queue
  - Très courte... LE BABOUIN... *Rac. III.*
  - Longue; &
    - Le museau court... LE CERCOPITHÉQUE... *Rac. IV.*
    - Le museau allongé... LE CERCOPITHÉQUE CYNOCÉPHALE... *Rac. V.*

Tabula Synoptica Simiarum in quinque Stirpes distinctarum.

SIMIÆ sunt vel
- Ecaudatæ;
  - Rostro brevi... SIMIA... *Stirps I.*
  - Rostro productiore...; SIMIA CYNOCEPHALA... *Stirps II.*
- Caudatæ;
  - Caudâ brevissimâ... PAPIO... *Stirps III.*
  - Caudâ longâ;
    - Rostro brevi... CERCOPITHECUS... *Stirps IV.*
    - Rostro productiore... CERCOPITHECUS CYNOCEPHALUS... *Stirps V.*

RACE I.

Ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau court.

LE SINGE.

STIRPS I.

Ea quæ sunt ecaudatæ, rostro brevi.

SIMIA.

** 1. LE SINGE.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis... SIMIA.

Simia simpliciter dicta, caudâ carens. *Raj. Syn. Quadr. p.* 149. *Sloane. Vol. II. p.* 328.

Simia. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 957. (*Fig. bona*).
Gesn. Icon. Quadr. p. 91. *Fig. p.* 92. (*Fig. bona*).
Jonst. Quadr. p. 96. *Fig. T.* 59. *sub isto nomine*, Simia 1 & 2. (*Fig. satis bona*).

Digitized by Google

Les Hébreux appellent le Singe KOPH. *Gesn.*
Les Chaldéens, KOPHIN. *Gesn.*
Les Grecs, Πίθηκος.
Les Arabes, CATAPH. *Gesn.*
Les Espagnols, XIMIO. *Gesn.*
Les Italiens, SIMIA. *Gesn.*
Les Allemands, AFF. *Gesn.*
Les Illyriens, OBIEZE. *Gesn.*
Les Flamands, SIME, *ou* SCHEMIKEL. *Gesn.*
Les Anglois, APE. *Gesn. Raj.*

Plurimas vidi Simiarum ſpecies, magnitudine tantummodo à ſe invicem diſcrepantes. Ipſarum facies, auriculæ, & ungues vultum, auriculas & ungues *hominum* imitantur. Univerſum corpus, exceptis clunibus nudis, veſtitur pilis ex virideſcente & flavicante variegatis : pars corporis ſuperior magis virideſcit, inferior verò magis flaveſcit. Habitant in *Africâ*.

J'ai vû pluſieurs eſpeces de Singes, qui ne differoient entre elles que par la grandeur. Leur face, leurs oreilles & leurs ongles ſont aſſez ſemblables au viſage, aux oreilles & aux ongles de l'*homme*. Le poil qui couvre tout leur corps, exceptés les feſſes qui ſont nuës, eſt mêlé de verdâtre & de jaunâtre : le verdâtre domine dans la partie ſupérieure du corps, & le jaunâtre dans la partie inférieure. On les trouve en *Afrique*.

2. L'HOMME DES BOIS.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis, cæſarie faciem cingente... HOMO SYLVESTRIS.

Simia ecaudata, ſubtùs glabrâ. Satyrus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 1. ſp. 1.*
Simia Ourang outang, i. e. Homo ſylveſtris ; vir ſylvarum. *Klein. Quadr. p. 86.*
Satyrus Indicus, *Ourang outang* Indis, & *Homo ſylveſtris* dictus. *Charlet. Exer. p. 16.*
Ourang outang, ſive Homo ſylveſtris. *Bont. Ind. ori. Fig. p. 84.*
Ourang outang Indorum. *Jonſt. Quadr. p. 97.*
Baris. *Euſ. Nieremb.* p. 179.
Les Anglois l'appellent CHIMPANRÉE. *Klein.*

Auctores omnes, qui hujus Simiæ mentionem fece-

Tous les Auteurs, qui ont parlé de cette eſpece de Singe,

n'en ont rien dit autre chose, si ce n'est qu'elle est parfaitement semblable à l'*homme*, & que le mâle & la femelle ont le corps couvert d'un poil court, & assez doux. Il paroit, par la figure qu'en a donné *Bontius*, que sa tête est couverte de longs cheveux, qui croissent aussi sous le menton, & que sa face est nuë. On le trouve dans les *Indes Orientales*.

runt, nihil aliud de eâ retulerunt, nisi quod sit *homini* simillima, & quod utrique sexui corpus pilosum sit, sed pilo brevi ac satis leni. Figura, quam hujus dedit *Bontius*, caput obductum longis crinibus sub mento etiam crescentibus, nudamque faciem demonstrat. Habitat in *Indiâ Orientali*.

3. Le Singe de Ceylan.

Simia unguibus Indicis pedum posteriorum longis, incurvis, & acutis... Simia Ceylonica.

Simia Ceylonica, superiori labio leporino. *Klein. Quadr. p.* 86.
Cercopithecus Ceylonicus, seu *Tardigradus* dictus, major. *Seb. Vol. I. p.* 75. *Fig. T.* 47. *F.* 1. (*Fig. bona*).
Elegantissimum animal, Musei D. Charleton. *Raj. Syn. Quadr. p.* 161.

Si la figure, que nous a donné *Séba* de cet animal, est de grandeur naturelle, il a environ 9 pouces de long, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anus: ses bras & ses jambes sont longues & menuës : sa lévre supérieure est fenduë comme celle d'un *Liévre* : tous ses ongles sont plats & arrondis, exceptés ceux de l'index des pieds de derriere, qui sont longs, recourbés, & aigus. Son poil est doux, soyeux, & d'un brun noirâtre; mais tout à fait noir sur le dos : celui qui couvre le ventre, les bras & les pieds, est plus court, & d'un cendré jaunâtre. On le

Si hujus animalis figura, quam *Seba* dedit, magnitudinem naturalem adæquet, à capitis vertice ad anum usque, 9 circiter pollices longum est. Brachia habet & crura longa & gracilia; labium superius, ut in *Lepore*, fissum; ungues omnes planos & rotundatos, exceptis indicis pedum posteriorum unguibus, qui longi sunt, incurvi & acuti. Pilus ei mollis est, & quasi sericeus, ex nigro fuscus; per dorsum verò planè niger : brevior tamen, & ex cinereo dilutè flavus, qui ventrem, brachia, pedesque ves-

Digitized by Google

tit. Habitat in *Insulâ Ceylonensi.* trouve dans l'*Isle de Ceylan.*

STIRPS II. RACE II.

Ea quæ sunt ecaudatæ, rostro productiore. *Ceux qui n'ont point de queue, & qui ont le museau allongé.*

SIMIA CYNOCEPHALA. LE SINGE CYNOCÉPHALE.

** 1. LE SINGE CYNOCÉPHALE.

Simia Cynocephala unguibus omnibus planis & rotundatis. SIMIA CYNOCEPHALA.

Simia ecaudata, clunibus tuberosis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 1.*
Simius Cynocephalus alter. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 241. Fig. T. 16.* [*Fig. bona*].
Cynocephalus primus. *Jonst. Quadr. Fig. T. 59.* (*Fig. sat bona*).

In omnibus, excepto rostro rostri *canini* instar producto, cum *Simiâ* convenit. Plures vidi Simiarum cynocephalarum species magnitudine tantùm à se invicem discrepantes. Habitant in *Africâ.*

Il ne differe du *Singe* que par son museau allongé comme celui d'un *chien*: d'ailleurs il luy ressemble en tout. J'en ai vû plusieurs, qui ne differoient entr'eux que par la grandeur. On les trouve en *Afrique.*

** 2. LE SINGE CYNOCÉPHALE DE CEYLAN.

Simia Cynocephala unguibus Indicis longis, incurvis, & acutis... SIMIA CYNOCEPHALA CEYLONICA.

Simia ecaudata, unguibus Indicis subulatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 2.*
Simia rostro canino, capite elato. *Klein. Quadr. p. 86.*
Animalculum Cynocephalum, Ceylonicum, *Tardigradum* dictum, Simii species. *Seb. Vol. I. p. 55. Fig. T. 35. Mas F. 1. Fem. F. 2.* [*Fig. bonis*].

Minima est hæc species: secundùm enim figuram quam hujus *Seba* dedit, 7.

Il est très petit. Selon la figure qu'en a donné *Séba*, il n'a guéres plus de 7 pouces, du sommet

de la tête à l'anus. Ses oreilles sont rondes, larges, transparentes, sans poils, & d'un cendré clair; ses jambes longues, menuës & couvertes de peu de poils; tous ses ongles plats & arrondis, exceptés ceux de l'index de chaque pied, qui sont longs, recourbés & pointus. Les poils qui couvrent le corps, sont longs, comme laineux, doux comme de la soye, & d'un rousâtre plus foncé sur le dos, & plus clair sur le ventre dans le mâle; & au contraire plus clair sur le dos, & plus foncé sur le ventre dans la femelle. On le trouve dans *l'Isle de Ceylan.*

pollicum longitudinem, à capitis vertice ad anum usque, non multùm superat. Auriculas habet rotundas, latas, pellucidas, glabras, & dilutè cinereas; longa & gracilia crura, raris pilis obsita; ungues omnes planos & rotundatos, exceptis indicis singulorum pedum unguibus, qui longi sunt, incurvi, & acuti. Per universum corpus vestitur pilis longis, quasi laneis, & serici instar mollissimis, subrufis, saturatioribus in dorso, in ventre dilutioribus in mare; è contrà verò dilutioribus in dorso, & in ventre saturatioribus in fœminâ. Habitat in *Insulâ Ceylonensi.*

RACE III.

Ceux qui ont une queue très courte.

STIRPS III.

Eæ quæ caudam habent brevissimam.

LE BABOUIN.

PAPIO.

1. LE BABOUIN.

PAPIO.

Simia semicaudata, ore vibrissato, unguibus acutis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 5.*

Cebus Papio; Baboon; Hyæna Gesneri. *Klein. Quadr. p. 89.*

Papio. *Raj. Syn. Quadr. p. 158.*

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 76.

Jonst. Quadr. p. 100. Fig. T. 61. sub isto nomine, Papio primus.

Papio, seu Arctopithecus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 259. Fig. p. 260.*

Babio. *Charlet. Exer. p. 16.*

Babouin. *Kolbe. Tom. III. p. 55. Fig. p. 54. F. 2.*

Les Italiens l'appellent BABUINO. *Kolbe.*

Les Allemands, PAVVON. *Gesn. Aldro. Charlet.*

Les

Digitized by Google

Les Suédois, BABIAN. *Linn.*
Les Hollandois, BAVIAAN. *Kolbe.*
Les Anglois, BABOON. *Kolbe.*
Les Hottentots, CHOAKAMNA. *Kolbe.*

Canis Molossi magnitudinem circiter æquat. Illius instar, rostrum habet longum, in exitu obtusum. Cauda ipsius est admodùm brevis, eamque semper erectam gerit. Nates sunt omninò glabræ, & colore sanguineo tinctæ, tanquàm cute detractâ; crura brevia; ungues peracuti, & parumper lunati. Habitat in *India* solitudinibus.

Il est à peu-près de la grandeur d'un *Dogue*. Il a, comme luy, le museau allongé & obtus vers le bout. Sa queue est très courte: il la porte toujours élevée. Ses fesses sont tout à fait dénuées de poils, & de couleur de sang, comme si on les avoit écorchées. Ses jambes sont courtes; & ses ongles très aigus, & un peu recourbés. On le trouve dans les déserts de l'*Inde*.

STIRPS IV.

Ea quæ caudam habent longam, & rostrum breve.

RACE IV.

Ceux qui ont la queue longue, & le museau court.

CERCOPITHECUS.

LE CERCOPITHÉQUE.

** 1. LE SAPAJOU BRUN.

Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 13 est pollicum; caudæ $14\frac{1}{2}$ pollicum; ambitus corporis, circà pectus, $7\frac{1}{2}$ pollicum. Oculos habet fuscos; auriculas auriculis *humanis* similes. Caudam gerit spiraliter intortam, cujus ope firmiter adhæret rei quam apprehendit. Per universum corpus, excepto capitis vertice

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 13 pouces; celle de sa queue de $14\frac{1}{2}$ pouces; le tour de son corps, à la poitrine, de $7\frac{1}{2}$ pouces. Ses yeux sont bruns: ses oreilles ressemblent à celles de l'*homme*. Il porte sa queue roulée en spirale, au moyen de laquelle il s'attache fortement à ce qu'il peut joindre. Tout son corps est couvert

Digitized by Google

de poils bruns, plus foncés ſur le dos que ſous le ventre : le ſommet de ſa tête eſt noir : ſes jambes & ſa queue tendent à cette derniere couleur. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

nigro, veſtitur pilis fuſcis in dorſo ſaturatioribus, in ventre verò dilutioribus : cauda & crura ad nigredinem tendunt. Ex muſeo *Realmuriano*.

** 2. Le Sapajou noir.

Cercopithecus niger, pedibus fuſcis.

Cercopithecus, *Guariba* apud Braſilienſes dictus. *Jonſt. Quadr. p. 99. Fig. T. 61. ſub iſto nomine*, Cercopithecus Meer Katz. (*Fig. bona*).
Simia caudata, barbata, cauda prehenſili. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 2. ſp. 14.*
Cebus Guariba Marcgravii. *Klein. Quadr. p. 88.*
Guariba Braſilienſibus Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p. 153.*
Guariba Braſilienſibus, Cercopitheci ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 226.* [*Fig. bona*].

Il eſt à peu-près de la grandeur d'un *Renard*. Il a la face élevée; les yeux noirs, & pleins de feu; les oreilles courtes, & rondes; la queue longue, nuë vers ſon extrémité, & roulée en ſpirale, au moyen de laquelle il s'attache fortement à ce qu'il peut joindre. Tout ſon corps, exceptés la moitié extérieure de ſa queue & ſes pieds, qui ſont bruns, eſt couvert de poils longs, noirs, & brillants, mais ſi bien couchés les uns ſur les autres que l'animal paroît liſſe : ces poils ſont plus longs ſous la gorge & le menton, & luy font une eſpece de barbe ronde. On le trouve au *Bréſil*.

Vulpem noſtratem magnitudine circiter æquat. Faciem habet elatam; oculos nigros, ſplendentes; auriculas breves & ſubrotundas; caudam longam, versùs extremitatem nudam, quâ, ſpiraliter intortâ, firmiter adhæret rei quam apprehendit. Per univerſum corpus, exceptis dimidiâ caudâ exteriore & pedibus, qui fuſci ſunt, veſtitur pilis longis, nigris, ſplendentibus, atque ita ſibi incumbentibus ut animal lævè appareat, ſub gutture verò & mento longioribus, inque barbam rotundam deſinentibus. Habitat in *Braſiliâ*.

Digitized by Google

** 3. Le Sapajou cornu.

Cercopithecus ex nigro & fusco variegatus, fasciculis duobus pilorum capitis corniculorum æmulis.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 14 pollicum; caudæ 15 pollicum. Oculos habet fuscos, splendentes; auriculas auriculis *humanis* similes; ungues longos & obtusos. Duo sunt in capitis vertice pilorum fasciculæ, corniculorum æmula. Caudam habet pilis brevibus & splendentibus tectam, eamque semper gerit spiraliter intortam, cujus ope firmiter adhæret rei quam apprehendit. Facies, latera, venter, & crura anteriora pilis fuscis; capitis verò vertex, medium dorsi, cauda, crura posteriora, & pedes 4 pilis nigris vestiuntur. Ex museo *Realmuriano*.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 14 pouces; celle de sa queue de 15 pouces. Ses yeux sont bruns, & pleins de feu. Ses oreilles ressemblent à celles de l'*homme*. Il a sur la tête deux bouquets de poils, qui lui font comme deux especes de petites cornes. Ses ongles sont longs & obtus: sa queue est couverte de poils courts & brillants: il la porte toujours roulée en spirale, & s'attache fortement par son moyen à tout ce qu'il peut joindre. Les poils qui couvrent sa face, ses côtés, son ventre, & ses jambes de devant, sont bruns; ceux qui couvrent le dessus de la tête, le milieu du dos, la queue, les jambes de derriere, & les 4 pieds, sont noirs. Il est dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

** 4. Le Sapajou a queue de Renard.

Cercopithecus pilis nigris, apice albido, vestitus, cauda pilis longissimis nigris obsita.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 6 est pollicum; caudæ 10 pollicum. Ungues habet

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 6 pouces; & celle de sa queue de 10 pou-

Digitized by Google

ces. Il a les ongles longs & obtus, exceptés ceux des pouces, qui sont plus courts & arrondis. Les poils qui couvrent sa face, sont très courts & blanchâtres : ceux de sa queue sont très longs & noirs : tout son corps est couvert de poils longs, noirs & terminés par un bout blanchâtre : sa gorge & son ventre sont d'un blanc sale. On le trouve dans la *Guiane*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

longos & obtusos, unguibus tamen pollicum brevioribus & rotundatis. Pili brevissimi candicantes faciem obtegunt; longissimi verò sunt & omnino nigri, qui caudam cooperiunt : corpus pilis longis & nigris, in apice tantùm albidis; guttur autem & venter pilis sordidè albis vestiuntur. Habitat in *Guianâ*. Ex museo *Realmuriano*.

5. Le Petit Singe négre.

Cercopithecus totus niger.

Cercopithecus Brasiliamus secundus. *Clus. Exot. p.* 372.
Cay Brasilianis Tououpinamboutiis dictus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 153.
Caapud Touvoupinambutios. *Jonst. Quadr. p.* 100.

Il est très petit, & tout noir. On le trouve au *Brésil*.

Pusillus est, nigrique coloris. Habitat in *Brasiliâ*.

6. Le Singe de Guinée.

Cercopithecus pilis ex umbrâ, griseo, fusco & flavo variegatis vestitus.

Cercopithecus Guineensis tertius Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 157.
Cercopithecus Guineensis alius. *Marcgr. Hist. Br. p.* 228.
Cebus tertius Guineensis. *Klein. Quadr. p.* 89.

Il a la tête petite, & la queue longue. La couleur de son poil est mêlée d'ombre, de gris, de brun, & de jaune, & ressemble presque à celle du dos de notre *Lièvre*. On le trouve en *Guinée* & au *Brésil*.

Caput huic parvum est, & cauda longa. Pilorum color ex umbra, griseo, fusco, & flavo variegatus, ferè ut in dorso *Leporino*. Habitat in *Guineâ* & *Brasiliâ*.

7. Le Singe musqué.

Cercopithecus ex albido flavescens, moschum redolens.

Cercopithecus moschatus, Brasilienſibus *Caitaja* dictus *Jonſt. Quadr. p.* 100.
Cercopithecus Braſilianus primus. *Cluſ. Exot. p.* 371.
Cebus moſchum redolens, Braſilienſis: Caitaia. *Klein. Quadr. p.* 88.
Caitaja Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 155.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 227.

Caput habet ſubrotundum; frontem haud elatam, & penè nullam; naſum parvum, & compreſſum; caudam arcuatam. Per univerſum corpus veſtitur pilis longis, ex albido flaveſcentibus. Moſchum redolet. Habitat in *Braſilia*.

Il a la tête arrondie; le front très petit, & applati; le nez court, & camus; la queue courbée en arc. Tout ſon corps eſt couvert de poils longs, d'un blanc jaunâtre. Il répand une odeur de muſc. On le trouve au *Bréſil*.

** 8. Le Sapajou jaune.

Cercopithecus pilis ex fuſco, flaveſcente, & candicante variegatis veſtitus, pedibus ex flavo rufeſcentibus.

Cercopithecus minor luteus. *Bart. Hiſt. Fr. eq. p.* 151.
Cebus Simiolus Ceylonicus. *Klein. Quadr. p.* 88.
Simiolus Ceylonicus. *Seb. Vol. I. p.* 77. *Fig. T.* 48. *F.* 3. (*Fig. optima*).
Les François de la Guiane l'appellent Sapajou jaune. *Barr.*

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam uſque, 7 ½ pollicum eſt; caudæ unius pedis. Auriculas habet rotundas, pilis longis, ſordidè albis, veſtitas; ungues longos & obtuſos, excepris pollicum unguibus, qui breviores ſunt & rotundati. Pilus ei tenuiſſimus eſt & molliſſimus, in parte corporis in-

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt de 7 ½ pouces; & celle de ſa queue d'un pied. Il a les oreilles rondes, & couvertes de poils aſſez longs, & d'un blanc ſale: tous ſes ongles ſont longs & obtus, excepté ceux des pouces, qui ſont plus courts & arrondis. Son poil, qui eſt très fin, & très doux au tou-

Digitized by Google

cher, est blanchâtre dans la partie inférieure du corps, & mêlé de brun, de jaunâtre, & de blanchâtre dans la partie supérieure : ces couleurs sont plus foncées sur le dos qu'ailleurs. Ses 4 pieds sont d'un jaune roussâtre. Sa queue est de la même couleur que le dessus du corps dans toute sa longueur, excepté son bout, qui est noir. On le trouve à *Ceylan* & dans la *Guiane*.

On a envoyé de *Cayenne* à M. *de Reaumur* un Singe de cette espece, sous le nom de *Singe de nuit*.

feriore canditicas ; in superiore verò ex fusco, flavescente, & candicante variegatus : qui colores in dorso sunt saturatiores. Pedes 4 ex flavo rufescunt. Cauda, exceptâ extremitate nigrâ, ejusdem coloris est per totam longitudinem ac corpus superius. Habitat in Insulâ *Ceylonensi* & *Guianâ*.

A *Cayennâ* ad *Illustr. Dom. de Reaumur* hujus speciei Simia missa est sub nomine *Simiæ nocturnæ*.

** 9. Le Singe varié.

Cercopithecus pilis ex nigro & rufo variegatis vestitus, pedibus nigris, caudâ cinereâ.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 11 pouces ; & celle de sa queue est d'environ 15 pouces. Il a de chaque côté de la mâchoire inférieure une espece de bourse assez grande pour contenir une grosse noix. Ses oreilles sont rondes ; ses ongles longs & obtus, excepté ceux des pouces, qui sont plus courts & arrondis. Sa face est noire : les poils du dessus de la tête & du col sont mêlés de noir & de jaune : ceux des joues & des côtés du col, sont assez longs, blancs à leur origine, en-

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 11 est pollicum ; caudæ 15 circiter pollicum. In utroque latere maxillæ inferioris folliculum est crassi nucis juglandis continendæ aptatum. Auriculas habet rotundas ; ungues longos & obtusos, exceptis pollicum unguibus brevioribus & rotundatis. Facies ei est nigra : pili partem superiorem capitis & colli tegentes ex nigro & flavo variegati sunt ; qui verò genas & colli latera vestiunt, sat longi sunt, in exortu albi, & dein-

de ex nigro & flavo variegati : qui dorſum cooperiunt ex nigro & rufo variegantur. Propè caudæ exortum, utrinque parva macula eſt alba. Crurum anteriorum pars exterior, & pedes 4 nigreſcunt : crura poſteriora ex fuſco nigricant, paululùm flavo & rufo mixtis : corporis pars inferior, & crurum interior albicant : cauda cineraſcit. Ex muſeo *Realmuriano*.

ſuite mêlés de noir & de jaune : ceux du dos ſont mêlés de noir & de roux. De chaque côté, auprès de l'origine de la queue, eſt une petite tache blanche. L'extérieur des jambes de devant, & les 4 pieds ſont noirs : les jambes de derriere ſont d'un brun noirâtre, mêlé de très peu de jaune & de roux : le deſſous du corps & l'intérieur des jambes eſt blanc ; & la queue griſe. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

10. LE TAMARIN.

Cercopithecus pilis cineraſcentibus, nigro mixtis, veſtitus ; caudâ rufâ.

Cercopithecus minimus niger leontocephalus, auribus elephantinis. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 151.
Cagui major Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 154.
Jonſt. Quadr. p. 99. *Fig. T.* 60.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 227.
Les Congois l'appellent PONGI. *Raj. Jonſt. Marcgr.*
Les Guianois, TAMARIND. *Barr.*

Faciem habet ſubrotundam ; os nigrum ; oculos nigros ; auriculas ferè rotundas, nigras, & pilis nudas ; caudam 15 circiter pollices longam, pilis rufis obſitam. Totum corpus veſtitur pilis cineraſcentibus, cum pauco nigro admixto : frons verò pilis nigris, cum cinereo mixtis. Habitat in *Guianiâ* & *Braſiliâ*.

Il a la face arrondie ; le muſeau, & les yeux noirs ; les oreilles preſque rondes, noires & ſans poils ; la queue longue d'environ 15 pouces, & couverte de poils roux : ceux qui couvrent le corps, ſont aſſez longs, gris, & mêlés d'un peu de noir : ceux du front au contraire ſont noirs, mêlés de gris. On le trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

** 11. Le Petit Singe-Lion.

Cercopithecus ex albo flavicans, faciei circumferentia saturatè rufa.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 7 pouces; & celle de sa queue de 12 ½ pouces. Il a la tête ronde, couverte de longs poils, & assez semblable à celle d'un *Lion*; la face nuë, & brune; les yeux roux; les oreilles rondes, nuës, & cachées sous les poils de la tête; tous les ongles longs, crochus, & aigus, excepté ceux des pouces des pieds de derriere, qui sont larges, plats & arrondis. Tout son corps est couvert de poils longs, doux comme de la soye, d'un blanc jaunâtre, & luisants: ceux qui entourent sa face, sont d'un roux foncé, ceux de la poitrine d'un roux jaunâtre, & ceux de la queue d'un blanc jaunâtre. Les jambes de devant & les 4 pieds sont roux, avec un peu de noirâtre mêlé aux pieds de devant. On le trouve au *Brésil*, d'où il a été apporté en 1754 à *Madame la Marquise de Pompadour*, qui l'a actuellement vivant chez elle.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudæ exortum usque, 7 pollices æquat; caudæ 12 ½ pollices. Caput habet rotundum, longis pilis obsitum, capitis *Leonini* æmulum; faciem glabram & fuscam; oculos rufos; auriculas rotundas, nudas, subque capitis pilis occultatas; ungues omnes longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum posteriorum pedum latis, planis & rotundatis. Per universum corpus vestitur pilis longis, sericei instar mollissimis, ex albo flavicantibus, & splendentibus: qui faciem cingunt sunt saturatè rufi; qui pectus obtegunt, ex rufo flavicantes; qui verò caudam vestiunt, ex albo flavicantes. Crura anteriora, pedesque 4 sunt rufi, cum pauxillo nigricante in pedibus anticis mixto. Habitat in *Brasiliâ*, unde anno 1754 ad *Dom. de Pompadour* vivus advectus est.

** 12. Le

** 12. LE PETIT SINGE DE PARA,

Cercopithecus ex cinereo albus argenteus, facie auriculisque rubris splendentibus, caudâ castanei coloris.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 7 est pollicum; caudæ 12 ½ pollicum. Ungues habet longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum posteriorum pedum latis, planis, & rotundatis. Pilis longis, ferici instar mollissimis, ex cinereo albis, argenteis, in toto corpore vestitur: cauda verò tegitur pilis coloris castanei splendentis, ad nigredinem accedentis. Facies & auriculæ tinctæ sunt rubore ità splendente, ut naturalis non videatur. Habitat in *Brasiliâ*. Ex musèo *Realmuriano*.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 7 pouces; celle de sa queue de 12 ½ pouces. Ses ongles sont longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui sont larges, plats & arrondis. Tout son corps est couvert de poils longs, doux comme de la soye, d'un gris blanc argenté: ceux qui couvrent sa queue, sont d'un marron lustré, approchant du noir. Toute sa face & ses oreilles sont teintes d'un rouge si vif & si éclatant, qu'on a peine à croire qu'il soit naturel. On le trouve dans le *Brésil*, d'où il a été apporté à M. *de Reaumur*.

13. LE SINGE A QUEUE DE RAT.

Cercopithecus in dorso spadiceus, in ventre glaber; caudâ murinâ.

Cercopithecus Americanus minor, *Monkje* dictus. *Seb. Vol. I. p.* 52. *Fig. T.* 33. *F.* 1. (*Fig. bona*).
Cebus Caput mortuum vulgò. *Klein. Quadr. p.* 88.

Minima est hæc species. Nasum habet simum; oculos profundè intrà orbitas sitos; caput antrorsùm rotundum, atro spadiceis pilis, ad

Cette espece est très petite. Elle a le nez très court; les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites; la tête ronde en devant, & couverte, jusqu'à

Digitized by Google

la racine du nez, de poils d'un noir qui tire sur le rouge, un peu plus allongée en arriere, & couverte de poils noirâtres. Sa face est blanchâtre; le bout de son nez, & le tour de sa bouche sont noirs: beaucoup de rides contribuent à l'enlaidir. Ses oreilles sont dénuées de poils, assez grandes, & semblables à celles de l'*homme*: ses ongles sont courts & applatis: sa queue est longue, assez grosse, & ressemble à celle d'un *Rat*. Les poils qui couvrent le dos, sont d'un rouge moins foncé que celui de la tête. Depuis le menton jusqu'au ventre, & à la partie intérieure des cuisses, la peau est entierement chauve: la partie extérieure des cuisses, les pieds, & les reins sont couverts de très peu de poils, d'un jaune clair. On le trouve en *Amérique*.

nasi usque radicem, hispidum, retrorsùm verò magis elongatum, pilis nigricantibus obsitum. Facies albicat, exceptis nasi extremitate & oris ambitu, ubi nigrescit: rugæ plurimæ illam deformem faciunt. Auriculæ sunt glabræ, majusculæ, auriculis *humanis* similes; ungues breves & plani; cauda longa, crassiuscula, caudæ *Murinæ* æmula. Pili dorsum tegentes dilutiùs sunt spadicei, quam qui caput vestiunt. A mento, per ventrem usquè, perque internam femorum faciem, calva prorsùs est & nuda cutis: lumbos verò, externam femorum partem, & pedes rari obsident pili dilutè flavescentes. Habitat in *Americâ*.

** 14. LE SAGOUIN.

Cercopithecus tæniis transversis alternatim fuscis & è cinereo albis variegatus, auriculis pilis albis circumdatis.

Cercopithecus Sagouin Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 160.
Jonst. Quadr. p. 100. *Fig. T.* 74. [*Fig. bona*].
Eus. Nieremb. p. 179. *Fig. p.* 177. (*Fig. bona*).
Cercopithecus Brasilianus ternius. Sagouin. *Clus. Exot. Fig. p.* 372. (*Fig. bona*).
Simia caudata imberbis, unguibus pollicum subrotundis. *Linn. Syst. nat. ed.* 6. *g.* 2. *sp.* 8.
Cebus *Sagouin* dictus. *Klein. Quadr. p.* 87. *Fig. T.* 3. (*Fig. bona*).
Galeopithecus, Sagoin à Brasilienſibus nominatus. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p.* 96. (*Fig. mala*).
Sagouin. *Eus. Nieremb. p.* 179. *Fig. p.* 177. (*Fig. mala*).
Jo. de Laet. p. 553.

Digitized by Google

Cagui minor. *Raj. Syn. Quadr. p.* 154.
Marcgr. Hist. Br. Fig. p. 227. [*Fig. sat bona*].
Caitaia. *Jonst. Quadr. Fig. p.* 60. (*Fig. ut suprà*).

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 7 ½ pollicum; caudæ 11 pollicum. Auriculas habet subrotundas, longis pilis albis circumdatas; ungues omnes longos, incurvos, & acutos, exceptis unguibus pollicum posteriorum pedum brevioribus & rotundatis. Pili totum corpus tegentes, tenuissimi sunt & mollissimi: qui partem corporis superiorem cooperiunt, sunt in exortu fusci, deinde rufi, & tandem ex fusco & è cinereo albo variegati, itàque dispositi, ut dorsum tæniis transversis alternatim fuscis & è cinereo albis variegatum appareat: qui verò partem corporis inferiorem obtegunt, sunt tantùm ex fusco & cinereo albo variegati: guttur & caput pilis fuscis vestiuntur. Suprà nasum, inter oculos, macula inest alba. Cauda annulis alternatim ex fusco nigricantibus & è cinereo albis cingitur. Habitat in *Brasiliâ.*

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 7 ½ pouces; celle de sa queue de 11 pouces. Ses oreilles sont rondes, & entourées de longs poils blancs: tous ses ongles sont longs, crochus, & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui sont courts & arrondis. Tous ses poils sont très fins, & très doux au toucher: ceux du dessus du corps sont bruns à leur origine, ensuite roux, & enfin variés de brun & de gris blanc, de sorte que le dos paroît rayé transversalement de ces deux dernieres couleurs: ceux du dessous du corps, & des jambes sont de même variés de brun & de gris blanc: la tête & la gorge sont brunes. Au-dessus du nez, entre les deux yeux, est une tache blanche. La queue est annelée de brun noirâtre & de gris blanc. On le trouve au *Brésil.*

15. LE SINGE A QUEUE DE LION.

Cercopithecus ex flavo fuscus, caudâ in floccum desinente.

Cercopithecus non barbatus primus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 160. *Clus. Exot. p.* 371.

Digitized by Google

Simia caudata imberbis fusco flava, pectore gulâque albis, caudâ floccosâ. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 9.*
Cebus imberbis primus Clusii. *Klein. Quadr. p. 89.*

Tout son corps est couvert de poils d'une longueur médiocre, d'un jaune brun partout le corps, excepté à la gorge, & à la poitrine, où ils sont blancs. Sa queue est presque nuë dans toute sa longueur, excepté son extrêmité, qui se termine par un bouquet de longs poils.

Per universum corpus vestitur pilis mediocris longitudinis, ex flavo fuscis in toto corpore, exceptis gutture & pectore, in quibus albicant. Cauda non est valdè hirsuta, sed levis quodammodo; extremitas autem ejus in longiorum pilorum floccum desinit.

16. Le Singe-Lion.

Cercopithecus collo pectoreque jubatis.

Cercopithecus non barbatus secundus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p. 160. Clus. Exot. p. 371.*
Simia caudata imberbis, collo pectoreque jubatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 2. sp. 11.*
Cebus imberbis secundus Clusii. *Klein. Quadr. p. 89.*

Cette espece est aisée à distinguer des autres par les poils longs, & blanchâtres, qui couvrent son col & sa poitrine, & qui luy font une criniere semblable à celle du *Lion*: c'est pourquoi je luy en ai donné le nom. Son museau est tout à fait brun; & sa tête est couverte de poils blanchâtres.

Facilè ab aliis distinguitur hæc species longis pilis canescentibus, collum & pectus tegentibus, jubæ *Leoninæ* instar: undè nomen. Rostrum habet prorsùs fuscum; caputque canescentibus pilis tectum.

** 17. Le Singe verd.

Cercopithecus ex cinereo flavescens, genis longis pilis albis obsitis.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jus-

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usq;

que; 15 est pollicum; caudæ 14 pollicum. Auriculas habet parvas & rotundas; ungues breves & rotundatos; genas longis pilis albis obsitas. Pars superior capitis & dorsi pilis ex cinereo & flavescente variegatis; cauda, latera, & crurum pars exterior pilis cinereis; interior verò crurum, sicut & tota corporis pars infima, pilis albis vestiuntur. Ex museo *Realmuriano*.

qu'à la queue, est de 15 pouces; & celle de sa queue de 14 pouces. Il a les oreilles petites & rondes; les ongles courts & arrondis; ses joües sont couvertes de longs poils blancs: ceux qui couvrent le dessus de la tête & du dos, sont mêlez de gris & de jaunâtre: la queue, les côtés, & l'extérieur des jambes sont gris; & l'intérieur est blanc, ainsi que toute la partie inférieure du corps. Il est dans le Cabinet de M. *de Reaumur*.

** 18. LE GRAND SINGE DE LA COCHINCHINE.

Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flavicantibus obsitis, torque ex castaneo purpurascente.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 2 circiter pedum est; caudæ unius pedis cum 9 pollicibus. Auriculas habet auriculis *humanis* similes; ungues longos & obtusos, exceptis pollicum unguibus brevioribus & rotundatis. Torque donatur ex castaneo purpurascente: facies, postica crura, & pedes posteriores ejusdem sunt coloris. Genæ longis pilis ex albo flavicantibus, barbæque æmulis, obsitæ sunt. Capitis pars superior, corpus, & femora anteriora sunt cinerea: frons, scapularum superior pars, femora posteriora, & pedes antici nigri: cauda &

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 2 pieds; celle de sa queue est d'un pied 9 pouces. Ses oreilles ressemblent à celles de l'*homme*: ses ongles sont longs & obtus, excepté ceux des pouces; qui sont courts & arrondis. Il a un collier d'une couleur de marron pourpré: sa face, ses jambes, & ses pieds de derriere sont de la même couleur. Ses joües sont garnies de longs poils d'un blanc jaunâtre, qui luy font comme une espece de barbe. Le dessus de la tête, le corps, & les cuisses de devant sont grisés: le front, le dessus des épaules, les cuisses de derriere, & les

pieds de devant ſont noirs : la queue & les jambes de devant ſont blanches : à la partie poſtérieure du dos, au deſſus de l'origine de la queue, eſt une tache de la même couleur. On le trouve à la *Cochinchine*, d'où il a été envoyé à M. *de Reaumur*.

crura anteriora alba : inſuper ad poſticam dorſi partem, ſuprà caudæ exortum, macula eſt ejuſdem coloris. Habitat in *Cochinchinâ*. Ex muſeo *Realmuriano*.

19. Le Singe de Guinée a barbe jaunastre.

Cercopithecus nigricans, genis & auriculis longis pilis ex albo flavicantibus obſitis, ore cœruleſcente.

Cercopithecus barbatus alius Guineenſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 156. *Jonſt. Quadr. p.* 99. *Marcgr. Hiſt. Br. p.* 228.

Simia caudata, genubus auribuſque barbatis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 21. *ſp.* 12.

Cebus barbatus alius Guineenſis. *Klein. Quadr. p.* 89.

La couleur de ſes poils, dans la plus grande partie de ſon corps, eſt noirâtre, mêlée d'une couleur d'ombre : ſon ventre eſt d'un gris bleuâtre : ſa queue, depuis la moitié de ſa longueur juſqu'à ſon extrêmité, eſt d'un roux jaunâtre ; ſon muſeau bleuâtre. Ses joües & ſes oreilles ſont couvertes d'une grande quantité de longs poils, d'un blanc jaunâtre, qui luy font une eſpece de barbe. Ses jambes & ſes pieds ſont noirs. On le trouve en *Guinée* & au *Bréſil*.

Pilorum color, in maximâ parte corporis, eſt nigricans, cui umbra admixta ; in ventre autem è cinereo ſubcœruleſcens : cauda, à medietate ad extremitatem uſquè, ex rufo flavicans : os cœruleſcit. In genâ utrâque, uti & ad utramque auriculam, magnam copiam habet pilorum longiorum ex albo flavicantium, magnæ barbæ inſtar. Pedes & crura nigreſcunt. Habitat in *Guineâ* & *Braſiliâ*.

20. Le Singe rouge de Cayenne.

Cercopithecus barbatus ſaturatè ſpadiceus.

Cercopithecus barbatus maximus, ferrugineus, ſtertoroſus. *Barr. Hiſt. Fr. 19. p.* 150.

Digitized by Google

Les François de la Guiane l'appellent SINGE ROUGE. *Barr.*
Les Guianois, ALAOÜATA. *Barr.*

Maximus est, & coloris saturatè spadicei. Hyoïdis structuræ singularis ope clamorem maximum edit. Habitat in *Guianâ*.

Il est fort gros. Sa couleur est d'un rouge-bay foncé. Il fait en criant un bruit effroyable par le moyen de l'os hyoïde, qui est d'une structure singuliere. On le trouve dans la *Guiane*.

21. LE SINGE BLANC A BARBE NOIRE.

Cercopithecus barbatus albus, barbâ nigrâ.

Simia alba, seu incanis pilis, barba nigra promissa. *Raj. Syn. Quadr. p.* 158.
Cebus Elaurandus Zeylanensium. *Klein. Quadr. p.* 89.
Les Zeyloniens l'appellent ELEWANDUM. *Raj.*

Pilis vestitur albis, barbaque nigra promissa gaudet. Habitat in *Insulâ Zeylonensi*.

Il est tout blanc, excepté sa barbe, qui est noire & longue. On le trouve dans l'*Isle de Zeyla*.

22. LE SINGE NOIR A BARBE BLANCHE.

Cercopithecus barbatus niger, barbâ incanâ.

Cercopithecus niger barbâ incanâ promissâ. *Raj. Syn. Quadr. p.* 158. *Klein. Quadr. p.* 89.
Les Zeyloniens l'appellent WANDURU. *Raj. Klein.*

Pilis vestitur nigris, barbâque incanâ promissâ datur. Habitat in *Insulâ Zeylonensi*.

Il est tout noir, excepté sa barbe, qui est blanche & longue. On le trouve dans l'*Isle de Zeyla*.

23. LE SINGE DE GUINÉE A BARBE BLANCHE.

Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis insperſis, barbâ albâ.

Cercopithecus barbatus Guineensis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 156. *Jonst. Quadr. p.* 99. *Fig. T.* 60. *Marcgr. Hist. Br. p.* 227. *Fig. p.* 228.

Cebus barbatus. Exquima Guineenſis. *Klein. Quadr. p.* 89.
Les Congois l'appellent EXQUIMA. *Raj. Jonſt. Marcgr.*

Ses poils ſont bruns, picqués de petits points blancs : ceux du dos cependant ſont d'une couleur plus obſcure, ou comme d'une couleur de fer. La partie inférieure de ſon menton & ſon ventre ſont blancs : il a auſſi une barbe d'un beau blanc, compoſée de poils de 2 ou 3 doigts de long. On le trouve en *Guinée* & au *Bréſil*.

Pilos habet fuſcos ; ſed per totum dorſum quaſi aduſtos ſeu ferrugineos : fuſcis autem pilis punctulatim inſperſus eſt color albus. Venter albicat, & mentum inferius : barbam quoque egregiè albam habet, pilis 2 aut 3 digitos longis conflatam. Habitat in *Guineâ*, & *Braſiliâ*.

24. LE SINGE BARBU

Cercopithecus barbatus, ex nigro & fuſco mixtus, pectore & anteriore ventris parte albis, barbâ incanâ mucronatâ.

Cercopithecus barbatus ſecundus Cluſii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 159. *Cluſ. Exot. p.* 371.
Simia caudata barbata, barbâ canâ, caudâ ſimplici. *Linn. Syſt. nat. ed.* 6. *g.* 2. *ſp.* 16.
Cebus barbatus ſecundus Cluſii. *Klein. Quadr. p.* 89.

Tout ſon corps, excepté ſa poitrine & la partie antérieure de ſon ventre, dont les poils ſont blancs, eſt couvert de poils noirs, mêlés de brun, courts, très liſſes, & très brillants. Il a au menton une barbe blanche, longue d'environ 6 pouces, & qui ſe termine en pointe. Sa queue eſt ſemblable à celle des *Cercopithéques* ordinaires.

Per univerſum corpus, exceptis pectore & ventris parte anteriore albis, veſtitur pilis nigris, fuſco admixto, brevibus, valdè terſis, & nitidis. E mento propendet barba incana, 6 circiter pollices longa, & in mucronem deſinens. Cauda ei ſimilis eſt formæ cum *Cercopithecorum* vulgarium caudis.

25. LE

25. Le Singe barbu a queue de Lion.

Cercopithecus barbatus, suprà ex nigro & fusco mixtus, infrà albus, barbâ incanâ mucronatâ, caudâ in floccum desinente.

Cercopithecus barbatus primus Clusii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 159. *Clus. Exot. Fig. p.* 371. (*Fig. bona*).
Cercopithecus barbatus Clusii. *Jonst. Quadr. p.* 99. *Fig. T.* 74. (*Fig. bona*). *Eus. Nieremb. Fig. p.* 177. (*Fig. bona*).
Simia caudata barbata, cauda floccosa. *Linn. syst. nat. ed.* 6. *g.* 2. *sp.* 15.
Cebus barbatus primus Clusii. *Klein. Quadr. p.* 89.

Magnitudine *Cercopithecos* vulgares majores æquat. Auriculas habet non magnas; nares simas; ungues unguibus *humanis* ferè similes; caudam valdè longam, satisque crassam, cujus extremitas in longiorum pilorum floccum desinit, *Leoninæ* caudæ instar. Superior corporis pars tota nigris pilis tecta est, fusco admixto; inferior verò longioribus pilis albis obsita. E mento propendet barba incana, 9 pollices longa, in mucronem desinens.

Il est de la grandeur des grands *Cercopithéques* ordinaires. Il a les oreilles petites; le nez camus; les ongles presque semblables à ceux de l'*homme*; la queue très longue, assez grosse, & terminée par un bouquet de longs poils, comme celle d'un *Lion*. Toute la partie supérieure de son corps est couverte de poils noirs, mêlés de bruns; & la partie inférieure de longs poils blancs. Il a au menton une barbe blanche, longue de 9 pouces, & qui se termine en pointe.

26. Le Singe noir d'Egypte.

Cercopithecus barbatus, niger, cæsarie prolixâ nigrâ faciem cingente.

Simia caudata, cæsarie prolixâ faciem cingente. *Linn. syst. nat. ed.* 6. *g.* 2. *sp.* 13.
Simia callitrix magnitudine magnorum Cynocephalorum. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p.* 244. *Fig. T.* 21. (*Fig. bona*).

Magnos *Cynocephalos* magnitudine æmulatur. Per uni-

Il est de la grandeur des grands *Cynocéphales*. Il est noir par tout

Digitized by Google

le corps, & surtout à sa face, qui est toute entourée de longs poils noirs. On le trouve en *Egypte*.

versum corpus est niger, præsertim in facie, quæ undequaque cæsarie prolixâ nigrorum pilorum circumdatur. Habitat in *Ægyptô*.

27. Le Singe roux d'Egypte.

Cercopithecus barbatus, rufus, facie nigrâ, cæsarie albâ cinctâ.

Simius callitrix. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. II. p. 144. Fig. T. 20. F. 4.*

Il est de la grandeur d'un grand *Chat*. Il a la tête petite & ronde; la face semblable au visage de l'*homme*; le corps très éffilé vers les flancs; la queue longue & rousse. Tout son corps est couvert de poils roux: sa face est noire & entourée de tous côtés d'une chevelure blanche; ce qui luy donne l'air d'un vieillard. On le trouve en *Egypte*.

Felem magnam quadamtenùs magnitudine æmulatur. Caput habet parvum & rotundum; faciem vultui *humano* similem; corpus circà ilia gracillimum; caudam longam & rutilam. Per universum corpus vestitur pilis rufis: facies ei est nigra, undique cæsarie albâ cincta; undè faciem senilem habere videtur. Habitat in *Ægyptô*.

** 28. Le petit Singe du Mexique.

Cercopithecus pilis ex fusco & rufo vestitus, facie ultrà auriculas usque nigrâ & nudâ, vertice longis pilis albis obsito.

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 7 pouces; & celle de sa queue d'environ 1 pied. Ses oreilles ressemblent à celles de l'*homme*: ses ongles sont longs, crochus & aigus, exceptés ceux des pouces des pieds de derriere, qui sont

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 7 circiter est pollicum; caudæ 1. circiter pedis. Auriculas habet auriculis *humanis* similes; ungues longos, incurvos & acutos, exceptis pollicum pedum posteriorum unguibus latis, planis & ro-

tundatis. Facies ei est nigra & nuda ultrà auriculas usque: vertex capitis longis pilis albis obsitum est. Corporis pars superior vestitur pilis ex fusco & ruso variegatis, ferè ut in dorso *Leporino*; corporis verò inferior pars & pedes 4 pilis candicantibus teguntur. Cauda, ab exortu ad medietatem usque, pilis rufis, à medietate ad apicem, pilis nigris vestitur. Habitat in *Mexicô*, undè à *R. P. Bernard Franciscano* vivus advectus est.

larges, plats & arrondis. Sa face est noire, & dénuée de poils jusqu'audelà des oreilles : & le sommet de sa tête est couvert de longs poils blancs. Tout le dessus de son corps est couvert de poils variés de brun & de roux, à peu-près comme le dos de nos *Liévres ordinaires* : ceux qui couvrent le dessous du corps & les 4 pieds sont blanchâtres. Sa queue, depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, est rousse : le reste est noir. On le trouve au *Méxique*, d'où le *R. P. Bernard Cordelier* l'a apporté vivant.

** 29. Le Belzébut.

Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, caudâ inferiùs versùs apicem pilis destitutâ... Belzebut.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudæ exortum, 15 pollices æquat; caudæ 2 pedes; crurum anteriorum, ab eorum exortu ad unguium apicem, unum pedem & 6 pollices : crura posteriora paris sunt longitudinis. Ambitus corporis, circà pectus mensuratus, quâ parte crassius est, 1 pedem & 6 lineas attingit. Auriculas habet auriculis *humanis* similes, & nigras. Facies, caput, pars dorsi anterior, partes exteriores femorum anteriorum, femorum & crurum posterio-

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'origine de la queue, est de 15 pouces; celle de sa queue de 2 pieds; celle de ses jambes de devant, depuis leur origine jusqu'au bout des ongles, de 1 pied 6 pouces; & celle de ses jambes de derriere aussi de 1 pied 6 pouces. Le tour de son corps, mesuré à la poitrine, où il est le plus gros, est de 1 pied 6 lignes. Ses oreilles ressemblent à celles de l'*homme*, & sont noires. Sa face, sa tête, la partie antérieure du dos, les parties extérieures des cuisses de de-

vant, & des cuisses & des jambes de derriere, ses jambes de devant, ses quatre pieds, & sa queue sont noirs : la partie postérieure du dos est d'un brun noir : ses côtés sont roux : toute la partie inférieure du corps, sçavoir la gorge, la poitrine, le ventre, les parties intérieures des cuisses de devant, & des cuisses & des jambes de derriere sont d'un blanc sale & jaunâtre. Il a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere : c'est le pouce qui manque à ceux de devant. Sa queue se termine en pointe, & est couverte de poils dans toute sa longueur, excepté sa partie inférieure, depuis son bout jusqu'au tiers de sa longueur, qui est couverte d'une peau sillonée, pareille à celle de la plante des pieds : aussi cette queue luy sert comme d'une cinquiéme jambe : elle fait l'office de main, & luy sert pour porter la nourriture à sa bouche. Il est dans le cabinet de M. *de Reaumur*.

Je lui ai laissé le nom de *Belzébut*, qui est celui sous lequel il a paru à Paris aux yeux du Public.

rum, crura anteriora, cauda; & pedes quatuor nigri sunt : pars dorsi posterior est ex fusco nigra : latera rufescunt : corporis inferior pars tota, guttur scilicet, pectus, venter, partes interiores femorum anteriorum, femorum & crurum posteriorum ex fordidè albo flavicant. 4 habet in pedibus anterioribus digitos, in posterioribus verò 5; pollice autem in pedibus anterioribus destituitur. Cauda in acumen desinit, pilisque vestitur per totam longitudinem, exceptâ parte inferiore ab apice ad tertiam longitudinis partem, quæ cute sulcatâ, cutis plantæ pedum æmulâ, tegitur; quamobrem caudâ sua, sicut quinto pede utitur : manuum enim officium præstat, & hujus ope cibum ori admovet. Ex museo *Realmuriano*.

Illum *Belzebut* nomine donavi, sub quo Parisiis in Publicum editus est.

STIRPS V.

Ea quæ caudam habent longam, & rostrum productius.

CERCOPITHECUS. CYNOCEPHALUS.

RACE V.

Ceux qui ont la queue longue, & le museau allongé.

LE CERCOPITHÉQUE. CYNOCÉPHALE.

** 1. LE CERCOPITHÉQUE CYNOCÉPHALE.

Cercopithecus Cynocephalus ex virideſcentibus & flavicantibus pilis variegatus.

Cercopithecus. *Jonſt. Quadr. Fig. T.* 59. (*Fig. bonâ*).

In omnibus, exceptis caudâ, quâ donatur, & roſtro, roſtri *Canini* inſtar, producto, cum *Simiâ* convenit. Plurimas vidi Cercopithecorum Cynocephalorum ſpecies magnitudine tantùm à ſe invicem diſcrepantes. Habitant in *Africâ*.

Il ne differe du *Singe* que parce qu'il a une queue, & par ſon muſeau allongé comme celui d'un *Chien*: d'ailleurs il luy reſſemble en tout. J'en-ai vû pluſieurs, qui ne differoient entr'eux que par la grandeur. On les trouve en *Afrique*.

2. LE MAKAQUE.

Cercopithecus Cynocephalus naribus bifidis, elatis, natibus calvis.

Cercopithecus Angolenſis major, Congenſibus Macaquo, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 155.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 227.
Cercopithecus Angolenſis major, Marcgravii. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 149.
Simia caudata imberbis, naribus elatis, bifidis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 29. ſp.* 10.
Cebus Angolenſis major, Macaquo Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 89.
Macaquo Congenſium. *Jonſt. Quadr. p.* 100.
Les François de la Guiane l'appellent MAKAQUE. *Barr.*

Corporis longitudo, à capite ad caudam uſque, unius pedis eſt & ampliùs; capitis

La longueur de ſon corps, depuis la tête juſqu'à la queue, eſt de plus d'un pied; celle de

ſa tête de 6 doigts ; celle de ſa queue d'un pied. Ses 4 jambes ſont d'une longueur égale, ſçavoir de 10 doigts chacune. Ses pieds de devant ſont longs de 3 ½ doigts, & ceux de derriere de 5 doigts. Le tour de ſon corps, dans l'endroit où il eſt le plus gros, eſt d'un pied 9 pouces. Il a les narines fenduës en deux, & élevées ; les feſſes chauves. Il porte toujours ſa queue courbée en arc. La couleur des poils de tout ſon corps eſt la même que celle d'un *Loup*. On le trouve dans le Royaume d'*Angola*, & dans la *Guiane*.

6 digitorum ; caudæ unius pedis. Crura 4 æqualis ſunt longitudinis, 10 digitorum ſingula. Pedes anteriores 3 ½ digitos, poſteriores verò 5 longi ſunt. Ambitus corporis maximus unum pedem & 9 digitos æquat. Nares habet biſidas & elatas ; nates calvas. Caudam ſemper geſtat arcuatam. Color pilorum totius corporis colori *Lupi* ſimillimus. Habitat in Regno *Angolenſi*, & *Guianâ*.

** 3. Le Magot, ou Tartarin.

Cercopithecus Cynocephalus parte corporis anteriore longis pilis obſitâ, naſo violaceo nudo.

Cynocephalus. *Geſn. Icon. Quadr. p.* 92. *Fig. p.* 93. *(Fig. bona)*.
Jonſt. Quadr. p. 100. *Fig. T.* 59. *ſub iſto nomine*, Cynocephalus ſecundus. *(Fig. bona)*.
Cluſ. Exot. Fig. p. 370. *(Fig. bona)*.
Maimon quorumdam. *Geſn.*

Il eſt environ de la grandeur d'un *Dogue*. Il a à peu-près la forme des *Cercopithéques* ordinaires ; mais il a le corps plus épais & plus fort. Tous ſes poils ſont d'un gris blanchâtre : ceux qui couvrent la partie antérieure du corps, ſont très longs ; les autres ſont courts. Son nez eſt fort gros, dénué de poils, cannelé ſelon ſa longueur, & d'une

Canem Moloſſum magnitudine circiter æquat. Ejuſdem ferè formæ eſt cujus *Cercopithecus* vulgaris ; at in corporaturâ craſſior & validior. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex cinereo albidis, in parte corporis anteriore longiſſimis, in reliquo corpore brevioribus. Naſum habet craſſiſſimum, pilis nudum,

Digitized by Google

longitudinaliter ſtriatum, & violacei coloris. Habitat in *Aſiâ* & *Africâ*.

couleur violette. On le trouve en *Aſie* & en *Afrique*.

SECTIO II.

Ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur.

UNICO Genere, ſcilicet *Pteropi*, conſtituitur hæc Sectio.

XXX.

Genus Pteropi. (Fig. 4.):

Hujus character eſt

Dentes inciſores in utrâque maxillâ quatuor (Fig. 2, 2, 2, 2.):

Digiti unguiculati,

In anterioribus pedibus membranâ, in alas expansâ, inter ſe connexi, in poſterioribus à ſe invicem ſeparati.

Obſ. 1°. Primo inſpectu, *Pteropus veſpertilionis* Generis eſſe videtur: ſicut ille, pedes habet anteriores in alas expanſos: ab eo tamen differt dentium inciſorum (*Fig.* 4 *a*, *a*.) numero & figura, & roſtro multò productiore quàm *veſpertilionis* roſtrum.

Obſ. 2°. Omnes hujus Generis ſpecies anterioribus crutibus donantur longiſſimis, quorum pedes dividuntur in 5 digitos longos,

SECTION II.

Ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étendue en aîles.

CETTE Section ne contient qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de *la Rouſſette*.

XXX.

Le Genre de la Rouſſette. (Fig. 4.)

Son caractere eſt

D'avoir quatre dents inciſives à chaque mâchoire (Fig. 4. 2, 2, 2, 2.):

Les doigts onguiculés,

Joints enſemble par une membrane étendue en aîles dans les pieds de devant, & ſeparés les uns des autres dans ceux de derriere.

Obſ. 1°. Au premier coup d'œil, la *Rouſſette* ſemble être du Genre de la *Chauve-Souris*: comme elle, elle a les pieds de devant étendus en aîles: mais elle en differe par le nombre & la figure de ſes dents inciſives (*Fig.* 4. *a*, *a*.), & par la forme de ſon muſeau, qui eſt beaucoup plus allongé que celui de la *Chauve-Souris*.

Obſ. 2°. Toutes les eſpeces de cet Genre ont les jambes de devant très longues, dont le pied eſt diviſé en 5 doigts longs, & tous (excepté le

pouce qui eſt ſéparé des autres, & armé d'un ongle fort & crochu) joints enſemble par une membrane, qui n'eſt autre choſe qu'une continuation de la peau du dos, qui s'étend de chaque côté, depuis le col juſqu'à l'anus, tout le long des jambes, & juſqu'au bout des doigts des pieds de devant: c'eſt par le moyen de cette membrane qu'elles peuvent voler. Les pieds de derriere ſont diviſez en 5 doigts armez d'ongles crochus & très pointus.

omnes (excepto pollice ab aliis ſeparato, incurvoque & valido ungue munito) membranâ inter ſe connexos; quæ membrana nihil aliud eſt quam dorſi cutis continuata, in utroque latere, à collo ad anum uſque, & ſecundùm crurum longitudinem, ad digitorum pedum anteriorum apicem extenſâ, cujus ope volitant. Pedes poſtici in 5 digitos incurvis & acutiſſimis unguibus munitos ſunt diviſi.

** 1. La Rousſette.

Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiuſculis.

Veſpertilio caudâ nullâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 14. ſp. 1.*
Veſpertilio Cynocephalus Ternatanus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Veſpertilio Borſippæ. *Geſn. avi. p. 772.*
Veſpertilio ingens. *Cluſ. Exot. p. 94.*
Canis volans Ternatanus Orientalis. *Seb. Vol. I. p. 91. Fig. T. 57. Mas F. 2. Fœm. F. 1.* [*Fig. optimis*].

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'anus, eſt de 7 ½ pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du nez, de 2 pouces 9 lignes. Ses oreilles ſont courtes, & un peu pointues. Elle n'a point de queue. Lorſque la membrane, qui luy ſert à voler, eſt étendue, elle a plus de 3 pieds de long d'un bout à l'autre; elle eſt couverte de très peu de poils: ceux qui couvrent le corps, ſont dans quelques individus d'un roux plus foncé ſur le dos que ſur le ventre, & dans d'autres ils ſont noirs: la partie antérieure de la

Corporis longitudo, à capitis vertice ad anum uſque, 7 ½ pollicum eſt; capitis, à vertice ad naſi extremitatem, 2 pollicum cum 9 lineis. Auriculas habet breves & acutiuſculas. Caudâ caret. Membrana volatui inſerviens extenſa, ab unâ extremitate ad aliam trium pedum longitudinem ſuperat, rariſſimiſque pilis tegitur. Pili corpus tegentes in quibuſdam individuis ſunt rufi, faturatiores in dorſo, in ventre dilutiores; in aliis verò nigri: capitis partem anteriorem & roſtrum veſtiunt pili rufi. Habitat in

Borbonid,

Borboniâ, & *Ternatanâ* Insulis.

tête & le museau sont couverts de poils roux. On la trouve dans les Isles de *Bourbon*, & *Ternate*.

** 2. LA ROUSSETTE A COL ROUGE.

Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiusculis, collo superiore rubro.

Corporis longitudo, à capitis vertice ad anum usquè, 5 ½ pollicum; capitis, à vertice ad nasi extremitatem, 1 ¼ pollicis. Auriculas habet breves & acutiusculas. Caudâ caret. Membrana volatui inserviens, extensa, ab unâ extremitate ad aliam 2 circiter pedes longa est. Per totum corpus vestitur pilis fuscis, exceptâ parte colli superiore, quam pili rubri cooperiunt. Habitat in *Borboniâ* Insulâ. Ex museo *Realmuriano*.

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à l'anus, est de 5 ½ pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du nez, de 1 ¼ pouces. Ses oreilles sont courtes & un peu pointuës. Elle n'a point de queue. Lorsque la membrane, qui luy sert à voler, est étenduë, elle a environ 2 pieds de long d'un bout à l'autre. Tout son corps est couvert de poils bruns, excepté la partie supérieure du col, qui est couverte de poils rouges. On la trouve dans l'Isle de *Bourbon*, d'où elle a été enyoyée à M. *de Reaumur*.

3. LA ROUSSETTE A LONGUES OREILLES.

Pteropus auriculis longis, patulis, naso membranâ antrorsùm inflexâ aucto.

Vespertilio Cynocephalus maximus, auritus, ex novâ Hispaniâ. *Klein. Quadr. p.* 62.

Canis volans maximus, auritus, ex Novâ Hispaniâ. *Seb. Vol. I. p.* 92. *Fig. T.* 58. *F.* 1. (*Fig. bona*).

A præcedentibus differt auriculis suis longis, patulis &

Elle differe des précédentes par ses oreilles, qui sont lon-

gues, ouvertes, & redreſſées; & par ſon nez, audeſſus duquel eſt une eſpece de membrane recourbée en avant, comme une corne. On la trouve dans la *Nouvelle Eſpagne*.

arrectis; & naſo, ſuprà quem extat membrana quædam antrorſùm inflexa, & cornu ſimilis. Habitat in *Novâ Hiſpaniâ*.

Digitized by Google

ORDO XIV.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore quatuor, in inferiore ſex; & digitis unguiculatis prædita.

HUJUS Ordinis QUADRUPEDUM, ſicut in Ordine præcedente, alia ſunt quorum digiti omnes à ſe invicem omninò ſunt ſeparati; alia quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur. In duas Sectiones dividuntur: prima continet ea quorum digiti omnes à ſe invicem ſeparati ſunt, ſicut *Proſimia*: ſecunda ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter ſe connectuntur, ſicut *Veſpertilio*.

ORDRE XIV.

LES QUADRUPEDES

Qui ont quatre dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & ſix à l'inférieure; & les doigts onguiculez.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre, comme dans l'Ordre précédent, les uns ont tous les doigts ſéparez les uns des autres; les autres ont ceux des pieds de devant joints enſemble par une membrane étenduë en aîles. Ils ſe diviſent de même en deux Sections: dans la premiere ſont ceux qui ont tous les doigts ſéparez les uns des autres, comme le *Maki*: dans la ſeconde ſont ceux dont les doigts des pieds de devant ſont joints enſemble par une membrane étenduë en aîles, comme la *Chauve-Souris*.

SECTIO I.

Ea quorum digiti omnes à ſe invicem ſeparati ſunt.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, ſcilicet *Proſimiæ*.

SECTION I.

Ceux dont tous les doigts ſont ſeparés les uns des autres.

IL n'y a dans cette Section qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Maki*.

Digitized by Google

XXXI.

Le Genre du Maki.

(Fig. 5.)

Son caractere eſt
D'avoir quatre dents inciſives à la mâchoire ſupérieure (Fig. 5. a.), & ſix à l'inférieure (Fig. 5. b.):
A chaque pied cinq doigts onguiculés,
Tous ſéparés les uns des autres :
Le pouce bien diſtinct.

Obſ. 1°. Toutes les eſpeces de ce Genre ont les dents inciſives de la mâchoire ſupérieure (*Fig.* 5. *a*, *a.*) ſéparées par paires & convergentes ; celles de la mâchoire inférieure (*Fig.* 5. *b.*) ſont très étroites, toutes contiguës, couchées obliquement, & avancent en avant. Elles ont 12 dents canines, ſçavoir trois de chaque coté à chaque mâchoire (*Fig.* 5. *c.*), leſquelles ſont larges, plattes, & ſe terminent en pointe ; & quatre dents molaires de chaque côté à la mâchoire ſupérieure, & 3 de chaque côté à l'inférieure ; en tout 36 dents.

Obſ. 2°. Leurs ongles ſont larges, plats, & terminez par une pointe obtuſe, excepté celui de l'index des pieds de derriere, qui eſt plus étroit & plus long. Leurs pieds de devant ſont l'office de mains.

XXXI.

Genus Proſimiæ.

(Fig. 5.).

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore quatuor (Fig. 5. a.), in inferiore ſex (Fig. 5. b.):
In ſingulis pedibus digiti quinque unguiculati,
Omnes à ſe invicem ſeparati :
Pollex diſtinctus.

Obſ. 1°. Omnium hujus Generis ſpecierum dentes inciſores in maxillâ ſuperiore (*Fig.* 5. *a*, *a.*) ſunt per paria remoti & convergentes ; in inferiore (*Fig.* 5. *b.*) verò ſtrictiores, contigui, obliquè inclinati, & prominentes : canini ſunt duodecim, tres utrinque (*Fig.* 5. *c.*) in utrâque maxillâ, lati, plani, & in acumen deſinentes ; molares 4 utrinque in maxillâ ſuperiore, tres utrinque in inferiore ; ſumma dentium 36.

Obſ. 2°. Ungues habent latos, planos, in acumen obtuſum deſinentes, excepto ungue indicis poſteriorum pedum ſtrictiore, & longiore. Pedibus anterioribus pro manibus utuntur.

** 1. Le Maki.

Proſimia fuſca.

Simia Sciurus lanuginoſus fuſcus, &c. *Gaz. Pet. Fig. T.* 17. *F.* 5. (*Fig. optima*).

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 11 pollicum; capitis, à vertice ad rostri extremitatem, 3 pollicum; caudæ unius pedis cum 4 ½ pollicibus. Rostrum habet elongatum & acutum; auriculas breves, inque pilis ferè occultatas. Per universum corpus vestitur pilis mollibus, & quasi laneis, fuscis in toto corpore, exceptis naso, gutture, & ventre sordidè albis: in posteriore dorsi parte fuscus paululùm ad rufum tendit. Habitat in *Madagascarid.*

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est de 11 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du museau, de 3 pouces; celle de sa queue d'un pied 4 ½ pouces. Son museau est allongé & pointu: ses oreilles sont courtes, & presque cachées dans ses poils. Tout son corps est couvert de poils doux & laineux, bruns par tout le corps, exceptés le nez, la gorge, & le ventre, qui sont d'un blanc sale: le brun tend un peu au roux vers la partie postérieure du dos. On le trouve à *Madagascar.*

** 2. Le Maki aux pieds blancs.

Prosimia fusca, naso, gutture, & pedibus albis.

Magnitudine præcedentem adæquat. Sicut ille, breves habet auriculas, & in pilis ferè occultas; & rostrum elongatum & acutum. Pilis mollibus, & quasi laneis, in toto corpore fuscis, exceptis naso, gutture & pedibus albis, & ventre sordidè albo, vestitur. Ex museo *Realmuriano.* Habitat in *Madagascarid.*

Il est de la grandeur du précédent. Il a, comme luy, les oreilles courtes, & cachées dans ses poils; & le museau allongé & pointu. Tout son corps est couvert de poils doux & laineux, bruns par tout le corps, exceptés le nez, la gorge, & les 4 pieds, qui sont blancs, & le ventre qui est d'un blanc sale. Il est dans le Cabinet de M. *de Reaumur.* On le trouve à *Madagascar.*

** 3. Le Maki aux pieds fauves.

Prosimia fusca, rufo admixto, facie nigrâ, pedibus fulvis.

Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque,

La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à

la queue, eſt de 13 ou 14 pouces; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du muſeau, de 3 pouces 3 lignes; & celle de ſa queue d'un pied 5 pouces. Son muſeau eſt allongé & pointu : ſes yeux ſont d'un jaune roux : ſes oreilles ſont longues de 10 lignes, & larges d'environ 1 pouce. Tout ſon corps eſt couvert de poils doux & laineux, bruns pardeſſus le corps, & à la partie extérieure des jambes, & d'un blanc ſale & jaunâtre pardeſſous le corps, & à la partie intérieure des jambes. Sa face & ſon muſeau ſont noirs ; ſes 4 pieds fauves : les poils qui couvrent le dos, ſont mêlés d'un peu de rouſsâtre. Il eſt dans le cabinet de M. *de Reaumur*. On le trouve à *Madagaſcar*.

13 eſt aut 14 pollicum ; capitis, à vertice ad roſtri extremitatem, 3 pollicum cum 3 lineis ; caudæ unius pedis cum 5 pollicibus. Roſtrum habet elongatum & acutum ; oculos ex flavo rufos; auriculas 10 lineas longas, & uno pollice latas. Per univerſum corpus veſtitur pilis mollibus, & quaſi laneis, in partibus corporis ſuperiore, & crurum exteriore fuſcis, & in partibus corporis inferiore, & crurum interiore ex ſordidè albo flavicantibus. Facies & roſtrum nigreſcunt : pedes 4 ſunt fulvi : pilis fuſcis dorſum tegentibus aliquid rufi admixtum eſt. Ex muſeo *Realmuriano*. Habitat in *Madagaſcariâ*.

** 4. Le Maki a queue annellée.

Proſimia çinerea, caudâ çinctâ annullis alternatim albis & nigris.

La longueur de ſon corps, depuis le ſommet de la tête juſqu'à la queue, eſt d'environ 1 pied; celle de ſa tête, depuis ſon ſommet juſqu'au bout du muſeau, de 3 pouces; celle de ſa queue d'environ 1 $\frac{1}{2}$ pied. Son muſeau eſt blanchâtre & pointu : ſes oreilles ſont longues de 10 lignes, & larges d'autant, & couvertes de poils blancs. Tout ſon corps eſt couvert de poils

Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam uſque, unius eſt circiter pedis; capitis, à vertice ad roſtri extremitatem, 3 pollicum; caudæ circiter 1 $\frac{1}{2}$ pedis. Roſtrum habet albidum & acutum; auriculas 10 lineas longas, totidem latas, pilis albis obſitas. Univerſum corpus veſtitur pilis longis, mollibus, & quaſi laneis, in par-

Digitized by Google

tibus corporis superiore, 4 crurum exteriore, & pedibus anterioribus in exortu rufis, deinde cinereis, itàque dispositis ut animal cinereum appareat; in partibus verò corporis inferiore, 4 crurum interiore, & posterioribus pedibus albis. Cauda annulis alternatim albis & nigris cingitur. Habitat in *Madagascarid.* Ex musèo *Realmuriano.*

longs, doux & laineux : ceux du dessus du corps, des pieds de devant, & de l'extérieur des 4 jambes sont roux à leur origine, & terminés de gris, de façon qu'il n'y a que cette derniere couleur qui paroisse : ceux du dessous du corps, des pieds de derriere, & de l'intérieur des 4 jambes sont blancs. Sa queue est annelée alternativement de noir & de blanc. On le trouve à *Madagascar.* Il est dans le Cabinet de M. *de Reaumur.*

SECTIO II.

Ea quorum digiti pedum anteriorum membranâ, in alas expansâ, inter se connectuntur.

UNICUM in hac Sectione continetur Genus, scilicet *Vespertilionis.*

XXXII.

Genus Vespertilionis.
(Fig. 6).

Hujus character est
Dentes incisores in maxillâ superiore quatuor (Fig. 6. a.), in inferiore sex (Fig. 6. b.):
Digiti unguiculati,
In anterioribus pedibus membranâ, in alas expansâ, inter se connexi, in pos-

SECTION II.

Ceux dont les doigts des pieds de devant sont joints ensemble par une membrane étenduë en aîles.

CETTE Section ne contient qu'un seul Genre, qui est celui de la *Chauve-Souris.*

XXXII.

Le Genre de la Chauve-Souris.
(Fig. 6.).

Son caractere est
D'avoir quatre dents incisives à la mâchoire supérieure (Fig. 6. a.), & six à l'inférieure (Fig. 6. b.):
Les doigts onguiculés,
Joints ensemble par une membrane étenduë en aîles dans les pieds de devant, & sépa-

Digitized by Google

rez les uns des autres dans ceux de derriere.

Obſ. 1o. Toutes les eſpeces de ce Genre ont les dents inciſives de la mâchoire ſupérieure aiguës, & ſéparées par paires : celles du milieu (*Fig. 6. d.*) ſont fourchuës, & plus grandes que les extérieures : celles de la mâchoire inférieure (*Fig. 6. e.*) ſont toutes contiguës, & échancrées. Le nombre des canines & des molaires varie.

Obſ. 2o. Elles ont les jambes de devant très longues, dont le pied eſt diviſé en longs doigts, & tous (excepté le pouce, qui eſt ſéparé des autres, & armé d'un ongle fort & crochu) joints enſemble par une membrane, qui n'eſt autre choſe qu'une continuation de la peau du dos, qui s'étend de chaque côté, depuis le col juſqu'à l'anus, ou au bout de la queue ; enſuite tout le long des jambes, & juſqu'au bout des doigts des pieds de devant : c'eſt par le moyen de cette membrane qu'elles peuvent voler. Les doigts des pieds de derriere ſont ſéparés les uns des autres, & armés d'ongles crochus & très pointus.

Obſ. 3o. Elles ſont cachées pendant tout l'Hyver, & l'Eté pendant le jour, dans des lieux obſcurs & ſouterrains, ou dans des trous d'arbres ; &. elles n'en ſortent que vers l'entrée de la nuit.

terioribus à ſe invicem ſeparati.

Obſ. 1o. Omnium hujus Generis ſpecierum dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſunt acuti, & per paria remoti ; intermedii (*Fig. 6. d.*) exterioribus majores ſunt & bifurci : in maxillâ inferiore (*Fig. 6. e.*) contigui, omnes emarginati. Dentium caninorum & molarium variat numerus.

Obſ. 2o. Crura habent anteriora longiſſima, quorum pedes dividuntur in digitos longos, omnes (excepto pollice ab aliis ſeparato, incurvoque & valido ungue munito) membranâ inter ſe connexos ; quæ membrana nihil aliud eſt quam dorſi cutis continuata, in utroque latere, à collo ad anum uſque, aut caudæ extremitatem, & ſecundùm crurum longitudinem, ad digitorum pedum anteriorum apicem extenſa, cujus ope volitant. Pedum poſteriorum digiti ſunt à ſe invicem ſeparati, incurviſque & acutiſſimis unguibus muniti.

Obſ. 3o. Locis obſcuris & cavernis ſubterraneis, vel cavis arboribus per æſtatem interdiù, & per totam Hyemem latitant ; crepuſculo tantùm evolant.

** 1. LA GRANDE CHAUVE-SOURIS DE NOTRE PAYS.

Veſpertilio murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis ſimplicibus... VESPERTILIO MAJOR.

Veſpertilio caudatus, ore naſoque ſimplici. *Linn. Syſt. nat. ed. 6. g. 14. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. No. 18.

Veſpertilio

Vespertilio auriculis binis. *Jonst. Avi. p.* 34. *Fig. T.* 20. [*Fig. sat bona*].
Vespertilio vulgaris. *Klein. Quadr. p.* 61.
Vespertilio. *Raj. Syn. Quadr. p.* 343.
Gesn. Avi. Fig. p. 766. [*Fig. sat bona*].
Gesn. Icon. Avi. Fig. p. 17. [*Fig. sat bona*].
Aldro. Avi. p. 571. *Fig. p.* 576. (*Fig. sat bonis*).
Charlet. Exer. p. 80.
Sloane. Vol. II. p. 330.
Les Hébreux l'appellent ATALEPH. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, ATALAPHA. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Νυκτερὶς.
Les Arabes, BAPHAS. *Gesn. Aldro.*
Les Perses, ANSEB; PERACK. *Gesn. Aldro.*
Les Portugais, MORCEGO, *ou* MURZIEGALO. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, NOTTOLA; NOTULA; SPORTEGLIONO; RATTO PENAGO; BARBASTELLO; PIPISTRELLO; VILPISTRELLO. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, NIETOPERSZ. *Gesn. Aldro.*
Les Illyriens, NETOPYRZ. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, FLÄDERMUSS, *ou* SPECKMAUSS. *Gesn. Aldro.*
Les Suédois, LÄDERLAPP, *ou* FLÄDERMUS. *Linn.*
Les Smolandois, NATTBLACKA. *Linn.*
Les Anglois, BAT, *ou* FLITTERMOUSE. *Raj.*

Quoad magnitudinem corporis, & pilorum colorem *Soricem* æmulatur. Auriculas habet auriculis *Murinis* similes, scilicet subrotundas & pellucidas; rostrum breve & obtusum; in singulis pedibus digitos 5; caudam sat longam, cum membrana volatui inserviente connexam: membrana illa extensa, ab una extremitate ad aliam uno circiter pede longa est. Locis obscuris & cavernis subterraneis per æstatem interdiù, & per totam hyemem latitat; crepusculo tantùm évolat.

Elle ressemble à peu-près à la *Souris* par la grandeur de son corps, & la couleur de ses poils. Elle a le museau court & obtus: ses oreilles sont semblables à celles d'un *Rat*, sçavoir arrondies & transparentes: elle a 5 doigts à chaque pied. Sa queue, qui est assez longue, est jointe avec la membrane qui luy sert à voler; cette membrane étenduë, a environ 1 pied de long d'un bout à l'autre. Elle habite pendant tout l'hyver, & le jour pendant l'Eté dans des lieux obscurs & souterrains; & elle n'en sort que vers l'entrée de la nuit.

Digitized by Google

2. La petite Chauve-Souris de Ternate.

Veſpertilio rufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis ſimplicibus... Vespertilio minor Ternatanus.

Veſpertilio Ternatanus auriculis ſimplicibus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Veſpertilio Ternatanus. *Seb. Vol. I.* p. 91. *Fig. T.* 56. *Mas F.* 3. *Fœm. F.* 2. [*Fig. optimis*].

Elle ne differe de la précédente que par la couleur de ſes poils, qui ſont roux : elle lui reſſemble dans tout le reſte. On la trouve dans l'Iſle de *Ternate*.

A præcedente differt tantùm pilorum colore rufo : in omnibus aliis ei ſimillima eſt. Habitat in *Ternatanâ* Inſulâ.

** 3. La petite Chauve-Souris de notre pays.

Veſpertilio murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus... Vespertilio minor.

Veſpertilio vulgaris auriculis duplicibus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Veſpertilio auriculis quaternis. *Jonſt. Avi. p.* 34. *Fig. T.* 20. (*Fig. ſat bonis*).
Veſpertilio. *Aldro. Avi. p.* 571. *Fig. p.* 574, & 575. [*Fig. ſat bonis*].

Elle reſſemble en tout à la premiere eſpece ; elle n'en differe que par la grandeur de ſes oreilles, qui ont plus d'un pouce de long, & qui ſont comme doubles.

In omnibus cum ſpecie primâ convenit, exceptis auriculis unius pollicis longitudinem ſuperantibus, & quaſi duplicibus.

4. La grande Chauve-Souris de Ternate.

Veſpertilio ſubrufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus, naſo gemino... Vespertilio major Ternatanus.

Veſpertilio caudatus, naſo foliato, obversè cordato. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 14 *ſp.* 5.
Veſpertilio, Rattus Ternatanus. *Klein. Quadr. p. 61.*
Glis volans Ternatanus. *Seb. Vol. I. p.* 90. *Fig. T.* 56, *F.* 1. (*Fig. optimâ*).

Digitized by Google

Per universum corpus vestitur pilis subrufis ; qui verò partem capitis anteriorem cooperiunt, dilutissimè sunt rufi. Membrana volatui inserviens, cujus superficies superior raris pilis obsita est, inferior verò glabra & nuda, marmoris in modum variegatur. Auriculas habet prægrandes & quasi duplices ; nasum pariter geminum, extuberantem, & foliacei quid referentem ; in singulis pedibus digitos 5. Habitat in Insulâ *Ternatand.*

Tout son corps est couvert de poils rousâtres : ceux qui couvrent la partie antérieure de la tête, sont d'un roux très clair. La membrane qui luy sert à voler, est comme marbrée, & garnie de quelques poils endessus, & nuë en dessous. Ses oreilles sont grandes & comme doubles : son nez est aussi double, aquilin, & comme exfolié. Elle a 5 doigts à chaque pied. On la trouve dans l'Isle de *Ternate.*

5. La Chauve-Souris rousse d'Amérique.

Vespertilio dilutè rufus, pedibus anticis tetradactylis ; posticis pentadactylis... Vespertilio Americanus rufus.

Vespertilio caudatus, labio superiore bifido. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14. sp. 3.*

Vespertilio Americanus, capite globoso, ore leporino. *Klein. Quadr. p. 61.*

Vespertilio Cato similis Americanus. *Seb. Vol. I. p. 89. Fig. T. 55. F. 1. (Fig. optimâ).*

Pilis dilutè rufis in toto corpore vestitur. Caput habet globosum ; orem patulum ; mentum pendulum ; nares rotundas ; auriculas magnas ; caudam cum membranâ volatui inserviente connexam ; in pedibus anterioribus digitos 4, in posterioribus verò 5. Habitat in *Americâ.*

Tout son corps est couvert de poils d'un roux clair. Elle a la tête ronde ; la bouche large ; le menton pendant ; les narines rondes ; les oreilles grandes ; la queue jointe avec la membrane qui luy sert à voler ; 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. On la trouve en *Amérique.*

Digitized by Google

6. La Chauve-Souris d'Amérique.

Vespertilio murini coloris, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, naso cristato... Vespertilio Americanus.

Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 14. sp. 4.*

Vespertilio Americanus vulgaris, longioribus auriculis, & è naso erectâ cristulâ. *Klein. Quadr. p. 61.*

Vespertilio Americanus vulgaris. *Seb. Vol. I. p. 90. Fig. T. 55. F. 2. (Fig. optimâ).*

Elle ressemble assez par la forme du corps à la premiere espece; mais elle a les oreilles plus amples, & plus longues qu'elle. Elle porte sur le nez une espece de petite crête, assez semblable à un *casque*: elle n'a point de queue: elle a 4 doigts aux pieds de devant, & 5 à ceux de derriere. La couleur de son poil est un gris de *Souris*. On la trouve en *Amérique*.

Quoad formam corporis speciem primam sat benè imitatur; majores tamen atque longiores habet auriculas, & è naso erectam, *Cassidi* ferè æmulam, cristulam gerit: caudâ caret: 4 in pedibus anterioribus digitis donatur, in posterioribus verò 5. Pilorum color est *Murinus*. Habitat in *Americâ*.

ORDO XV.

QUADRUPEDA

Dentibus incisoribus in maxillâ superiore sex, in inferiore quatuor; & digitis unguiculatis prædita.

UNICO Quadrupede, *Phocâ* scilicet, seu *Vitulo-Marino*, constituitur hic Ordo.

XXXIII.

Genus Phocæ.

Hujus character est

Dentes incisores in maxillâ superiore sex, in inferiore quatuor:

In singulis pedibus digiti quinque unguiculati,

Membranis inter se connexi:

Pedes posteriores retrorsùm extensi.

Obs. Amphibium est hoc animal, & diutiùs in mare quàm in terrâ commoratur. 4 dentibus caninis, dentium *Canum* æmulis, præditum est, scilicet in utrâque maxillâ utrinque unô: dentium molarium variat numerus.

ORDRE XV.

LES QUADRUPEDES.

Qui ont six dents incisives à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un seul Quadrupede, sçavoir le *Phocas*, *ou Veau-Marin.*

XXXIII.

Le Genre du Phocas.

Son caractere est

D'avoir six dents incisives à la mâchoire supérieure, & quatre à l'inférieure:

A chaque pied cinq doigts onguiculés,

Joints ensemble par des membranes:

Les pieds postérieurs tournés en arriere.

Obs. Cet animal est amphibie & habite plus la mer que la terre. Il a 4 dents canines semblables à celles des *Chiens*, sçavoir une de chaque côté à chaque mâchoire: le nombre de ses dents molaires varie.

** 1. Le Phocas, ou Veau-Marin.

Phoca, ſeu Vitulus-Marinus.

Phoca dentibus caninis tectis. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 9. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 11.
Phoca ſeu Vitulus marinus. *Raj. Syn. Quadr. p. 189.*
Aldrov. Piſc. p. 722. Fig. p. 724. [Fig. mala].
Jonſt. Piſc. p. 156. Fig. T. 44. [Fig. mala].
Phoca. *Klein. Quadr. p. 93.*
Geſn. Piſc. bis Fig. p. 830. [Fig. ſuperior ſat bona, inferior mala].
Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 164. (Fig. mala), & p. 366. B. (Fig. ſat bona).
Charlet. Exer. Piſc. p. 48. N°. 6.
Vitulus marinus. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 68. (Fig. mala).*
Bell. de Aquat. p. 19. Fig. p. 21. [Fig. mala].
Veau Marin. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 189. Fig. Pl. 27. (Fig. aſſez bonne).*
Voy. de la B. de Hud. Tom. II. Fig. p. 24. [Fig. aſſez bonne].
Kolbe. Tom. III. p. 128.
Chien, ou Veau de mer. *Hiſt. de l'Iſl. & de Gro. Tom. II. p. 165. Fig. p. 168. (Fig. aſſez bonne, excepté les pieds).*
Loup Marine. *Klein.*
Les Grecs l'appellent Φώκη.
Les Eſpagnols, Lobo Marino. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Vechio Marino. *Geſn. Aldro. Bell.*
Les Genevois, Buo, *ou* Bove Marino. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, Meer-Wolff, *ou* Meer-Hund. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, Morskieciele. *Geſn.*
Les Suédois, Sjal. *Linn.*
Les Norvégeois, Kaabe. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Groenlandois, Pusa. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Danois, See-Hund. *Charlet.* Sälhund. *Klein. Hiſt. d'Iſl.*
Les Hollandois, Zeehundt. *Aldro.*
Les Flamands, Seehond. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, Sea Calf, *ou* Soile. *Raj. Charlet.* Seal-Hund. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Habitans du Cap de B. Eſp. Chien Marin. *Kolbe.*
Les Amériquains Septentrionaux, Loup Marine. *Hiſt. d'Iſl.*

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 4 pieds de long. Son muſeau eſt oblong : ſes yeux ſont grands, & enfoncés profondé-

Corpus, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 4 circiter pedes longum eſt. Roſtrum habet oblongum ; oculos magnos, in orbitas pro-

Digitized by Google

fundè demerſos. Caret auriculis externis; ſed non caret foraminibus, quibus ſonum recipit. Collum ei eſt oblongum; pectus latum: crura ſub cute clauſa latitant; pedes ſoli exſeruntur, & extrorsùm apparent; anteriores 4 pollices longi ſunt; poſteriores verò 9: digiti omnes ſingulorum pedum validis membranis inter ſe ſunt connexi, validiſque unguibus muniti. Cauda 3 circiter pollices longa, horizontaliter plana eſt. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, rigidis, cinereis ſplendentibus in dorſo, maculiſque nigricantibus variegatis; in ventre verò ex ſordidè albo flavicantibus: dantur & omninò nigræ. Habitat in mare, quandoque in terrâ.

ment dans leurs orbites. Il n'a point d'oreilles extérieurement; mais à leur place il y a des trous par leſquels il entend; ſon col eſt oblong; ſa poitrine large: ſes jambes ſont tout à fait cachées ſous la peau; il n'y a que les pieds qui paroiſſent; ceux de devant ont 4 pouces de long, & ceux de derriere 9 pouces: tous leurs doigts ſont joints enſemble par de fortes membranes, & armés d'ongles forts. Sa queue a environ 3 pouces de long, & eſt platte horizontalement. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, roides, d'un gris brillant, & marqués de taches noirâtres endeſſus; & d'un blanc ſale & jaunâtre en deſſous: il y en a auſſi de tout à fait noirs. On le trouve dans la mer, & quelque fois à terre.

Digitized by Google

ORDRE XVI.

LES QUADRUPEDES

Qui ont fix dents inciſives à chaque mâchoire, & les doigts onguiculés.

PARMI les QUADRUPEDES de cet Ordre les uns ont les doigts ſéparés les uns des autres; & les autres les ont joints enſemble par des membranes. Ils ſont tous Carnivores. Ils ont quatre dents canines, ſcavoir une de chaque côté à chaque mâchoire : le nombre des dents molaires varie. Ils ſe diviſent en deux Sections. Dans la premiere ſont ceux qui ont les doigts ſéparés les uns des autres, comme le *Chien*, le *Chat*, la *Belette*, l'*Ours*, &c. Dans la ſeconde, ceux dont les doigts ſont joints enſemble par des membranes, comme la *Loutre*.

ORDO XVI.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in utrâque maxillâ ſex, & digitis unguiculatis prædita.

HUJUS ordinis QUADRUPEDUM alia ſunt quorum digiti à ſe invicem ſunt ſeparati, alia quorum digiti membranis inter ſe connectuntur. Omnia Carnivora. Quatuor dentibus caninis prædita ſunt, ſcilicet unô utrinque in utrâque maxillâ : dentium molarium variat numerus. In duas ſectiones dividuntur. Prima continet ea quorum digiti à ſe invicem ſeparati ſunt, ſicut *Canis*, *Felis*, *Muſtela*, *Urſus*, &c. Secunda ea quorum digiti membranis inter ſe connexi ſunt, ut *Lutra*.

SECTION I.

Ceux dont les doigts ſont ſéparés les uns des autres.

CETTE Section contient ſix Genres de QUADRUPEDES, dont les caracteres ſont

SECTIO I.

Ea quorum digiti à ſe invicem ſunt ſeparati.

SEX in illâ Sectione continentur genera QUADRUPEDUM, quorum characteres

Digitized by Google

racteres à pedibus desumuntur. Alia quatuor digitis in pedibus anterioribus, & quinque in posterioribus donantur, ut *Hyæna*. Alia quinque in pedibus anterioribus, & quatuor tantùm in posterioribus, digitis prædita sunt, ut *Canis*. Alia in singulis pedibus quinque digitos habent: ex his ultimis alia sunt quorum pollex ab aliis digitis remotus est, & superiùs collocatus, ut *Mustela* : & alia quorum pollex aliis digitis est proximus, ut *Meles*. Alia calcaneis incedunt, ut *Ursus*. Alia denique unguibus hamatis & retractilibus prædicta sunt, ut *Felis*.

tirés des pieds. Les uns ont quatre doigts aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere, comme l'*Hyene*. D'autres ont cinq doigts aux pieds de devant, & quatre à ceux de derriere, comme le *Chien*. D'autres ont 5 doigts à chaque pied : parmi ces derniers, les uns ont le pouce séparé des autres doigts, & articulé plus haut, comme la *Belette* : & les autres ont le pouce placé auprès des autres doigts, comme le *Blaireau*. D'autres s'appuyent sur le talon en marchant, comme l'*Ours*. D'autres enfin ont les ongles crochus, & qui peuvent être retirés, & entierement cachés, comme le *Chat*.

XXXIV.

Genus Hyænæ.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ sex:
Digiti unguiculati in pedibus anterioribus quatuor, in posterioribus quinque,
Omnes à se invicem separati.

XXXIV.

Le Genre de l'Hyene.

Son caractere est
D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire:
Quatre doigts onguiculés aux pieds de devant, & cinq à ceux de derriere,
Tous séparés les uns des autres.

** 1. L'HYENE.

HYÆNA.

Hyæna. *Gesn. Quadr. Fig. p.* 624. (*Fig. bona, si nigra esset nec maculata*).
Hyæna, vel Belbus. *Gesn. Icon. Quadr. Fig. p.* 75. (*Fig. eadem*).
Zilio Hyæna. *Jonst. Quadr. Fig. T.* 56. (*Fig. ut suprà*).
Animal Necrophagum, sive Jesef, sive Hyæna. *Eus. Nieremb. p.* 181.
Canis pilis cervicis erectis longioribus. Hyæna. *Linn. syst. nat. ed.* 6. *g.* 8. *sp.* 4.

Gulo; Boophagus; Magnus vorator; Roſomacha. *Klein. Quadr. p.* 83. *Fig. T.* 5. (*Fig. mala*).
Gulo. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 623. (*Fig. mala*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 78. *Fig. p.* 79. (*Fig. mala*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 178.
Jonſt. Quadr. p. 91. *Fig. T.* 57. (*Fig. mala*).
Charlet. Exer. p. 15.
Roſomacha. *Euſ. Nieremb. p.* 188.
Dabuh Arabum. *Charlet. Exer. p.* 15.
Lupus veſpertinus Julii Capitolini. *Aldro.*
Vultur Quadrupes, Scaligeri. *Klein. Charlet. Jonſt.*
Les Arabes l'appellent ZABO, *ou* DABUH. *Geſn. Jonſt.*
Les Siriens, DABHA, *ou* DAHAB. *Geſn.*
Les Suédois, FILFRAS. *Linn.*
Les Allemands, VILFRAS. *Geſn. Aldro. Jonſt.*
Les Africains, JESEF. *Geſn. Euſ. Nieremb.* SESEF. *Jonſt. Charlet.*

Il eſt de la grandeur & de la figure d'un *Loup*. Il a les oreilles courtes. Tout ſon corps eſt couvert de poils aſſez longs, & noirs. On le trouve en *Afrique*.

Magnitudine & figurâ *Lupum* æmulatur. Breves habet auriculas. Per univerſum corpus veſtitur pilis ſat longis, & nigris. Habitat in *Africâ*.

XXXV.

Le Genre du Chien.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :
Cinq doigts onguiculés aux pieds de devant, & quatre à ceux de derriere,
Tous ſéparés les uns des autres.

Obſ. Il arrive quelquefois que les *Chiens domeſtiques* ont 5 doigts à chaque pied; mais cette variété ne peut point induire en erreur, parce qu'on ne la trouve que dans les *Chiens domeſtiques*, qui ſont des animaux trop connus, pour qu'on puiſſe les confondre avec d'autres.

XXXV.

Genus Caninum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :
Digiti unguiculati in pedibus anterioribus quinque, in poſterioribus quatuor,
Omnes à ſe invicem ſeparati.

Obſ. Canes domeſtici quandoque in ſingulis pedibus quinque digitis donantur; quæ varietas in errorem inducere nequit, quoniam reperitur in ſolis *domeſticis Canibus*, animalibus ità notis, ut nullis aliis confundi poſſint.

Digitized by Google

** 1. LE CHIEN.

CANIS DOMESTICUS.

Canis caudâ (siniſtrorsùm) recurvâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 8. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 12.
Canis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 175.
Klein. Quadr. p. 68.
Geſn. Quadr. Fig. p. 173. (*Fig. bonis*).
Geſn. Icon. Quadr. p. 25. *Fig. p.* 25, 26 & 27. (*Fig. bonis*).
Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 482.
Jonſt. Quadr. p. 122. *Fig. T.* 69, 70 & 71. (*Fig. bonis*).
Charlet. Exer. p. 26.
Sloane. Vol. II. p. 329.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 244.
Les François appellent le mâle CHIEN ; *& la femelle*, CHIENNE.
Les Hébreux l'appellent KELEB. *Geſn. Aldro.*
Les Chaldéens, KALBA. *Geſn. Aldro.*
Les Arabes, KELBE. *Geſn. Aldro.*
Les Grecs, Κύων.
Les Saraſins, KEPB, *ou* KOLPB. *Geſn.*
Les Perſes, SAG. *Geſn.* SIG. *Aldro.*
Les Médes, SPACA. *Geſn. Aldro.*
Les Eſpagnols, PERRO. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, CANE. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, PES, *ou* PAS. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, HUND. *Geſn. Aldro*
Les Suédois, HUND. *Linn.*
Les Anglois, DOG. *Raj.*

Canis eſt animal omnibus ità notum, ut deſcriptione non indigeat.

Obſ. Omnes *Canum*, quas videmus, differentiæ ſunt tantummodò ejuſdem ſpeciei varietates, non verò ſpecies diſtinctæ.

Le Chien eſt un animal ſi connu de tout le monde, qu'il n'a pas beſoin de deſcription.

Obſ. Toutes les differences, que nous remarquons dans les *Chiens*, ne ſont que des variétés de la même eſpece, & point du tout des eſpeces differentes.

** 2. LE LOUP.

Canis ex griſeo flaveſcens... LUPUS VULGARIS.
Canis caudâ incurvâ. Lupus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 8. ſp. 1.*

Digitized by Google

Faun. Suec. Linn. N°. 13.
Lupus vulgaris. *Klein. Quadr. p.* 70.
Charlet. Exer. p. 15.
Lupus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 173.
Gesn. Quadr. p. 716. *Fig. p.* 717. (*Fig. sat bona*).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 79. (*Fig. sat bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 144.
Jonst. Quadr. p. 89. *Fig. T.* 56. (*Fig. bona*).
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 219.
Lupus, seu Canis sylvestris. *Rzac. Auct. p.* 312.
Les François appellent le mâle LOUP; *la femelle*, LOUVE; *& le jeune*, LOUVETEAU.
Les Hébreux l'appellent ZEEB. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, DEEBA, & DEBA. *Gesn. Aldro.*
Les Arabes le mâle, DIB; *la femelle*, ZEEBAH. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Λύκος.
Les Sabins, HIRPUS. *Aldro.*
Les Espagnols, LOBO. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, LUPO. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, WOLFF. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, WLK. *Gesn.*
Les Polonois, WILK. *Rzac.*
Les Suédois, WARG; ULF. *Linn.*
Les Anglois, WOLF. *Raj. Gesn.*

Le Loup est un animal assez connu, pour qu'il n'ait pas besoin d'une longue description. La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est d'environ 2 pieds 8 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'au bout du museau, de 7 pouces : sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, est d'environ 1 pied, 8 pouces. Son museau est allongé & obtus (en quoi il differe du *Renard*, qui a le museau plus pointu) : ses oreilles sont assez courtes & droites : sa queue est grosse, & couverte de longs poils. La cou-

Lupus est animal satis notum, ut amplâ descriptione non indigeat. Corporis longitudo, à capitis vertice ad caudam usque, 2 est circiter pedum cum 8 pollicibus; capitis, à vertice ad rostri extremitatem, 7 pollicum: à parte superiore dorsi ad terram usque, unum pedem & 8 pollices circiter altus est. Rostrum habet elongatum & obtusum, (quo differt à *Vulpe* rostro acutiori donato); auriculas sat breves & erectas; caudam crassam, pilis longis obsitam. Pilorum color vulgaris est ex griseo flaves-

Digitized by Google

cens, quandoque etiam nigricantibus pilis in dorso mixtis : in *Septentrionalibus Regionibus* candidissimi reperiuntur. Habitat in sylvis.

leur de ses poils est ordinairement un gris tirant sur le jaunâtre, quelquefois mêlée de noirâtre sur le dos ; il y en a de tout à fait blancs dans les *Pays Septentrionaux*. On le trouve dans les bois.

3. LE LOUP DORÉ.

Canis flavus... LUPUS AUREUS.

Canis, Lupus aureus dictus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 3.*
Lupus aureus, Asiaticus. *Klein. Quadr. p. 70.*
Lupus aureus. *Raj. Syn. Quadr. p. 174.*
Gesn. Quadr. p. 717.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 174.
Jonst. Quadr. p. 91.
Charlet. Exer. p. 15.
Kæmpf. p. 413. Fig. p. 407. F. 3.
Asiaticum Animal *Adil* nuncupatum. *Bell. Obs. p. 160.*
Les Grecs modernes l'appellent SQUILACHI. *Raj. Klein. Aldro. Bell.*
Les Perses, SIECHAAL. *Kæmpf.*
Les Suédois, JACKHALS. *Linn.*
Les Flamands, JAKHALS. *Kæmpf.*
Les Anglois, JACKCALL. *Raj. Klein. Kæmpf.*

Lupo vulgari magnitudine cedit, & *Vulpem* antecellit. Quoad figuram verò *Lupum* æmulatur. Pilorum color est eleganter flavus. Habitat in *Cilicid*, *Turcicâ*, & universâ *Asid*.

Sa grandeur tient le milieu entre le *Loup* & le *Renard*. Quant à sa figure, il ressemble au *Loup*. La couleur de ses poils est d'un beau jaune. On le trouve en *Cilicie*, en *Turquie*, & dans toute l'*Asie*.

4. LE LOUP DU MÉXIQUE.

Canis cinereus, maculis fulvis variegatus, tæniis subnigris à dorso ad latera deorsùm hinc inde deductis... LUPUS MEXICANUS.

Xoloitzcuintli : Lupus Mexicanus. *Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 479.* (*Figura bona*).

Digitized by Google

Cuetlachtli, ſeu Lupus Indicus. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 7.
Lupus Indicus. *Euſ. Nieremb. p.* 180.
Les Indiens l'appellent CUETLACHTLI. *Euſ. Nieremb.*

Il eſt de la grandeur du *Loup ordinaire*; mais il a la tête plus groſſe. Il a les yeux agards & étincellants; les oreilles aſſez longues, & droites; le col gras & épais; la queue aſſez longue, & point veluë. Il luy ſort de la levre ſupérieure de gros poils, roides comme les picquants flexibles du *Porc-Epic*, variés de gris & de blanc, & couchés en arriere. La couleur de tout ſon corps eſt griſe, & variée çà & là de taches fauves: ſa tête eſt auſſi griſe, & marquée de bandes tranſverſales noirâtres: il a ſur le front de larges taches fauves; ſes oreilles ſont griſes: ſon col eſt marqué d'une longue tache fauve: il en a une pareille à la poitrine, & une autre à la partie antérieure du ventre: des bandes noirâtres s'étendent de part & d'autre depuis le dos juſqu'aux côtés. Sa queue eſt griſe, & a vers ſon milieu une tache fauve, qui s'efface peu à peu. Ses jambes & ſes pieds ſont variés de bandes griſes & noirâtres, qui s'étendent du haut au bas. On le trouve dans les endroits chauds de la *Nouvelle Eſpagne*.

Magnitudine *Lupum vulgarem* adæquat; ſed ampliori capite gaudet. Torvos habet & lucentes oculos; auriculas ſat longas, & erectas; collum obeſum, & craſſum; caudam ſatis longam, non villoſam. Ex ſuperiore labro hirti admodùm pili, retrorsùm flexi, mollioribus *Hyſtricis* aculeis non abſimiles, ex cinereo alboque colore variantes, erumpunt. Color in toto corpore cinereus; maculis tamen ſubinde fulvis variegatus: totum caput cinereum eſt, lineis quibuſdam tranſverſis ſubnigricantibus ornatum: maculæ latæ coloris fulvi integrum frontem interſtingunt: auriculæ ſunt cinereæ: collum longâ fulvâque maculâ prædictum eſt, cui ſimilem in pectore, alteram etiam ſimilem in parte ventris anteriore gerit: tæniæ ſubnigræ, à dorſo ad latera, deorsùm hinc inde deductæ ſunt. Cauda, quæ cinerea eſt, in medio ſubfulvam obtinet maculam, paulatim evaneſcentem. Crura ac pedes cinereis & nigricantibus lineis, à ſummo ad imum deductis, variegantur. Habitat in calidis *Novæ Hiſpaniæ* locis.

Digitized by Google

** 5. Le Renard.

Canis fulvus, pilis cinereis intermixtis... Vulpes vulgaris.

Canis caudâ rectâ, extremitate albâ. Vulpes vulgaris. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 6.*
Canis caudâ rectâ, extremitate nigrâ. Vulpes campestris. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 8. sp. 5.*
Canis caudâ erectâ. Vulpes fulvus. *Faun. Suec. Linn. N°. 14.*
Vulpes vulgaris. *Klein. Quadr. p. 71.*
Vulpes. *Raj. Syn. Quadr. p. 177.*
Gesn. Quadr. Fig. p. 1081. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. p. 88. Fig. p. 89. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 195.
Jonst. Quadr. p. 92. Fig. T. 56. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 15.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p, 231.
Rzac. Auct. p. 324.
Les Hebreux l'appellent Schual. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, Thaal. *Gesn. Aldro.*
Les Arabes, Thaleb. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Αλωπηξ.
Les Espagnols, Raposa. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, Volpe. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, Fuchss. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Illyriens, Lisska. *Gesn.*
Les Polonois, Lis; Liszka. *Rzac.*
Les Suédois, Räf. *Linn.*
Les Flamands, Vos. *Gesn.*
Les Anglois, Fox. *Raj. Gesn.*

Vulpes est animal ità notum, ut amplâ descriptione non indigeat. Longitudo corporis, à capitis vertice ad caudam usque, 1 est circiter pedis & 8 pollicum; capitis, à vertice ad nares, 5 ½ pollicum; caudæ 15 pollicum. A parte superiore dorsi ad terram usque, 15 aut 16 pollicum altus est. Rostrum habet elongatum & acu-

Le Renard est un animal assez connu, pour qu'il n'ait pas besoin d'une longue description. La longueur de son corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est d'environ 1 pied 8 pouces; celle de sa tête, depuis son sommet jusqu'aux narines, de 5 ½ pouces; celle de sa queue de 15 pouces. Sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, est de 15

Digitized by Google

ou 16 pouces. Son muſeau eſt allongé & pointu, (en quoi il differe du *Loup*, qui a le muſeau plus obtus). Ses oreilles ſont droites. Sa queue eſt groſſe, & couverte de poils longs & épais: ceux qui couvrent la partie ſupérieure du corps, ſont fauves, mêlés de quelques poils gris; & ceux qui couvrent la partie inférieure, ſont gris. On le trouve dans les bois.

tum, (quo differt à *Lupo*, roſtro obtuſiori prædito); auriculas erectas; caudam craſſam, pilis longis & denſis veſtitam. Pili partem corporis ſuperiorem tegentes, ſunt fulvi, pilis quibuſdam cinereis intermixtis; qui verò partem corporis inferiorem veſtiunt, ſunt cinerei. Habitat in ſylvis.

6. Le Renard croiſé.

Canis fulvus, crucem nigram in dorſo gerens... Vulpes Crucigera.

Canis caudâ erectâ. Vulpes cruciatus. *Fqun. Suec. Linn. No.* 14.
Vulpes crucigera. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 90. (*Fig. bona*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 221. *Fig. p.* 222. (*Fig. bona*).
Jonſt. Quadr. p. 93.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 232.
Renard croiſé. *Kolbe. Tom. III. p.* 62.
Les Polonois l'appellent Krzyzaki. *Rzac.*
Les Suédois, Krossräf. *Linn.*
Les Européens du Cap de B. Eſp. Jakhals. *Kolbe.*
Les Hottentots, Tenlic, *ou* Kenlée. *Kolbe.*

Il eſt de la grandeur, de la figure, & de la couleur du *Renard ordinaire*: il en differe ſeulement par une bande longitudinale noire, qui s'étend depuis le bout de muſeau juſqu'au bout de la queue, en paſſant pardeſſus la tête & le dos, & une ſeconde tranſverſale, qui paſſe ſur le dos, & s'étend ſur les deux jambes antérieures; de façon que ces deux bandes enſemble, forment

Magnitudine, figurâ & colore *Vulpem vulgarem* æmulatur: ab eâ autem notâ inſigni differt; nam ab ore, per caput & dorſum, ad caudæ apicem uſque, recta, longitudinalis, nigri coloris tænia ducitur, alterâ tæniâ tranſversâ etiam nigrâ per dorſum & pedes anteriores ductâ; ita ut duæ illæ tæniæ ſimul crucis ſimilitudinem exprimant.

Digitized by Google

primant. Habitat in *Poloniâ*, *Sueciâ*, & *Capite B. Spei.*

une croix. On le trouve en *Pologne*, en *Suede*, & au *Cap de Bonne Eſperance.*

7. LE RENARD GRIS.

Canis ex cinereo argenteus... VULPES CINEREA.

Vulpes cinereus Americanus. *Klein. Quadr. p.* 71.
Renard gris. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 78 [*Fig. très bonne*].
Les Anglois l'appellent GRAY FOX. *Cat.*

Magnitudine & figurâ *Vulpem vulgarem* æmulatur : ab eâ autem differt colore qui eſt ex cinereo argenteus. Habitat in *Carolinâ*, & *Virginiâ* in cavis arboribus.

Il eſt à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Renard ordinaire* : il en differe par ſa couleur qui eſt un gris argenté. On le trouve à la *Caroline*, & à la *Virginie* dans des trous d'arbres.

8. LE RENARD BLANC.

Canis hieme albus, æſtate ex cinereo cœruleſcens... VULPES ALBA.

Canis cauda recta unicolore. *a.* Vulpes alba. *b.* Vulpes cœruleſcens. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 8. *ſp.* 7.
Canis caudâ erectâ. Vulpes albus. Vulpes cœruleſcens. *Faun. Suec. Linn. No.* 14.
Vulpes alba. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 220. *Fig. p.* 221. (*Fig. bona*). *Jonſt. Quadr. p.* 93.
Renard blanc. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I p.* 56.
Les Suldois l'appellent FIÄLL RACKA, *lorſqu'il eſt blanc ; &* BLÅRÄF, *lorſqu'il eſt bleuâtre. Linn.*

Magnitudine & figurâ *Vulpem vulgarem* æmulatur : ab eâ autem differt colore, qui æſtate ex cinereo cœruleſcit, hieme verò albus eſt. Habitat in *Septentrionalibus Regionibus.*

Il eſt à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Renard ordinaire* : il en differe par ſa couleur, qui eſt d'un gris bleuâtre en Eté, & blanche en Hiver. On le trouve dans les *Pays du Nord.*

Digitized by Google

XXXVI.

Le Genre de la Belette.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire :
A chaque pied cinq doigts onguiculés,
Tous ſeparés les uns des autres :
Le pouce eloigné des autres doigts, & articulé plus haut.

Obſ. Tous les QUADRUPEDES de ce Genre ont le corps allongé, & les jambes courtes.

XXXVI.

Genus Muſtelæ.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex :
Digiti unguiculati in ſingulis pedibus quinque,
Omnes à ſe invicem ſeparati :
Pollex ab aliis digitis remotus, & altiùs collocatus.

Obſ. Omnia hujus Generis QUADRUPEDA corpus habent gracile, & crura brevia.

** 1. LA BELETTE.

Muſtela ſuprà rutila, infrà alba... MUSTELA VULGARIS.

Muſtela caudæ apice atro. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 5.*
Faun. Suec. Linn. No. 9.
Muſtela vulgaris. *Raj. ſyn. Quadr. p. 195.*
Klein. Quadr. p. 62.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 307.
Jonſt. Quadr. p. 105. Fig. T. 64. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 20.
Muſtela propriè ſic dicta. *Geſn. Quadr. Fig. p. 851. (Fig. ſat. bona).*
Muſtela. *Geſn. Icon. Quadr. p. 99. Fig. p. 100. [Fig. ſat bona].*
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 235.
Les Hebreux l'appellent CHULDAH. *Geſn.*
Les Chaldéens, CHULDA. *Geſn.*
Les Arabes, CALDAH. *Geſn.*
Les Grecs, Γαλὲη, *ou* Γαλῆ.
Les Perſes, GURBA. *Geſn.*
Les Eſpagnols, COMADREIA. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, DONNOLA ; BALLOTTULA ; BENULA. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens, KOLCZAWA. *Geſn. Aldro.*
Les Allemands, WISELE. *Geſn. Aldro.*
Les Smolandois, WESLA. *Linn. Klein.*
Les Anglois, WEASEL, *ou* WEESEL. *Raj. Geſn. Aldro.*
Les Habitans d'York, FOUMART, *ou* FITCHET. *Raj.*

Digitized by Google

Corporis longitudo, ab extremitate oris ad caudæ exortum, 7 est circiter pollicum; caudæ 2 pollicum. Oculos habet parvos & nigros; auriculas breves, sed latas & subrotundas; crura unius pollicis longitudinem non multùm superantia. Per universum corpus vestitur pilis brevibus, in parte corporis superiore rutilis, in inferiore verò albis. Habitat in agris & sylvis.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 7 pouces; & celle de sa queue, de 2 pouces. Elle a les yeux petits & noirs; les oreilles courtes, mais larges & arrondies: ses jambes n'ont gueres plus d'un pouce de long. Tout son corps est couvert de poils courts, roux dans la partie supérieure du corps, & blancs dans la partie inférieure. On la trouve dans les champs, & dans les bois.

** 2. L'HERMINE.

Mustela hieme alba, æstate suprà rutila infrà alba; caudæ apice nigro.

Mustela Armellina; Mustela alba extremâ caudâ nigrâ. *Klein. Quadr. p. 63.*
Mustela caudæ apice atro. *Faun. Suec. Linn. No. 9.*
Mustela candida, sive Ermineum. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 6.*
Mustela candida, sive Animal Ermineum recentiorum. *Raj. syn. Quadr. p. 198.*
Mustela candida in extremâ caudâ nigricans. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 309. Fig. p. 310.* [*Fig. sat bona*].
Mustela alba. *Gesn. Quadr. Fig. p. 852.* [*Fig. sat bona*].
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 100. (*Fig. sat bona*).
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 235.
Rzac. Auct. p. 328.
Mustela tota alba, *Hermellani* dicta. *Jonst. Quadr. p. 105.*
Mustela Alpina Junii. *Rzac.*
Hermellanus. *Charlet. Exer. p. 20.*
Les Italiens l'appellent ARMELINO. *Rzac.*
Les Polonois, GRONOSTAY. *Rzac.*
Les Allemands, HERMELIN, *ou* WYSS WISELIN. *Gesn. Rzac.*
Les Suédois, HERMELIN, *ou* LEKATT. *Linn.*
Les Norvégeois, LEKAT. *Gesn.*
Les Anglois, ERMINE, *ou* STOAT. *Raj.*

Figurâ suâ *Mustelam vulgarem* imitatur; sed eam

Elle ressemble à la *Belette* par sa figure; mais elle est un peu

plus grande. Elle a les ongles blancs, & le bout de la queue noir. Tout le reſte de ſon corps eſt blanc en Hiver; & en Eté la partie ſupérieure du corps eſt rouſſe, & la partie inférieure eſt blanche. On la trouve en *Ruſſie*, en *Scandinavie*, & dans tous les *Pays du Nord*; & rarement en *France*.

magnitudine ſuperat. Ungues huic albi ſunt, & caudæ apex niger; quo excepto, Hieme in toto corpore alba eſt; æſtate verò in parte corporis ſuperiore rutila, in inferiore verò alba. Habitat in *Ruſsiâ*, *Scandinaviâ*, & in omnibus *Septentrionalibus Regionibus*; in *Galliâ* rariſſima.

** 3. LE FURET.

{ Muſtela pilis ſubflavis, longioribus caſtaneo colore terminatis, veſtita... VIVERRA MAS.
{ Muſtela pilis ex albo ſubflavis veſtita... VIVERRA FŒMINA.

Muſtela ſylveſtris *Viverra* dicta. *Raj. Syn. Quadr. p.* 198.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 6. *ſp.* 4.
Muſtela *Viverra* dicta. *Klein. Quadr. p.* 65.
Muſtela ſylveſtris. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 325. *Fig. p.* 327. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 167.
Muſtela ſylveſtris, Ictis. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 235.
Viverra; Furo; Ictis. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 862. [*Fig. ſat bona*].
Viverra. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 101. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 20.
Furunculus Sipontino. *Rzac.*
Les Grecs l'appellent Κτὶς, *ou* Ικτὶς.
Les Eſpagnols, HURON; FURAM. *Geſn.*
Les Polonois, LASKA; LASICA LESNA. *Rzac.*
Les Allemands, FRETT; FRETTEL; FURETTE. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, FERRET. *Raj. Geſn.* FRET; FERRETTE. *Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 14 pouces; & celle de ſa queue de 5 pouces. Il a les yeux rouges; les oreilles courtes, larges, & arrondies; & les ongles blancs. Le mâle a le bout du muſeau blanc; la tête jaunâtre; & tout

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 14 eſt pollicum; caudæ 5 pollicum. Oculos habet rubicundos; auriculas breves, latas & ſubrotundas; & ungues albos. In mare roſtri extremitas alba eſt; caput ſubflavum; & reliquum

corpus pilis subflavis, longioribus castaneo colore terminatis, vestitum. Fœmina, quæ mari magnitudine cedit, in parte capitis anteriore alba est, & in reliquo corpore ex albo subflava. *Africæ* incola esse dicitur, indeque ad nos translata.

le reste du corps couvert de poils jaunâtres, dont les plus longs sont terminés de marron. La femelle est un peu plus petite que le mâle : elle a la partie antérieure de la tête blanche, & tout le reste du corps d'un blanc jaunâtre. On prétend qu'il nous a été apporté d'*Afrique*.

4. Le Furet des Indes.

Mustela ex grisco rufescens... Viverra Indica.

Mustela Glauca. Mungo. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 9.*
Viverra Indica ex griseo rufescens. *Raj. Syn. Quadr. p.* 198.
Klein. Quadr. p. 63.
Les Portugais l'appellent Mungo. *Raj.*
Les Zeyloniens, Mungathia. *Raj.*

A præcedente differt colore, qui ex griseo rufescit. Habitat in *Indiâ*.

Il differe du précédent par sa couleur, qui est un gris roussâtre. On le trouve dans l'*Inde*.

5. Le Furet de Java.

Mustela suprà rufa, infrà dilutè flava, caudæ apice nigricante... Viverra Javanica.

Mustela Javanica, *Koger Angan* dicta. *Klein. Quadr. p. 64.*
Mustela Javanica. *Seb. Vol. I. p.* 77. *Fig. T.* 48. *F.* 4. (*Fig. bona*).
Les Habitans de Java l'appellent Koger Angan. *Seba.*

Magnitudine & figurâ *Viverram nostratem* circiter æquat : ab eâ autem colore differt. Pili caput tegentes, sunt obscurè spadicei ; qui dorsum obtegunt, sunt rufi ; qui verò ventrem vestiunt, dilutè flavi. Cauda in apicem acutum nigricantem desinit. Habitat in *Javâ*.

Il est à peu-près de la grandeur, & de la figure de *notre Furet* : il en differe par sa couleur. Les poils qui couvrent sa tête, sont d'un rouge-bay obscur ; ceux du dos sont roux ; & ceux du ventre d'un jaune clair. Sa queue se termine en une pointe noirâtre. On le trouve à *Java*.

Digitized by Google

** 6. Le Vison.

Muſtela pilis coloris ſaturatè caſtanei in toto corpore veſtita... Vison.

Il a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, environ 15 pouces de long : ſa queue eſt longue de 7 pouces. Ses oreilles ſont très courtes, larges, & arrondies. Tout ſon corps eſt couvert de poils d'un marron foncé. On le trouve en *Canada*, d'où il a été envoyé à M. l'*Abbé Aubry*, qui le conſerve dans ſon Cabinet.

Ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 15 circiter pollices longus eſt : cauda 7 pollices longa. Auriculas habet breviſſimas, latas, & rotundatas. In toto corpore veſtitur pilis coloris ſaturatè caſtanei. Habitat in *Canada*. Ex muſeo *Dom. Aubry*.

** 7. La Fouine.

Muſtela pilis in exortu albidis, caſtaneo colore terminatis, veſtita, gutture albo.., Foyna.

Muſtela fulvo nigricans, gula pallida. Martes. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. N°. 7.
Martes, aliis Foyna. *Raj. Syn. Quadr. p. 200.*
Martes faxorum, non fagorum, ſeu domeſticus. *Klein. Quadr. p. 64.*
Martes domeſtica. *Geſn. Quadr. Fig. p. 865. (Fig. bona).*
Geſn. Icon. Quadr. p. 97. Fig. p. 98. (Fig. bona),
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 332.
Jonſt. Quadr. p. 108. Fig. T. 64, (Fig. bona),
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 222.
Martes fagina. *Rzac. auct. p. 314,*
Les Italiens l'appellent Foina, *ou* Fouina. *Geſn.*
Les Allemands, Marder; Tach Marder; Huhss Marder; Stein Marder; Büch Marder. *Geſn. Rzac.*
Les Suédois, Mård. *Linn.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'un pied 5 pouces ; & celle de ſa queue de 11 pouces. Elle a les oreilles larges, & arrondies ; & la

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, unius eſt pedis & 5 pollicum ; caudæ 11 pollicum. Auriculas habet latas & ſubrotundas ; caudam lon-

Digitized by Google

gis pilis obſitam. Per univerſum corpus, excepto gutture albo, veſtitur pilis in exortu albidis, caſtaneo colore terminatis : qui caudam & 4 crura obtegunt, ex caſtaneo nigricant. Habitat in ſylvis, & circa domos.

queue couverte de longs poils. Tout le corps, excepté la gorge qui eſt blanche, eſt couvert de poils blanchâtres à leur origine, & terminez de marron : ceux qui couvrent les 4 jambes & la queue, ſont d'un marron noirâtre. On la trouve dans les bois, & auprès des maiſons.

** 8. LA MARTE.

Muſtela pilis in exortu ex cinereo albidis, caſtaneo colore terminatis, veſtita, gutture flavo... MARTES.

Muſtela fulvo nigricans, gula pallida. Martes. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 2.*
Faun. Suec. Linn. No. 7.
Muſtela Martes *Klein. Quadr. p. 64.*
Martes. *Raj. Syn. Quadr. p. 200.*
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 331.
Charlet. Exer. p. 20.
Martes ſylveſtris. *Geſn. Quadr. p. 867. Fig. p. 866. (Fig. bona).*
Jonſt. Quadr. p. 108.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 222.
Martes abietina. *Rzac. Auct. p. 314.*
Martis altera ſpecies nobilior. *Geſn. Icon. Quadr. p. 99.*
Les Eſpagnols l'appellent MARTA. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, MARTA ; MARTURO ; MARTARO ; & MARTORELLO. *Aldro.*
Les Pelletiers Boulonnois, MARTIRE. *Aldro.*
Les Allemands, FELD MARDER ; WILD MARDER. *Geſn.*
Les Polonois, KUNA. *Aldro. Rzac.*
Les Suédois, MÅRD. *Linn.*
Les Anglois, MARTIN, *ou* MARTLET. *Raj.*

Magnitudine & figurâ *Foynam* æmulatur ; ab eâ autem differt præcipuè gutturis colore flavo. In toto reliquo corpore veſtitur pilis in exortu ex cinereo albidis, caſtaneo colore terminatis. Syl-

Elle reſſemble à la *Fouine* par ſa figure, & ſa grandeur ; mais elle en differe principalement par la couleur de ſa gorge, qui eſt jaune. Tout le reſte de ſon corps eſt couvert de poils d'un gris blanchâtre à leur ori-

Digitized by Google

gine, & terminés de marron. Elle ne ſort gueres des bois. On la trouve en *Canada*, & rarement en *Europe*.

vas rariſſimè deſerit. Habitat in *Canadâ* : in *Europâ* rara.

9. La Marte Zibeline.

Muſtela obſcurè fulva, gutture cinereo... Martes Zibellina.

Muſtela Zibellina; Martes Scythica; Mus Sarmaticus; Mus Scythicus. *Klein. Quadr. p.* 64.
Muſtela Zibellina. *Raj. Syn. Quadr. p.* 201.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 6. *ſp.* 7.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 335.
Jonſt. Quadr. p. 108.
Charlet. Exer. p. 20.
Muſtela Sobella *Geſn. Quadr. p.* 869.
Rzac. Auct. p. 317.
Muſtela Scythica. *Rzac.*
Ictis Scythica, *Rzac.*
Satherius Ariſtotelis. *Charlet.*
Cebalus Niphi. *Charlet.*
Les Allemands l'appellent Zobel. *Geſn. Rzac.*
Les Polonois & les Illyriens, Sobol. *Geſn. Aldro. Rzac.*
Les Suédois, Sabbel. *Linn.*
Les Anglois, Sable. *Raj.*

Elle reſſemble à la *Marte*; mais elle eſt un peu plus petite. Tout ſon corps, excepté ſa gorge qui eſt griſe, eſt couvert de poils d'un fauve obſcur. La partie antérieure de ſa tête, & ſes oreilles ſont d'un gris blanchâtre. On la trouve en *Lithuanie*, dans la *Ruſſie blanche*, dans la partie Septentrionale de la *Moſcovie*, & dans la *Scandinavie*.

Martem figurâ ſuâ imitatur; ſed eâ paulò minor eſt. In toto corpore, excepto gutture cinereo, veſtitur pilis obſcurè fulvis. Capitis pars anterior, & auriculæ ſunt ex albido cinereæ. Habitat in *Lithuaniâ*, *albâ Ruſſiâ*, *Moſcoviæ* Septentrionali Regione, & *Scandinaviâ*.

** 10. Le

** 10. LE PUTOIS.

Mustela pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis, vestita, oris circumferentiâ albâ... PUTORIUS.

Mustela flavescente nigricans, ore albo, collari flavescente. Putorius. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 6. sp. 3.*
Faun. Suec. Linn. No. 8.
Mustela fœtida. Putorius. *Klein. Quadr. p. 63.*
Putorius. *Raj. Syn. Quadr. p. 199.*
Gesn. Quadr. Fig. p. 868. (Fig. sat bona).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 99. [Fig. sat bona].
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 329. Fig. p. 330. (Fig. sat bona).
Jonst. Quadr. p. 107. Fig. T. 64. sub isto nomine, Martes. [*Fig. sat bona*].
Charlet. Exer. p. 20.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 236.
Rzac. Auct. p. 329.
Martes domestica Matthioli. *Rzac.*
Les Picards l'appellent CATHARET. *Gesn.*
Les Italiens, FOETTA. *Gesn.* PUZOLO. *Aldro.*
Les Savoyards, POUTTET. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, ILTIS ; ULK ; BUNTSING. *Gesn.*
Les Illyriens ou les Bohémiens, TCHORZ. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, VYDRA. *Gesn. Aldro.* TCHORZ. *Rzac.*
Les Habitans de la Province de Skone, ILLER. *Linn.*
Les Anglois, POLECAT, *ou* FITCHET. *Raj.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ initium usque, 13 est pollicum; caudæ 5 ½ pollicum. Auriculas habet breves, latas & subrotundas. Per universum corpus vestitur pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis in toto corpore, exceptis lateribus, in quibus colore dilutè castaneo terminantur. Tota oris circumferentia alba est. Habitat in sylvis.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 13 pouces ; & celle de sa queue de 5 ½ pouces. Il a les oreilles courtes, larges & arrondies. Tout son corps est couvert de poils d'un gris blanchâtre à leur origine, & terminés de noirâtre par tout le corps, excepté aux côtés, où ils sont terminés de marron clair. Tout le tour de sa bouche est blanc. On le trouve dans les bois.

Digitized by Google

11. Le Putois rayé.

Muſtela nigra, tæniis in dorſo albis... Putorius striatus.

Muſtela Americana fœtida. *Klein. Quadr. p.* 64.
Putois. *Cat. Tom. II. Fig. p.* 62. [*Fig. tres bonne*].

Il eſt à peu-près de la grandeur du précédent; mais il a le muſeau un peu plus long. Il eſt noir, avec 5 bandes blanches ſur le dos, dont une s'étend depuis le derriere de la tête, tout le long du milieu du dos juſqu'à la queue, & deux autres de chaque côté, qui luy ſont paralleles. On le trouve dans tout le *Continent Septentrional d'Amérique.*

Præcedentem magnitudine circiter adæquat; ſed roſtro longiore donatur. Pilis veſtitur nigris, tæniis 5 in dorſo albis, quarum media à cervice, in medio dorſo, ad caudam uſque decurrit, duabus utrinque aliis mediæ paralleliſ. Habitat in omni *Americæ Septentrionali Regione.*

** 12 L'Ichneumon ou la Mangouste: *Vulgairement* le Rat de Pharaon.

Muſtela pilis ex albido & nigricante variegatis, veſtita... Ichneumon: Mus Pharaonis vulgò.

Muſtela Ægyptiaca. Ichneumon; i. e. Inveſtigator. Mus Pharaonis; Mus Ægypti; Damula; Donola; Muſtela Ægypti peculiaris; Lutra Ægypti. *Klein. Quadr. p.* 64.
Meles unguibus uniformibus leucophæa. Ichneumon. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 10. *ſp.* 3.
Ichneumon. *Raj. Syn. Quadr. p.* 202.
Geſn. Quadr. Fig. p. 635. [*Fig. mala*].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 102. [*Fig. malis*].
Jonſt. Quadr. p. 105. *Fig. T.* 67. (*Fig. mala*)
Charlet. Exer. p. 19.
Bell. de Aquat. p. 44. *Fig. p.* 45. (*Fig. mala*).
Bell. obſ. Fig. p. 96. (*Fig. mala*).
Ichneumon, ſive Lutra Ægypti. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 298. *Fig. p.* 303. [*Fig. mala*].
Ichneumon, ſeu Mus Pharaonis. *Proſp. Alp. Ægypt. p.* 234. *Fig. T.* 14. *F.* 3. (*Fig. mala*).
Ichneumon. *Kolbe. Tom. III. p.* 52. *Fig. p.* 4. (*Fig. mauv*).

Digitized by Google

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ initium uſque, 1 eſt pedis cum 9 pollicibus; caudæ 1 ½ pedis. Anteriora crura, à ventre ad apicem unguium, 5 circiter pollices longa ſunt; poſteriora verò paulò longiora. Auriculas habet breviſſimas, latas, & ſubrotundas; caudam in exortu craſſam, in acumen deſinentem. In toto corpore, excepto ventre ex ruſo flavicante, veſtitur pilis, ab exortu ad apicem uſque, ex albido & nigricante variegatis. Habitat in *Ægypto*.

Alia eſt *Ichneumonis* ſpecies, ab iſtâ diſcrepans magnitudine tantùm quâ ei cedit: ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, 13 tantùm pollices longa eſt; & caudæ longitudo 9 pollices æquat. Ex muſeo *Realmurian o.*

Ichneumon cujus *Seba* deſcriptionem dedit *Vol. I. p.* 66. & figuram *T.* 41. *Fig.* 1. idem cum iſto eſſe videtur. Deſcriptio quam hujus dedit, iſti ſat benè convenit, & figura eum perfectè repræſentat. A *Ceylonenſi Inſulâ* ad eum vivus miſſus eſt.

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'un pied 9 pouces; & celle de ſa queue de 1 ½ pied. Ses jambes de devant ont environ 5 pouces de long, depuis le ventre juſqu'au bout des ongles; & celles de derriere ſont un peu plus longues. Il a les oreilles très courtes, larges & arrondies; la queue groſſe à ſon origine, & finiſſant en pointe. Tout ſon corps, excepté le ventre, qui eſt d'un roux jaunâtre, eſt couvert de poils variés, depuis leur origine juſqu'à leur extrémité, de noirâtre & de blanchâtre. On le trouve en *Egypte*.

Il y en a une ſeconde eſpece, qui ne differe de celle-ci que parce qu'elle eſt beaucoup plus petite: elle n'a, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, que 13 pouces de long, & ſa queue 9 pouces. Elle eſt dans le Cabinet de *M. de Reaumur.*

L'Ichneumon que *Seba* a décrit *Tom. I. p. 66.* & dont il a donné la figure *Pl. 41. Fig. 1.* reſſemble beaucoup à celui-ci. La deſcription luy convient aſſez, & la figure encore mieux. On le luy a envoyé vivant de *l'Iſle de Ceylan.*

** 13. La Genette.

Muſtela caudâ ex annulis alternatim albidis & nigris variegatâ. Genetta.

Muſtela caudâ annulis nigris albidiſque cinctâ. Genetta. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 6. ſp. 8.*
Genetta, vel Ginetta. *Raj. Syn. Quadr. p. 201.*
Coati, Ginetta Hiſpanis. *Klein. Quadr. p. 73.*
Genetta. *Geſn. Quadr. p. 619. Pellis Fig. p. 1102. [Fig. bona].*
Geſn. Icon. Quadr. p. 70. Fig. p. 71. (Fig. ſat bona). Pellis ibi Fig. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 337. Fig p. 339. [Fig. ſat bona].
Jonſt. Quadr. p. 109. Fig. T. 72. (Fig. ſat bona).
Bell. obſ. Fig. p. 76. (Fig. ſat bona).
Genetta ; Catus Hiſpaniæ, & Genethocatus. *Charlet. Exer. p. 20.*
Les Allemands l'appellent Genithkatz. *Geſn.*
Les Suédois, Desmanskatt. *Linn.*

Elle eſt à peu-près de la grandeur d'un *Chat* ; mais elle a le corps plus effilé. Son muſeau eſt allongé, & très pointu : ſes oreilles reſſemblent à celles du *Chat*. Tout ſon corps eſt couvert de poils variés de brun & de blanchâtre, avec des taches noires par tout le corps, excepté à la tête & aux jambes. Sa queue eſt garnie d'anneaux alternativement noirs & blanchâtres. On la trouve en *Eſpagne*, & en *Turquie*.

Magnitudine *Felem domeſticam* circiter æquat ; ſed corpore graciliori donatur. Roſtrum habet elongatum & acutiſſimum ; auriculas auriculis *Felinis* ſimiles. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex fuſco & albido variegatis, maculis nigris in toto corpore, exceptis cruribus & capite, diſperſis. Cauda annulis alternatim albidis & nigris cingitur. Habitat in *Hiſpaniâ*, & *Turcicâ*.

XXXVII.

Le Genre du Blaireau.

Son caractere eſt D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire ;

XXXVII.

Genus Melis.

Hujus character eſt Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex ;

Digitized by Google

Digiti unguiculati in singulis pedibus quinque,
Omnes à se invicem separati:
Pollex aliis digitis proximus.

A chaque pied cinq doigts onguiculés,
Tous séparés les uns des autres:
Le pouce proche des autres doigts.

** 1. Le Blaireau, ou Taisson.

Meles pilis ex sordidè albo & nigro variegatis vestita, capite tæniis alternatim albis & nigris variegato... Meles.

Meles ungvibus anticis longissimis. Taxus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 16. sp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 15.
Taxus, sive Meles. *Raj. Syn. Quadr. p. 185.*
Meles. *Gesn. Quadr. p. 778. Fig. p. 1103. (Fig. bona).*
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 86. (Fig. bona).
Rzac. Aucl. p. 315.
Taxus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 263. Fig. p. 266. (Fig. mala).*
Jonst. Quadr. p. 101. Fig. T. 64. [Fig. bona].
Charlet. Exer. p. 18.
Melis, sive Taxo; Taxus; Tassus; Blerellus. *Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 333.*
Melis seu Taxus; Blerellus. *Rzac. Aucl. p. 327.*
Coati caudâ brevi; Taxus; Meles. Coati griseus. *Klein. Quadr. p. 73.*
Les Grecs l'appellent Μελὶ.
Les Espagnols, Tasugo; Texon. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, Tasso. *Gesn. Aldro.*
Les Grisons, Tasch. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, Tachs, *ou* Dar. *Gesn. Aldro.* Dachs. *Rzac.*
Les Illyriens, Gezwecz. *Gesn. Aldro.*
Les Polonois, Jazwiec; Borsuk; Kot-dziki; Zbik. *Rzac.*
Les Suédois, Gräf-Svin. *Linn.*
Les Anglois, Badger; Brock, *ou* Gray. *Raj. Gesn.*
Les Anglois Septentrionaux, Pate. *Raj.*

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ exortum, 2 ½ circiter est pedum; caudæ 10 pollicum. Oculos habet parvos pro ratione corporis; auriculas breves, partim albas, partim nigras; cauda brevissima; un-

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, est d'environ 2 ½ pieds; & celle de sa queue de 10 pouces. Ses yeux sont petits; ses oreilles courtes, partie blanches, & partie noires; ses jambes très courtes; ses ongles noirs: ceux

Digitized by Google

des pieds de devant ſont très longs & forts. Il a immédiatement audeſſous de l'origine de la queue, & audeſſus de l'anus, un large orifice, qui s'ouvre comme une eſpece de petit ſac, peu profond, & qui a la figure d'une petite bourſe : de la ſuperficie intérieure de cette bourſe ſuinte, mais en petite quantité, une ſubſtance blanche, qui a une certaine conſiſtance, & à laquelle je n'ai trouvé aucune odeur particuliere. Tout ſon corps eſt couvert de poils rudes au toucher : ceux qui couvrent la partie ſupérieure du corps, & la queue, ſont d'un blanc ſale à leur origine, & variés de noir & de ce même blanc ſale dans le reſte de leur longueur : ceux qui couvrent la partie inférieure du corps, les 4 jambes, & les 4 pieds ſont noirs. Sa tête eſt variée de larges bandes longitudinales alternativement blanches & noires ; ſçavoir une bande blanche, qui s'étend depuis le nez juſqu'à l'occiput ; audeſſous de celle là, de chaque côté eſt une bande noire, qui s'étend depuis les narines juſqu'au delà des oreilles, en paſſant par les yeux ; & encore audeſſous de ces dernieres eſt une bande blanche de chaque côté, qui s'étend dans toute la longueur des joues. On le trouve dans les bois.

gues pedum anteriorum longiſſimos & validos, pedum poſteriorum breves, omnes nigros. Statim ſub caudæ exortu, ſuprà anum, latum habet orificium, quod in folliculum aperitur, non admodùm profundum, burſæ aut ſacculi figurâ, ex cujus ſuperficie internâ exſudat, parvâ quidem quantitate, ſubſtantia quædam alba, quâdam conſiſtentiâ prædita, in quâ nullum inſignem odorem reperi. In toto corpore veſtitur pilis ad tactum rigidis : qui partem corporis ſuperiorem obtegunt, ſunt in exortu ſordidè albi, & in reliquâ longitudine ex nigro & ſordidè albo variegati : qui verò partem corporis inferiorem, 4 crura & pedes cooperiunt, ſunt nigri. Caput tæniis latis longitudinalibus alternatim albis & nigris variegatur ; à naſo ſcilicet ad occipitium uſque, tænia protenditur alba ; infrà eam utrinque, à naribus, per oculos, nigra ultrà auriculas tænia producitur : deindè iterùm inferiùs adhuc utrinque tænia eſt alba, ſecundum genarum longitudinem protenſa. Habitat in ſylvis.

Digitized by Google

** 2. Le Blaireau Blanc.

Meles suprà alba, infrà ex albo flavicans... Meles alba.

Ab extremitate rostri ad caudæ initium, 1 pede cum 9 pollicibus longa est. Oculos habet parvos, pro ratione corporis; auriculas breves; crura brevissima; ungues albos. Per universum corpus vestitur pilis densissimis, in parte corporis superiore albis, in inferiore autem ex albo flavicantibus. Habitat in *Eboraco novo*. Ex museo *Realmuriano*.

Il a, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, 1 pied 9 pouces de long : sa queue est longue de 9 pouces. Ses yeux sont petits, à proportion de la grandeur de son corps; ses oreilles courtes; ses jambes très courtes; ses ongles blancs. Tout son corps est couvert de poils très épais, blancs dans toute la partie supérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. On le trouve dans la *Nouvelle Yorck*, d'où il a été apporté à M. *de Reaumur*.

3. Le Blaireau de Surinam.

Meles ex saturatè spadiceo nigricans, caudâ fuscâ, annulis flavicantibus quasi cinctâ... Meles Surinamensis.

Ichneumon de Yzquiepatl, seu Vulpecula Americana, quæ colore Maizium torrefactum æmulatur. *Seb. vol. I. p.* 68. *Fig. T.* 42. *F.* 1. [*Fig. bona*].

Yzquiepatl, seu Vulpecula, quæ Maizium torrefactum colore æmulatur; Hernandezii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 181.

Hernand. Hist. Mex. Fig. p. 332. (*Fig. non æquè bona*).

Coati Hernandezii. *Klein. Quadr. p.* 72.

Vulpes Indica, *Izquiepotl* dicta. *Jonst. Quadr. p.* 94.

Les Americains l'appellent Quasie. *Seba.*

Corporis longitudo 1 ¼ circiter est pedis. Breves habet auriculas; sinciput rotundum; rostrum elongatum; crura brevia; ungues nigros, longos & incurvos. In toto corpore,

La longueur de son corps est d'environ 1 ½ pied. Il a les oreilles courtes; le devant de la tête rond; le museau allongé; les jambes courtes; les ongles noirs, longs & recourbés. Tout son

Digitized by Google

corps, excepté ſon ventre, qui eſt jaune, eſt couvert de poils d'un marron foncé & noirâtre: la couleur du devant de la tête eſt moins foncée que celle du dos. Sa queue, qui eſt de la longueur de ſon corps, eſt brune, & comme annelée de jaunâtre. On le trouve dans la *Nouvelle Eſpagne*, & à *Surinam*.

Hernandez dit qu'il y en a deux autres eſpeces; l'une appellée *Yzquiepatl*, qui differe du précédent par pluſieurs bandes blanches qu'il a ſur le dos; & l'autre appellée *Conepatl*, qui en differe par une ſeule bande blanche qu'il a de chaque côté, & qui s'étend auſſi ſur la queue.

excepto ventre flaveſcente, veſtitur pilis ex faturatè ſpadiceo nigricantibus: ſincipitis color colore dorſi paulò dilutior eſt. Cauda, quæ corporis longitudinem adæquat, fuſca eſt, annuliſque flavicantibus quaſi cincta. Habitat in *Novâ Hiſpaniâ*, & *Surinamenſi Inſulâ*.

Hernandez alias duas ſpecies refert; quarum una *Yzquiepatl* vocata, à præcedente differt faſciis multis in dorſo candentibus; altera verò *Conepatl* vocata, ab eâ diſcrepans, unicâ tantùm, utrinque ductâ, candente faſciâ, perque caudam ipſam eodem modo delatâ.

4. La Civette.

Meles faſciis & maculis albis, nigris, & rufeſcentibus variegata... Civetta.

Meles unguibus uniformibus cinerea. Zibethica. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 10. ſp. 2.*

Coati, Civetta vulgò. *Klein. Quadr. p. 73.*

Animal Zibethicum. *Raj. Syn. Quadr. p. 178.*

Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p. 580. & 581. (Fig. ſat bonis).

Animal Zibethi. *Aldro. Quadr. dig. viv. p. 340. Fig. p. 343. [Fig. ſat bona].*

Jonſt. Quadr. p. 109. Fig. T. 72. (Fig. ſat bona).

Charlet. Exer. p. 20.

Felis Zibethi. *Geſn. Quadr. Fig. p. 948. (Fig. ſat bona).*

Catus aut Felis Zibethi. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 72. & 126. [Fig. ſat bonis].*

Catus Zibethicus Scaligeri. *Jonſt. Charlet.*

Hyæna odorifera Zibethum gignens, quæ Civetta vulgò. *Jonſt. Quadr. p. 151. Fig. T. 73. (Fig. ſat bona).*

Hyæna veteribus nuncupata, nunc autem Civetta. *Bell. Obſ. Fig. p. 94. (Fig. ſat bona).*

Civette.

(Civette. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 159. *Fig. Pl.* 23. [*Fig. très bonne*].

Les Suédois l'appellent ZIBET. *Linn.*

Les Anglois, CIVET CAT. *Raj.*

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum, 2 eſt pedum & 5 pollicum. Caput habet ſtrictum; roſtrum elongatum; oculos parvos, longos & nigros; auriculas auricularum *felinarum* circiter æmulas, ſed minores & obtuſiores; crura breviſſima, anteriora præſertim, quæ à ventre ad unguium apicem uſque 5 tantùm pollices longa ſunt; ungues nigros, rectos & obtuſos. Caput & crura pilis brevibus obſita ſunt: in reliquo corpore veſtitur pilis duorum generum; alii enim ſunt breves, molles, *lanæ* inſtar criſpi, & ex cinereo fuſci; alii multò longiores, ex albo, nigro, & ruſeſcente variegati: unde fit ut corporis pars ſuperior faſciis & maculis magnitudine inæqualibus, aliis albis, aliis nigris, aliis ruſeſcentibus variegata videatur. Naſi extremitas eſt nigra; roſtrum album. In quolibet capitis latere maxima eſt macula nigra, in quâ oculus ſitus eſt. Pili partem capitis ſuperiorem tegentes, ex albo & nigro variegati ſunt: unde pars iſta griſea apparet. Auriculæ

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 pieds 5 pouces. Elle a la tête étroite; le muſeau long; les yeux petits, noirs & longs; les oreilles à peu-près ſemblables à celles des *Chats*, mais moins pointuës, & plus petites; les jambes très courtes, ſurtout celles de devant, qui n'ont que 5 pouces depuis le ventre juſqu'au bout des ongles, leſquels ſont noirs, droits & obtus. Sa tête & ſes jambes ſont couvertes de poils courts: tout le reſte de ſon corps eſt couvert de deux ſortes de poils; l'un court, doux, friſé comme de la *laine*, & d'un gris brun; & l'autre beaucoup plus long, & varié de blanc, de noir, & de rouſsâtre: de là vient que le deſſus du corps de l'animal paroît varié de bandes & de taches de différentes grandeurs, les unes blanches, les autres noires, & les autres rouſsâtres. Le bout du nez eſt noir, & le muſeau blanc. Il y a deux grandes taches noires, une de chaque côté de la tête, dans leſquelles ſont les yeux. Le deſſus de la tête paroît gris, par le meſlange du blanc & du noir, dont chaque poil eſt varié. Les oreil-

les ſont noires en dehors & bordées de blanc, & garnies en dedans d'un long poil blanc. La gorge, le ventre, & les 4 pieds ſont noirs. La queue eſt noire par deſſus, & mêlée d'un peu de blanc par deſſous. L'ouverture qui conduit aux receptacles, où s'amaſſe la matiere odorante, eſt immédiatement audeſſous de l'anus, & a 3 pouces de long; & lorſqu'on la dilate, elle a plus de 1 ½ pouce de large. Les ſacs qui ſervent à la ſécrétion de cette matiere odorante, ſont très bien décrits dans *les Mem. de l'Académie*, à l'endroit cité cy-deſſus. On la trouve à la *Chine*, & dans la *Nouvelle Eſpagne*.

extùs nigræ, albo circumdatæ, intùs longis pilis albis obſitæ ſunt: guttur, venter, & pedes 4 nigri. Cauda in parte ſuperiore eſt nigra, in inferiore verò ex albo variegata. Statim infrà anum orificium habet 3 pollices longum, cumque dilatatur 1 ½ pollice & ampliùs latum: quod orificium in receptacula, in quibus colligitur ſubſtantia quædam odorata, conducit. Optimam vide folliculorum, hujus ſubſtantiæ odoratæ ſecretioni inſervientium, deſcriptionem, apud *Academicos Pariſienſes*, loco ſuprà citato. Habitat in *Sinenſi Regione*, & *Novâ Hiſpaniâ*.

XXXVIII.

Le Genre de l'Ours.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous ſéparés les uns des autres:
De s'appuyer ſur le talon en marchant.

XXXVIII.

Genus Urſinum.

Hujus character eſt.
Dentes inciſores in utràque maxillâ ſex:
Digiti unguiculati,
Omnes à ſe invicem ſeparati:
Pedes calcaneis incedentes.

** 1. L'OURS.

Urſus niger, caudâ unicolore... URSUS.

Urſus caudâ abruptâ. Urſus vulgò. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 4. ſp. 1. Faun. Suec. Linn. No. 2.*
Urſus. *Raj. Syn. Quadr. p. 171.*
Klein. Quadr p. 82.
Geſn. Quadr. Fig. p. 1065. (Fig. ſat bona).

Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 65. (Fig. eadem).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 117. Fig. p. 119. (Fig. ut suprà).
Jonst Quadr. p. 86. Fig. T. 55. (Fig. bonis).
Charlet. Exer. p. 14.
Mus. Worm. p. 318.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 225.
Rzac. Auct. p. 321.
Ours. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 83. Fig. Pl. 9. (Fig. très bonne, excepté le nez qui est trop court).*
Les Hébreux l'appellent Dob. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, Duba. *Gesn. Aldro.*
Les Arabes, Dubbe. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Ἄρκτος.
Les Italiens, & les Espagnols, Orso. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, Bär, *ou* Beer. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Bohémiens, Nedwed. *Gesn.*
Les Polonois, Wewer. *Gesn.* Niedzwiedz. *Rzac. Klein.*
Les Suédois, Biörn. *Linn.*
Les Anglois, Bear. *Raj. Gesn.*

Longitudo corporis, ab extremitate rostri ad caudæ exortum usque, 5 ½ pedum est; capitis, à naribus ad occipitium, 1 pedis & 5 pollicum; caudæ 5 pollicum. Oculos habet, pro mole corporis, valdè exiguos; auriculas sat breves, versùs apicem rotundatas; crura brevia; in singulis pedibus digitos 5 validis, incurvis, & nigris unguibus munitos; pollice minimo, & ab aliis digitis non remoto. In toto corpore vestitur pilis longis & densis, in aliquibus nigris, in aliis ex fusco nigricantibus, & in aliis ex nigro & argenteo mixtis. Habitat in *Alpibus*, inque *Germaniâ*, *Poloniâ*, *Lithuaniâ*, *Russiâ*, *Moscoviâ*, *Nor-*

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 5 ½ pieds; celle de sa tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput, de 1 pied 5 pouces; & celle de sa queue de 5 pouces. Ses yeux sont très petits, à proportion de la grandeur de son corps; ses oreilles assez courtes & arrondies vers le bout; ses jambes courtes. Il a à chaque pied 5 doigts armés d'ongles forts, crochus, & noirs: le pouce est le plus petit, & n'est point séparé des autres doigts. Tout son corps est couvert de poils longs & épais, noirs dans quelques uns, dans d'autres d'un brun noirâtre, & dans d'autres mêlés de noir & d'argenté. On le trouve dans les *Alpes*, en *Allemagne*,

en *Pologne*, en *Lithuanie*, en *Ruſſie*, en *Moſcovie*, en *Norvege*, & dans tous les Pays du *Nord*.

vegiâ, & in omnibus *Septentrionalibus* Regionibus.

** 2. L'OURS BLANC.

Urſus albus, caudâ unicolore... URSUS ALBUS.

Urſus albus Martenſii. *Klein. Quadr. p.* 82.
Urſus albus. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 120.
Jonſt. Quadr. p. 88.
Muſ. Worm. p. 319.
Ours blanc. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 47.
Voy. de la B. de Hud. Tom. I. p. 56. *Fig. Tom. II. p.* 24. (*Fig. bonne*).

Il differe du précédent par ſa tête qui eſt plus longue, par ſon col qui eſt beaucoup plus mince, & par ſa couleur qui eſt blanche. On le trouve dans le *Nord*.

A præcedente differt capite longiore, collo multò graciliore, & colore, qui albus eſt. Habitat in *Septentrionalibus* Regionibus.

3. L'OURS DE LA BAYE DE HUDSON.

Urſus caſtanei coloris, caudâ unicolore, roſtro pedibuſque nigris... URSUS FRETI HUDSONIS.

Coati Urſulo affinis Americanus. *Klein. Quadr. p.* 74.
Petit Ours, ou Louveteau. *Edwars. Tom. II. Fig. p.* 103. (*Fig. bonne*).
Quickhatch, ou Wolverenne. *Voy. de la B. de Hud. Tom. I. Fig. p.* 58. (*Fig. bonne*).
Quickhatch. *Cat. App. p.* 29.

Il eſt un peu plus grand qu'un *Loup ordinaire*. Ses yeux ſont petits & noirs; ſes oreilles courtes & rondes: ſa queue eſt d'une longueur médiocre, & paroît plus petite à ſon origine que vers ſon bout; où elle eſt couverte de plus longs poils. Il a le muſeau & les 4 pieds noirs; le devant de la tête blanchâtre;

Magnitudine *Lupum vulgarem* paululùm ſuperat. Oculos habet parvos & nigros; auriculas breves & rotundas; caudam mediocris longitudinis, in exortu tenuiorem quàm versùs extremitatem, in quâ longioribus pilis obſita eſt. Roſtrum & pedes 4 ſunt nigri; ſinciput albidum; gut-

Digitized by Google

tur album, maculis nigris variegatum; reliquum corpus caſtanei coloris, in dorſo ſaturatioris. Habitat in *Freto Hudſonis*.

la gorge blanche, marquée de noir : tout le reſte de ſon corps eſt d'un châtain plus foncé ſur le dos qu'ailleurs. On le trouve à la *Baye de Hudſon*.

** 4. LE COATI.

Urſus caudâ annulatim variegatâ... COATI.

Urſus caudâ elongatâ. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 4. ſp. 2.*
Vulpi affinis Americana. *Raj. Syn. Quadr. p. 179.*
Sloane. Vol. II. p. 329.
Coati Braſilienſium. *Klein. Quadr. p. 72.*
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 228. [*Fig. ſat bona*].
Coati. *Jonſt. Quadr. p. 95.*
Muſ. Worm. Fig. p. 319. (*Fig. optima*).
Guati. *Jo. de Laet. p. 553.*
Vulpes Americana, *Mapach* dicta. *Charlet. Exer. p. 15.*
Mapach. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 74.* [*Fig. ſat bona exceptis pedibus*].
Euſ. Nieremb. Fig. p. 175. (*Fig. eadem ut ſuprà*).
Mapach, ſeu Animal cuncta prætentans manibus. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p. 2.*
Coati ſimplement dit. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. 2. p. 23.*
Raccoon. *Cat. App. p. 29.*
Les Indiens l'appellent MAPACH. *Euſ. Nieremb.*
Les Guianois, QUACHY. *Barr.*

Longitudine corporis *Felem* circiter adæquat; craſſitie verò eam multùm ſuperat. Caput habet latum; roſtrum acuminatum; maxillam inferiorem ſuperiore breviorem; oculos exiguos; auriculas breves & ſubrotundas; crura brevia; in ſingulis pedibus digitos quinque ſat longos, acutis unguibus munitos; pedes poſteriores anterioribus majores; plantam pedum piis omninò deſtitutam. In toto corpore, exceptis quatuor

Il eſt à peu-près de la grandeur d'un *Chat*; mais il a le corps beaucoup plus gros. Il a la tête large; le muſeau pointu; la mâchoire inférieure plus courte que la ſupérieure; les yeux petits; les oreilles courtes & arrondies; les jambes courtes; à chaque pied cinq doigts aſſez longs, armés d'ongles aigus. Ses pieds de derriere ſont plus grands que ceux de devant. La plante des pieds eſt tout à fait dénuée de poils. Tout ſon corps, exceptés ſes quatre pieds, qui

ſont couverts de poils courts, eſt couvert de poils longs & épais, gris & terminés de noir ſur le dos, & roux & terminés de gris ſur le ventre. Son muſeau eſt d'un blanc ſale, excepté une bande tranſverſale noire, qui paſſe par les yeux. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de blanc jaunâtre. (Il y en a dont tout le poil eſt d'un roux brun : ils ont auſſi la queue annelée). Ses pieds de devant luy ſervent de mains; ſoit qu'il s'en ſerve, comme les *Chiens*, pour tenir ce qu'il mange; ſoit pour le porter à ſa bouche, comme l'*Ours*. On le trouve en *Amérique*.

pedibus pilis brevibus tectis, veſtitur pilis longis & denſis, cinereis apice nigro in dorſo, in ventre verò in exortu rufis in exitu cinereis. Facies ei ſordidè albicat, excepta areola tranſverſa nigra, per oculos ducta. Cauda annulis cingitur alternatim nigris & ex albo flavicantibus. (Sunt qui in toto corpore veſtiuntur pilis ex rufo fuſcis : cauda ipſorum annulatim etiam variegatur.) Pedibus anterioribus velut manibus utitur; ſive, more *Canis*, anterioribus pedibus teneat cibum; ſive, ſicut *Urſus*, cibum ori admoveat. Habitat in *Americâ*.

** 5. Le Coati-Mondi.

Urſus naſo producto & mobili, caudâ unicolore... Coati-Mondi.

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 15 pouces; & celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, d'environ 6 pouces. Il a le nez fort long, & mobile comme celuy d'un *Cochon*; la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que la ſupérieure; les oreilles courtes & rondes; à chaque pied 5 doigts armés d'ongles noirs, longs & crochus. Les doigts des pieds de

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 15 circiter eſt pollicum; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 6 circiter pollicum. Naſum habet longiſſimum, naſi *Porcini* inſtar mobile; maxillam inferiorem ſuperiore multò breviorem; auriculas breves & rotundas; in ſingulis pedibus digitos 5 nigris, longis & incurvis unguibus munitos. Pedum anteriorum digiti digi-

Digitized by Google

ſis pedum poſteriorum paulò ſunt longiores: plantæ pedum pilis omninò denudatæ. In toto corpore veſtitur pilis brevibus ex cinereo fuſcis. Pili caudæ ejuſdem ſunt coloris. Apud D. *Lièvre* Diſtillatorem hoc Animal vidi.

devant ſont un peu plus longs que ceux de derriere. La plante des pieds eſt tout à fait dénuée de poils. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, d'un gris brun : ceux de ſa queue ſont de la même couleur. Je l'ai vû chez M. *Lievre* Diſtillateur.

** 6. LE COATI-MONDI A QUEUE ANNELÉE.

Urſus naſo producto & mobili, caudâ annulatim variegatâ.

Vulpes minor roſtro ſuperiori longiuſculo, caudâ annulatim ex nigro & ruſo variegatâ. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. p.* 167.
Coati Mondi Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 180.
Klein. Quadr. p. 72.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 228.
Taxus Suillus. *Aldrov. Quadr. dig. viv. Fig. p.* 267. (*Fig. ſat bonâ.*)
Coati Mondi. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 2. *p.* 17. *Fig. Pl.* 37. (*Fig. très bonne.*)

Longitudo corporis, ab occipitio ad caudæ exortum uſque, 16 eſt pollicum; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 6 ½ pollicum. Caudam habet toto corpore longiorem; naſum longiſſimum, naſi *Porcini* inſtar mobile; maxillam inferiorem ſuperiore multò breviorem; oculos valdè exiguos; auriculas rotundas, extùs pilis breviſſimis veſtitas, intùs verò pilis longis & albidis obſitas; in ſingulis pedibus digitos 5 nigris, longis & incurvis unguibus munitos; pedum anteriorum digitos digitis poſteriorum pedum paulò lon-

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 16 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 6 ½ pouces. Sa queue eſt plus longue que tout ſon corps. Il a le nez fort long, & mobile comme celuy d'un *Cochon*; la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que la ſupérieure; les yeux très petits; les oreilles rondes, & garnies en dehors de poils fort courts, & en dedans de poils plus longs & blanchâtres; 5 doigts à chaque pied, armés d'ongles noirs, longs & crochus. Les doigts des pieds devant ſont un peu plus longs

que ceux de derriere. La plante des pieds eſt tout à fait dénuée de poils. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, variés de roux & de noir dans la partie ſupérieure du corps, & tout à fait roux dans la partie inférieure. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de roux. On le trouve en *Amérique*.

giores; plantam pedum pilis omninò denudatam. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, in parte corporis ſuperiore ex rufo & nigro variegatis, in inferiore verò omninò rufis. Cauda ex rufo & nigro annulatim variegatur. Habitat in *Americâ*.

XXXIX.

Le Genre du Chat.

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à chaque mâchoire:
Les doigts onguiculés,
Tous ſéparés les uns des autres:
Les ongles crochus, & qui peuvent être retirés & cachés entierement.

Obſ. Toutes les eſpeces de ce Genre ont la tête ronde; le muſeau court; & la langue garnie de pointes, qui la rendent fort rude au toucher. Toutes auſſi, exceptés les deux dernieres, ont la queue très longue.

XXXIX.

Genus Felinum.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in utrâque maxillâ ſex:
Digiti unguiculati,
Omnes à ſe invicem ſeparati:
Ungues hamati, & retractiles.

Obſ. Omnes hujus generis ſpecies capite rotundo; roſtro brevi; & linguâ aculeis ſcabrâ donantur. Omnes etiam, exceptis duabus ultimis, caudâ longiſſimâ gaudent.

** 1. LE CHAT DOMESTIQUE.

FELIS DOMESTICA.

Felis caudâ elongatâ, auribus æqualibus. Catus. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 5. *ſp.* 6.
Faun. Suec. Linn. N° 3.
Catus Domeſticus; Felis Domeſtica. *Klein. Quadr. p.* 75.
Felis Domeſtica, ſeu Catus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 170.
Sloane. Vol. II. p 329.
Felis, ſeu Catus Domeſticus. *Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p.* 244.
Felis Domeſtica. *Jonſt. Quadr. p.* 126. *Fig. T.* 72. (*Fig. bona.*)

Charlet.

Digitized by Google

Charlet. Exer. p. 20.
Feles, vel Catus. *Gesn. Quadr. p.* 344. *Fig. p.* 345. (*Fig. bona*).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 28. (*Fig. bona.*)
Felis. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 564.
Les Hebreux l'appellent CATUL, & SCHANAR, *ou* SCHUNARA. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Αἴλουρος.
Les Sarasins, KATT. *Gesn.*
Les Espagnols, GATO, *ou* GATA. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, GATTA, *ou* GATTO. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, KATZ. *Gesn.*
Les Illyriens, KOCZKA. *Gesn.*
Les Polonois, KOC. *Rzac.*
Les Suédois, KATTA. *Linn.*
Les Anglois, CAT. *Raj. Gesn. Aldro.*

Felis est animal omnibus ità notum, ut descriptione non indigeat.

Le Chat est un animal trop connu pour qu'il soit nécessaire de le décrire.

** 2. LE CHAT SAUVAGE.

Felis pilis ex fusco, flavicante, & albido variegatis vestita; caudâ annulis alternatim nigris & ex sordidè albo flavicantibus cincta.... FELIS SYLVESTRIS.

Catus sylvestris ferus, vel feralis; Eques arborum. *Klein. Quadr. p.* 75.
Catus sylvestris. *Gesn. Quadr. p.* 353.
Gesn. Icon. Quadr. p. 97.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 217.
Felis sylvestris. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 582. *Fig. p.* 583. (*Fig. bona*).
Jonst. Quadr. p. 127. *Fig. T.* 72. (*Fig. bona*).
Charlet. Exer. p. 21.
Eques arborum, Germanis. *Gesn. Aldro.*
Les Hebreux l'appellent ZIIM. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols, GATO MONTÉS. *Gesn.*
Les Allemands, WILDE KATZE, *Rzac.*
Les Polonois, KOT DZIKI; ZBIK. *Rzac.*

Figurâ suâ *Felem domesticam* æmulatur; sed magnitudine eam paululùm antecellit. In pedibus anterioribus 5 digitis donatur, in posterioribus verò 4 tantùm: pollex,

Il ressemble par sa figure au *Chat domestique*; mais il est un peu plus grand. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux derriere: le pouce, dans les pieds de devant, est éloigné des

Digitized by Google

autres doigts, & articulé plus haut. Tout ſon corps eſt couvert de poils variés de brun, de jaunâtre, & de blanchâtre : le brun domine ſur le dos, & le blanchâtre ſous le ventre. Sa queue eſt annelée alternativement de noir & de blanc ſale & jaunâtre, & eſt terminée de noir. On le trouve dans les forêts.

in anticis pedibus, ab aliis digitis eſt remotus, & altiùs collocatus. Per univerſum corpus veſtitur pilis ex fuſco, flavicante, & albido variegatis : dorſum fuſcius eſt ; venter verò magis albidus. Cauda annulis alternatim nigris & ex ſordidè albo flavicantibus cingitur, nigroque colore terminatur. Habitat in ſylvis.

3. Le Chat sauvage tigré.

Felis ex griſeo flaveſcens, maculis nigris variegata... Felis sylvestris tigrina.

Felis ſylveſtris tigrinus, ex Hiſpaniolâ. *Seb. Vol. I. p.* 77. *Fig. T.* 48. *F.* 2. (*Fig. bona*).
Feles fera tigrina. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 153.
Catus *Tepe Maxtlaton* dictus, Tigrinus, ex Hiſpaniolâ. *Klein. Quadr. p.* 75.
Tepe Maxtlaton. *Fern. Hiſt. N. Hiſp. p.* 9.
Maraguao, ſive Maracaia. *Maregr. Hiſt. Br. p.* 233.
Chat-Tigre. *Kolbe. Tom. III. p.* 50.
Les Eſpagnols l'appellent Tepe Maxtlaton. *Seba.*
Les François de la Guiane, Chat-Tigre. *Barr.*
Les Guianois, Malakaya. *Barr.*

Il eſt de la grandeur du *Chat domeſtique*. Il a les yeux grands & noirs ; les oreilles courtes & arrondies ; la queue longue & pointuë. Tout ſon corps eſt d'un gris jaunâtre, marqué de taches noires. On le trouve au *Cap de Bonne Eſpérance*, & en *Amérique*.

Magnitudine *Felem domeſticam* adæquat. Ingentes habet & nigros oculos ; auriculas breves & ſubrotundas ; caudam longam & acutam. Color totius corporis eſt ex griſeo flavicans, maculis nigris inſperſis. Habitat in *Capite Bonæ Spei*, & *Americâ*.

** 4. Le Chat d'Angora.

Felis pilis longiſſimis toto corpore veſtita... Felis Angorensis.

Digitized by Google

Felis caudâ elongatâ, auribus penicilliformibus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 5.*

Figurâ suâ *Felem domesticam* imitatur : ab ea autem differt pilis longissimis, quibus corpus vestitur. Habitat in *Angorâ.*

Il ressemble au *Chat domestique* par sa figure : il en differe seulement par ses poils qui sont tres longs. On le trouve à *Angora.*

** 5. Le Lion.

Felis caudâ in floccum desinente... Leo.

Felis caudâ elongatâ, floccosâ, thorace jubato. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 1.*
Leo. *Raj. Syn. Quadr. p. 162.*
Klein. Quadr. p. 81.
Gesn. Quadr. Fig. p. 642. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 66. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 2. Fœm. Fig. p. 6. (Fig. sat bona).
Jonst. Quadr. p. 78. Fig. T. 50. & 51. (Fig. bonis).
Charlet. Exer. p. 14.
Musf. Worm. p. 317.
Bont. Ind. ori. p. 55.
Lion. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. Le Mâle p. 3. Fig. Pl. 1. La Femelle p. 19. Fig. Pl. 3. (Fig. très bonnes).*
Kolbe. Tom. III. p. 2. Fig. p. 4. F. 1. & 2. (Fig. bonnes).
Les François appellent le mâle Lion ; *& la femelle*, Lionne.
Les Latins, le mâle, Leo ; *& la femelle*, Lœna.
Les Hebreux, Labi ; Laisch ; Ari ; Ariech ; Gur ; & Kephir. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, Ariavan. *Gesn. Aldro.*
Les Grecs, Λέων.
Les Arabes, Asad. *Gesn. Aldro.*
Les Perses, Gehad. *Gesn. Aldro.*
Les Sarasins, Sebey. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols, Leon. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, Leone. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands & les Illyriens, Lew. *Gesn. Aldro.*
Les Suédois, Leyon. *Linn.*
Les Anglois, Lion. *Raj. Gesn. Aldro.*

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum usque, 7 ½ pedes æquat; altitudo, à parte superiore

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 7 ½ pieds ; & sa hauteur, depuis la

Digitized by Google

partie supérieure du dos jusqu'à terre, de 4 ½ pieds. Sa queue est très longue, & est terminée par un bouquet de poils. Sa tête est grosse : ses yeux sont brillants ; ses oreilles courtes & arrondies. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. La couleur de ses poils est fauve dans la partie supérieure du corps, & d'un blanc jaunâtre dans la partie inférieure. Lorsqu'il est vieux, son col & sa poitrine sont couverts d'une très longue criniere.

La femelle est beaucoup plus petite que le mâle ; & quelque vieille qu'elle soit, elle n'a jamais de criniere.

On le trouve en *Asie* & en *Afrique*.

dorsi ad terram, 4 ½ pedes. Caudam habet longissimam, in pilorum floccum desinentem ; caput crassum ; splendentes oculos ; auriculas breves & subrotundas ; in pedibus anterioribus 5 digitos, in posterioribus 4 tantùm. Pilorum color in parte corporis superiore est fulvus, in inferiore ex albo flavicans. Cum senescit animal, collum ipsius & pectus jubâ longissimâ ornantur.

Fœmina mare multò minor est ; & quamquàm senectutem adepta fuerit nunquam jubata est.

Habitat in *Asiâ* & *Africâ*.

** 6. LE TIGRE.

Felis flava, maculis longis nigris variegata... TIGRIS.

Felis caudâ elongatâ, maculis virgatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 2.*
Tigris. *Raj. Syn. Quadr. p.* 165.
Klein. Quadr. p. 78.
Gesn. Quadr. Fig. p. 1060. (*Fig. sat bona, excepto capite*).
Gesn. Icon. Quadr. p. 66. *Fig. p.* 67. (*Fig. eadem*).
Aldrov. Quadr. dig. viv. p. 101. *Fig. p.* 104. (*Fig. eadem*).
Jonst. Quadr. p. 84. *Fig. T.* 54. (*Fig. eadem*).
Charlet. Exer. p. 14.
Bont. Ind. ori. p. 52. *Fig. p.* 53. (*Fig. eadem*).
Tigre. *Kolbe. Tom. III. p.* 5. *Fig. p.* 50. (*Fig. mauv.*).
Les Grecs l'appellent Τίγρις.
Les Espagnols, TIGRE. *Aldro.*
Les Italiens, TIGRE, *ou* TIGRA. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, TIGERTHIER. *Gesn. Aldro.*
Les Suédois, TIGER. *Linn.*
Les Anglois, TIGER. *Raj.*
Les Habitans de Java, RADIA OUTANG. *Bont.*

Digitized by Google

Magnitudine *Leoni* cedit. Splendentes habet & lucidos oculos ; auriculas breves & subrotundas ; caudam, caudæ *Leoninæ* instar, longissimam. In toto corpore vestitur pilis brevibus, quorum color est flavus, longis maculis nigris variegatus. Habitat in *Asiâ* & *Africâ*.

Il est un peu plus petit que le *Lion*. Ses yeux sont brillants, & pleins de feu ; ses oreilles courtes & arrondies ; sa queue très longue, comme celle du *Lion*. Tout son corps est couvert de poils courts, dont la couleur est jaune & variée de taches noires & longues. On le trouve en *Asie* & en *Afrique*.

7. Le Tigre Royal.

Felis in dorso fulva, in lateribus subcinerea, in ventre alba ; maculis longis nigris variegata... Tigris Regia.

Tigris quam Lusitani *Tigre Royal* appellant. *Klein. Quadr. p.* 80.
Tigre de la grande espece, que les Portugais appellent *Tigre Royal. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. 2. p.* 287.

Corporis longitudo, ab extremitate rostri ad caudæ exortum usque, 4 est pedum cum 9 pollicibus ; capitis, ab occipitio ad caudæ extremitatem, 14 pollicum ; caudæ 2 ½ pedum. Corporis altitudo, à parte superiore dorsi ad terram usque, 3 circiter pedum. Color est in dorso fulvus ; in lateribus subcinereus ; in ventre albus : totumque corpus longis maculis nigris variegatur. Habitat in *Brasiliâ*.

La longueur de son corps, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de 4 pieds 9 pouces ; celle de sa queue de 2 ½ pieds ; celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 14 pouces ; & sa hauteur, depuis la partie supérieure du dos jusqu'à terre, d'environ 3 pieds. La couleur de son dos est fauve : celle des côtés tire sur le gris ; & le ventre est blanc : & en outre tout le corps est varié de longues bandes noires. On le trouve au *Brésil*.

Digitized by Google

** 8. Le Tigre d'Amérique.

Felis flavescens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam rosam referentibus, variegatâ... Tigris Americana.

Pardus, an Lynx Brasilienſis, *Jaguara* dicta, Marcgravii. *Raj. Syn. Quadr. p.* 168.
Tigris Americana, Jaguara Brasilienſis. *Klein. Quadr. p.* 80.
Jaguara Brasilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p.* 235.
Jaguara. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 103.
Tlatlauhqui occlotl, ſeu Tigris Mexicanus. *Hernand. Hiſt. Mex. Fig. p.* 498. (*Fig. ſat bona*).
Gros Tigre de la Guiane. *Des March. Tom. III. p.* 299.
Tigre. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 3. *p.* 3. *Fig. Pl.* 1. (*Fig. très bonne*). *Les Portugais l'appellent* Onça. *Raj. Klein. Marcgr. Piſon.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 4 pieds; celle de ſa queue de 2 ½ pieds; celle de ſes jambes de devant, depuis la poitrine juſqu'au bout des doigts, de 1 ½ pied; & celle des jambes de derriere, depuis le ventre juſqu'au bout des doigts, de 1 pied 10 pouces. Il a la tête groſſe; les yeux petits, brillants, & pleins de feu; les oreilles petites & arrondies; une barbe pareille à celle d'un *Chat*; 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. Toute la partie ſupérieure de ſon corps eſt jaunâtre, variée de taches noires, dont quelques unes ſont aſſemblées de façon qu'elles repréſentent une *roſe*; & la partie inférieure eſt blanche, variée auſſi de taches noires. Les poils ſont courts dans les adultes; & dans les jeunes ils ſont plus

Longitudo corporis, ab extremitate roſtri ad caudæ initium uſque, 4 eſt pedum; caudæ 2 ½ pedum; crurum anteriorum, à pectore ad digitorum apicem uſque, 1 ½ pedis; & crurum poſteriorum, à ventre ad apicem digitorum, 1 pedis cum 10 pollicibus. Caput habet craſſum; oculos parvos, ſplendentes & lucidos; auriculas breves & ſubrotundas; barbam barbæ *Felinæ* æmulam; in pedibus anterioribus digitos 5, in poſterioribus vero 4. Tota corporis pars ſuperior flaveſcit, maculiſque nigris, quibuſdam ita diſpoſitis ut *roſam* quodam modo referant, variegatur; & pars corporis inferior alba eſt, maculis etiam nigris variegata. Pili in adultioribus breves ſunt; in junioribus verò longiores, & pau-

Digitized by Google

lulùm crispi. Habitat in *Americâ.*

longs, & un peu frisés. On le trouve en *Amérique.*

9. Le Tigre noir.

Felis nigra, maculis nigris saturatioribus variegata... TIGRIS NIGRA.

Tigris Jaguarete, Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 81.
Jaguarete Brasilienſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 169.
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 235.
Jaguarete. *Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p.* 103.
Onçe, eſpece de Tigre. *Des March. Tom. III. p.* 300.
Les Portugais l'appellent ONÇA. *Raj. Marcgr. Piſon.*

Magnitudine *Juvencum annuum* adæquat; & figurâ ſuâ *Tigridem Americanam* æmulatur. In toto corpore veſtitur pilis brevibus, ſplendentibus, nigris, cum umbrâ mixtis, cumque maculis coloris nigri ſaturatioris in corpore diſperſis. Habitat in *Guianâ* & *Braſiliâ.*

Il eſt de la grandeur d'un *Veau d'un an*, & de la figure du *Tigre d'Amérique.* Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, d'un noir ondé & luſtré, varié de taches d'un noir plus foncé. On le trouve dans la *Guiane*, & dans le *Bréſil.*

10. Le Tigre-Barbet, ou Tigre frisé.

Felis pilis criſpis veſtita, maculis nigris variegata... TIGRIS CRISPA.

Loup Tigre. *Kolbe. Tom. III. p.* 60.

Pilis criſpis, *Canis Aquatici* modo, in toto corpore veſtitur; & maculis nigris, *Tigridis* inſtar, variegatur. Habitat in *Capite Bon. Spei.*

Tout ſon poil eſt friſé, comme celuy d'un *Barbet*; & il eſt marqué de taches noires, comme un *Tigre.* On le trouve au *Cap de Bonne-Eſpérance.*

Digitized by Google

11. Le Tigre rouge.

Felis ex flavo rufescens, mento & infimo ventre albicantibus... Tigris fulva.

Tigris fulvus. *Barr. Hist. Fr. eq. p.* 165.
Tigris Cuguacu arana Marcgravii. *Klein. Quadr. p.* 81.
Cuguacu arana Brasilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 169.
Marcgr. Hist. Br. p. 235.
Cuguacu ara. *Pison. Hist. Nat. p.* 103.
Les Portugais l'appellent Tigre. *Raj. Klein. Marcgr.*
Les François de la Guiane, Tigre rouge. *Barr.*

Il eſt de la grandeur & de la figure du *Tigre d'Amérique* : il en diffère par ſa couleur, qui eſt un jaune rouſsâtre, plus foncé ſur le dos qu'ailleurs. Le deſſous de la mâchoire inférieure, & le bas ventre ſont un peu blanchâtres. Tous ſes poils ſont courts. On le trouve dans la *Guiane* & dans le *Bréſil*.

Magnitudine & figurâ cum *Tigride Americanâ* planè convenit : ab eâ autem colore ex flavo rufeſcente, in dorſo obſcuriore, differt. Sub mento albicat paululùm, ut & in infimo ventre. Pilos habet in toto corpore breves. Habitat in *Guianâ* & *Braſiliâ*.

** 12. Le Leopard.

Felis ex albo flavicans, maculis nigris, in dorſo orbiculatis, in ventre longis, variegata... Leopardus.

Felis caudâ elongatâ, maculis ſuperioribus orbiculatis, inferioribus virgatis. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 5. *ſp.* 3.
Pardalis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 166.
Pardus. *Klein. Quadr. p.* 78.
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 64. *Fig. p.* 68. (*Fig. ſat bona*).
Charlet. Exer. p. 14.
Panthera, ſeu Pardalis; Pardus; Leopardus. *Geſn. Quadr. Fig. p.* 936. (*Fig. ſat bona*).
Panthera; Pardalis; Varia; Africana; Leopardus. *Geſn. Icon. Quadr. Fig. p.* 67. (*Fig. ſat bona*).
Pardus; Leopardus. *Jonſt. Quadr. p.* 81. *Fig. T.* 53. [*Fig. bona*].
Pardus; Panthera. *Proſp. Alp. Ægypt. p.* 237. *Pullus. Fig. T.* 15. *F.* 2. (*Fig. ſat bona*).
Leopardus, ſeu Panthera. *Bont. Ind. Ori. p.* 55.

Pardalion

Pardalion Aristotelis. *Aldro. Klein.*
Varia Latinis. *Raj. Klein. Gesn.*
Africana Plinio. *Raj. Klein.*
Lupus Canarius, vel Luparius Gaza. *Klein.*
Leopard. *Kolbe. Tom. III. p. 5.*
Panthére. *Kolbe. Tom. III. p. 5.*
Les Hebreux l'appellent NAMER. *Gesn. Aldro.*
Les Chaldéens, NIMRA. *Gesn.*
Les Grecs, Παρδος; *le mâle*, Παρδαλις; *la femelle*, Παρδαλις.
Les Espagnols, LEONPARDAL, *ou* LEONPARDO. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, LEONPARDO. *Gesn. Aldro.*
Les Allemands, LEPPARD. *Gesn. Aldro.*
Les Illyriens, LEWHART. *Gesn.*
Les Suédois, PANTER. *Linn.*
Les Anglois, LEOPARD. *Raj.* LYBARDE, *ou* LEPARDE. *Gesn. Aldro.*

Magnitudine *Tigridem Americanam* circiter æquat, & figurâ æmulatur : ab eâ autem differt colore suo, & figurâ & dispositione macularum. Color autem corporis est ex albo flavicans, maculis nigris, in ventre longis, in dorso orbiculatis, sed omnibus à se invicem separatis, & *rosas* nullo modo referentibus, variegatus. In pedibus anterioribus digitos habet 5, in posterioribus 4 tantùm. Habitat in *Africâ* & *Indiâ Orientali.*

Il est à peu-près de la grandeur, & de la figure du *Tigre d'Amérique* : il en differe par sa couleur, & l'arrangement & la figure de ses taches. Sa couleur est un blanc jaunâtre, varié de taches noires, longues sous le ventre, & arrondies sur le dos, mais toutes séparées les unes des autres, & qui ne représentent point des *roses*. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. On le trouve en *Afrique* & dans les *Indes Orientales.*

13. LE CHAT-PARD.

Felis rufa, in ventre ex albo flavicans, maculis nigris, in dorso longis, in ventre orbiculatis, variegata... CATUS-PARDUS.

Felis caudâ elongatâ, maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 4.*
Pardus caudâ brevi. *Klein. Quadr. p. 78.*
Catus Pardus, sive Catus Montanus Americanorum. *Raj. Syn. Quadr. p. 169.*
Tlacoozclotl; Tlalocelotl; Catus Pardus Mexicanus. *Hernand. Hist. Mex.*

Fig. p. 512. (*Fig. sat bona*).

Chat-Pard. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p.* 109. *Fig. Pl.* 13. (*Fig. bonne*).

Les Anglois l'appellent Cat a Mountain. *Raj.*

Les Suédois, Willkatt. *Linn.*

La longueur de ſon corps, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 ½ pieds; celle de ſa queue de 8 pouces. Sa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'au bout des doigts des pieds de devant, eſt de 1 ½ pied. Sa figure extérieure eſt parfaitement ſemblable à celle du *Chat*. Sa queue ſeulement eſt moins longue, à proportion de la grandeur de ſon corps, que celle du *Chat*. La couleur de tout ſon corps, exceptés le ventre & l'intérieur des jambes de devant, qui ſont d'un blanc jaunâtre, & le deſſous de la gorge & de la mâchoire inférieure, qui ſont blancs, eſt rouſſe, variée de taches noires, longues ſur le dos, & rondes ſur le ventre & les jambes. Ses oreilles ſont rayées tranſverſalement de bandes très noires. On le trouve dans les forêts d'*Amérique*.

Corporis longitudo, ab extremitate roſtri ad caudæ exortum uſque, eſt 2 ½ pedum; caudæ 8 pollicum. Corporis altitudo, à parte ſuperiore dorſi ad apicem digitorum pedum anteriorum, 1 ½ pedis. Figura corporis externa *Felem* per omnia refert, cauda dumtaxat excepta, quæ, pro ratione magnitudinis animalis, brevior eſt quàm in *Fele*. Color totius corporis, exceptis ventre & interiori crurum parte ex albo flavicantibus, & maxillæ inferioris parte inferiore & gutture albis, eſt rufus, maculis nigris, in dorſo longis, in ventre & cruribus orbiculatis, variegatus. Auriculas habet tæniis tranſverſis nigerrimis ornatas. Habitat in *America* ſylvis.

14. Le Chat-Cervier.

Felis alba, maculis nigris variegata, caudâ brevi... Catus Cervarius.

Felis caudâ truncatâ, corpore albo maculato. *Linn. Syſt. nat. ed.* 6. *g.* 51. *ſp.* 8.

Lynx colore albo, maculis nigris, caudâ truncatâ. Act. Upſal. *Klein, Quadr. p.* 77.

Digitized by Google

Les Prussiens l'appellent KATZ-LUCHS. *Klein.*
Les Suédois, KATTLO. *Linn. Klein.*

Caudam habet brevem; inque toto corpore albus est, maculis nigris variegatus. Habitat in *Canadâ.*

La couleur de tout son corps est blanche, variée de taches noires; & il a la queue courte. On le trouve en *Canada.*

15. LE LOUP-CERVIER.

Felis auricularum apicibus pilis longissimis præditis, caudâ brevi... LYNX.

Felis caudâ truncatâ, corpore rufescente maculato. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 5. sp. 7.*
Faun. Suec. Linn. No. 4.
Lynx Aldrovandi. *Klein. Quadr. p. 77.*
Lynx. *Raj. Syn. Quadr. p. 166.*
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 90. Fig. p. 92. (Fig. sat bona).
Jonst. Quadr. p. 83. Fig. T. 71. (Fig. bonis).
Charlet. Exer. p. 14.
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 222.
Lynx; Lupus Cervarius; Chaus; Raphius. *Gesn. Icon. Quadr. p. 73. Fig. p. 74. (Fig. sat bona, excepto capite).*
Lynx, seu Lupus Cervarius. *Rzac. Auct. p. 313.*
Lupus Cervarius; Lynx; Chaus. *Gesn. Quadr. Fig. p. 769. (Fig. eadem).*
Lupus Cervarius. *Gaz. Rup. Besl. Fig. T. 13. (Fig. bona).*
Lupus Armenius. *Rzac.*
Lynx. *Kolbe. Tom. III. p. 63.*
Loup-Cervier. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. I. p. 127. Fig. Pl. 17. (Fig. très bonne).*
Les Grecs l'appellent Λύγξ. *Gesn. Aldro.*
Les Espagnols, LYNCE. *Gesn. Aldro.*
Les Italiens, LUPO GATTO. *Besl.*
Les Italiens, les Grisons, & les Savoyards, LUPO CERVERO, *ou* CERVEIRO. *Gesn.*
Les Allemands, LUCHS, *ou* LWS. *Gesn. Aldro. Rzac.*
Les Prussiens, LUCHS. *Gesn.*
Les Illyriens, LUPO CERVIRO. *Gesn.*
Les Polonois, RYS; OSTROWIDZ. *Rzac.*
Les Suédois, WARGLO. *Linn.*
Les Anglois, OUNCE. *Raj.* LUZARNE. *Gesn.*

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum usque, 2 est pedum cum 4 pollicibus; capitis, ab extremi-

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est de 2 pieds 4 pouces; celle de sa tête, depuis

le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, de 7 pouces; & celle de ſa queue de 8 pouces. Sa hauteur, depuis la partie ſupérieure du dos juſqu'à l'extrémité des pieds de devant, eſt de 1 pied 8 pouces. Ses yeux ſont brillants & pleins de feu. Sa tête & ſes oreilles reſſemblent à la tête & aux oreilles d'un *Chat* : au bout de chaque oreille il a une houppe de poils fort longs. Il a 5 doigts aux pieds de devant, & 4 à ceux de derriere. Les Loups-Cerviers varient beaucoup en couleur : les uns ſont mêlés confuſément de noir, de gris, & de roux : d'autres ſont roux dans toute la partie ſupérieure du corps, & marqués de taches noires; & dans la partie inférieure d'un gris cendré, auſſi marqués de taches noires, mais moins foncées, plus grandes, & en plus petite quantité.

On le trouve en *Italie*, en *Allemagne*, en *Pologne*, en *Lithuanie*, en *Ruſſie*, en *Moſcovie*, en *Suéde*, en *Aſie*, en *Afrique* & en *Canada*.

L'Animal que M. *Charleton* a décrit *Exer. p.* 21, ſous le nom de *Siyah-Ghuſh*, & dont il a donné la Figure *p.* 23, me paroît être de cette eſpece.

tate roſtri ad occipitium, 7 pollicum; caudæ 8 pollicum. Corporis altitudo, à parte dorſi ſuperiore ad extremitatem pedum anteriorum, 1 pedis & 8 pollicum. Fulgentes & lucidos habet oculos; caput & auriculas capiti & auriculis *Felinis* ſimiles : in auricularum apicibus faſciculus extat pilis longiſſimis conflatus. Pedes anteriores in 5 digitos, poſteriores in 4 tantùm fiſſi ſunt. Lynces coloribus multùm variant : alii enim ex nigro, cinereo, & rufo confuſè mixti ſunt : alii in parte corporis ſuperiore rufi, maculis nigris variegati; & in parte inferiore cinerei, maculis pariter nigris, ſed dilutioribus, majoribus, minùſque frequentibus, etiam variegati.

Habitat in *Italiâ*, *Germaniâ*, *Poloniâ*, *Lithuaniâ*, *Ruſſiâ*, *Moſcoviâ*, *Sueciâ*, *Aſiâ*, *Africâ* & *Canadâ*.

Animal à Dom. *Charleton* *Exer. p.* 21. deſcriptum, ſub iſto nomine *Siyah-Ghush*, & figuratum *p.* 23, *Lyncis* ſpecies mihi videtur.

Digitized by Google

SECTIO II.

Ea quorum digiti membranis inter se connectuntur.

UNICO Genere, *Lutrâ* scilicet, constituitur hæc Sectio.

SECTION II.

Ceux dont les doigts sont joints ensemble par des membranes.

IL n'y a dans cette Section qu'un seul Genre, sçavoir celui de la *Loutre*.

X L.

Genus Lutræ.

Hujus character est
Dentes incisores in utrâque maxillâ sex :
In singulis pedibus digiti quinque unguiculati,
Membranis inter se connexi.

Obs. Omnia hujus Generis Quadrupeda Amphibia sunt, piscibusque victitant.

X L.

Le Genre de la Loutre.

Son caractere est
D'avoir six dents incisives à chaque mâchoire :
A chaque pied cinq doigts onguiculés,
Joints ensemble par des membranes.

Obs. Toutes les especes de ce Genre sont Amphibies, & se nourrissent de Poissons.

** 1. LA LOUTRE.

Lutra castanei coloris... LUTRA.

Lutra digitis æqualibus. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 7. sp. 1.*
Faun. Suec. Linn. N°. 10.
Lutra. *Raj. Syn. Quadr. p. 187.*
Klein. Quadr. p. 91.
Gesn. Quadr. p. 775. Fig. p. 776. (Fig. bona).
Gesn. Icon. Quadr. Fig. p. 85. [Fig. bona].
Gesn. Pisc. Fig. p. 608. (Fig. bona).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 292. Fig. p. 295. (Fig. mala).
Jonst. Quadr. p. 104. Fig. T. 68. (Fig. sat bona).
Charlet. Exer. p. 18.
Bell. de aquat. p. 31. Fig. p. 32. (Fig. bona).
Rzac. Hist. Nat. Pol. p. 221.
Lutra, vel Lytra, vel etiam Lutris. *Gesn. Icon. Aquat. Fig. p. 353. (Fig. bona).*

Digitized by Google

Lutra, ſeu Canicula aquatica. *Raj. Auct. p.* 313.
Canis fluviatilis Aëtii. *Geſn. Aldro. Jonſt.*
Loutre. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part.* 1. *p.* 151. *Fig. Pl.* 21. (*Fig. très bonne*).
Les Grecs l'appellent Ἔνυδρις.
Les Eſpagnols, NUTRIA. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, LODRA; LODRIA; LOUTRA. *Geſn. Aldro.*
Les Savoyards, LEURE. *Geſn. Aldro.*
Les Illyriens & les Polonois, WYDRA. *Geſn. Aldro. Raj.*
Les Suédois, UTTER. *Linn.*
Les Anglois & les Allemands, OTTER. *Raj. Geſn. Aldro.*

La longueur de ſon corps, depuis l'occiput juſqu'à l'origine de la queue, eſt de 2 pieds 2 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du muſeau juſqu'à l'occiput, eſt de 5 pouces; & celle de ſa queue de 1 ½ pied. Ses yeux ſont très petits; ſes oreilles très courtes, rondes, & placées plus bas que les yeux; ſes jambes très courtes. Elle a à chaque pied 5 doigts, tous joints enſemble par des membranes: le pouce eſt plus court que les autres doigts. Toute la partie ſupérieure du corps, la queue & les jambes ſont d'un marron plus ou moins foncé. La gorge, l'eſtomach, & le ventre ſont d'un gris blanc. On la trouve aux bords des eaux.

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum uſque, 2 eſt pedum cum 2 pollicibus; capitis, ab extremitate roſtri ad occipitium, 5 pollicum; caudæ 1 ½ pedis. Oculos habet valdè exiguos; auriculas breviſſimas, rotundas, infrà oculos poſitas; crura breviſſima; in ſingulis pedibus digitos 5, omnes membranis inter ſe connexos; pollice aliis digitis breviore. Pilorum color in parte corporis ſuperiore, caudâ & cruribus eſt caſtaneus, in aliis dilutior, in aliis ſaturatior. Guttur, pectus, & venter ex cinereo albicant. Habitat in ripis aquarum.

2. LA LOUTRE DU BRÉSIL.

Lutra atri coloris, maculâ ſub gutture flavâ... LUTRA BRASILIENSIS.

Lutra pollice digitis breviore. *Linn. ſyſt. nat. ed.* 6. *g.* 7. *ſp.* 2.
Lutra nigricans, caudâ depreſsâ & glabrâ. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p.* 155.
Lutra Braſilienſis. *Raj. Syn. Quadr. p.* 189.
Klein. Quadr. p. 91.

Digitized by Google

Jiyá, quæ & Carigueibeju appellatur à Brasilien sibus. *Marcgr. Hist. Br. Fig. p.* 234.
Jiya, sive Carigueibeju. *Jonst. Quadr. p.* 104. *Fig. T.* 60.
Carygueibeju. *Charlet. Exer. p.* 19.
Loutre, ou Catigueibeju. *Des March. Tom. III. p.* 306.
Les Portugais l'appellent LOUTRA. *Raj. Marcgr.*

Præcedenti magnitudine cedit; eam autem figurâ æmulatur. Oculos habet nigros, & rotundos; auriculas breves, subrotundas, & infrà oculos posita; in singulis pedibus digitos 5 (*m*) unguibus fuscis & acutis munitos; pollice aliis digitis breviore. In toto corpore vestitur pilis atris, exceptis qui caput obtegunt, qui sunt obscurè fusci, & maculâ sub gutture flavâ. Habitat in *Brasiliâ.*

Elle est un peu plus petite que la précédente; mais elle luy ressemble par sa figure. Ses yeux sont noirs & ronds; ses oreilles courtes, arrondies, & placées plus bas que les yeux. Elle a à chaque pied 5 doigts (*m*) armés d'ongles bruns & aigus; le pouce est plus court que les autres doigts. Tout son corps est couvert de poils noirs, exceptés ceux de la tête qui sont d'un brun foncé, & une tache jaune, qu'elle a sous la gorge. On la trouve au *Brésil.*

(*m*) Utrùm digiti membranis inter se connexi sint, prorsùs ignoro; si reverà sint separati, in hoc Genere Animal istud non est reponendum.

(*m*) Je ne sçais si ses doigts sont joints ensemble par des membranes; s'ils ne l'étoient pas, elle ne seroit pas de ce Genre.

Digitized by Google

ORDRE XVII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont ſix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

CET Ordre ne contient qu'un ſeul Genre, qui eſt celui de la *Taupe*.

XLI.

Le Genre de la Taupe. (Fig. 7).

Son caractere eſt
D'avoir ſix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure (Fig. 7. a.), huit à l'inférieure (Fig. 7. b.):
Les doigts onguiculés:
La plante des pieds de devant tournée en dehors.

Obſ. Toutes les eſpeces de ce Genre vivent ſous terre, & y font des tanieres, dans leſquelles elles ſe cachent.

ORDO XVII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore ſex, in inferiore octo; & digitis unguiculatis prædita.

UNICO Genere, *Talpæ* ſcilicet, conſtituitur hic Ordo.

XLI.

Genus Talpæ. (Fig. 7).

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore ſex (Fig. 7. a.), in inferiore octo (Fig. 7. b.):
Digiti unguiculati:
Plantæ pedum anteriorum extrorsùm verſæ.

Obſ. Omnes hujus Generis ſpecies ſub terrâ vitam agunt, ibique cuniculos condunt, in quibus deliteſcunt.

** 1. LA TAUPE.

Talpa caudata, nigricans, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... TALPA VULGARIS.

Talpa caudata. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 13. ſp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 17.

Talpa

Talpa noſtras, nigra communiter. *Klein. Quadr. p.* 60.
Talpa. *Raj. Syn. Quadr. p.* 236.
Geſn. Quadr. Fig. p. 1055. [*Fig. ſat bona*].
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 116. (*Fig. eadem*).
Aldro. Quadr. dig. viv. p. 449. *Fig. p.* 451. *No.* 2. (*Fig. ſat bona*).
Jonſt. Quadr. p. 118. *Fig. T.* 66. [*Fig. ſat bona*].
Charlet. Exer. p. 25.
Rzac. Hiſt. Nat. Pol. p. 236.
Taupe. *Kolbe. Tom. III. p.* 51.
Les Grecs l'appellent Ασπαλαξ.
Les Eſpagnols, Topo. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, Talpa. *Geſn. Aldro.*
Les Boulonnois, Topinara. *Aldro.*
Les Suiſſes, Schär, *ou* Schärmus. *Geſn.*
Les Allemands, Mulwerf. *Geſn. Aldro.* Maul-Wurff. *Rzac.*
Les Illyriens, Krticze. *Geſn. Aldro.*
Les Polonois, Kret. *Rzac.*
Les Suédois, Mullvad. *Linn.*
Les Smolandois, Surck. *Linn.*
Les Flamands & les Hollandois, Moll, *ou* Mollmuss. *Geſn. Aldro.*
Les Anglois, Mole, *ou* Moldwrap, *ou* Want. *Raj. Geſn. Aldro.*

Corporis longitudo, ab extremitate naſi ad caudæ exortum, 5 eſt circiter pollicum; capitis, ab extremitate naſi ad occipitium, 1 ½ pollicis. Caudam habet breviſſimam; oculos ſeminis *Millii* magnitudine, nigros, & ſub pilis occultos; naſum 4 lineis ultrà maxillam ſuperiorem prominentem; crura breviſſima; pedes anteriores poſterioribus latiores, & ad humum fodiendum aptatos; in ſingulis pedibus digitos 5, validis unguibus munitos, præſertim in anticis pedibus. Per univerſum corpus veſtitur pilis brevibus, denſis, ſerici inſtar molliſſimis, & ni-

La longueur de ſon corps, depuis le bout du nez juſqu'à l'origine de la queue, eſt d'environ 5 pouces; celle de ſa tête, depuis le bout du nez juſqu'à l'occiput, de 1 ½ pouce. Sa queue eſt très courte. Ses yeux ſont gros comme un grain de *millet*, noirs, & cachés ſous les poils. Son nez avance de 4 lignes au-delà de la mâchoire ſupérieure. Ses jambes ſont très courtes: ſes pieds de devant ſont plus larges que ceux de derriere, & propres à fouiller la terre. Elle a à chaque pied 5 doigts, armés d'ongles forts, ſurtout ceux des pieds de devant. Tout ſon corps eſt couvert de poils courts, épais, doux comme de la ſoye, & noi-

Digitized by Google

râtres. On la trouve ſous terre dans les champs, les prés, & les jardins.

gricantibus. Habitat ſub terrâ in agris, pratis & hortis.

** 2. La Taupe blanche.

Talpa caudata, alba, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... Talpa alba.

Talpa caudata. *Faun. Suec. Linn.* N°. 17.
Talpa coloris albi. *Raj. Syn. Quadr. p.* 236.
Talpa noſtras albi coloris. *Klein. Quadr. p.* 60.
Talpa alba noſtras. *Seb. Vol. I. p.* 51. *Fig. T.* 32. *F.* 1. (*Fig. bona*).
Talpa alba. *Rzac. Auct. p.* 329.
Les Polonois l'appellent Kret. *Rzac.*

Elle eſt de la grandeur, & de la figure de la précédente : elle n'en differe que par ſa couleur qui eſt blanche. On la trouve auſſi ſous terre dans les champs, les prés, & les jardins.

Magnitudine & figurâ præcedentem æmulatur : ab eâ autem differt colore, qui in toto corpore albus eſt. Habitat, ut illa, ſub terrâ in agris, pratis, & hortis.

3. La Taupe variée.

Talpa caudata, ex albo & nigro variegata, pedibus anticis & poſticis pentadactylis... Talpa variegata.

Talpa caudata. *Faun. Suec. Linn.* N°. 17.
Talpa maculata, Ooſt-friſia. *Klein. Quadr. p.* 60.
Seb. Vol. I. p. 68. *Fig. T.* 41. *F.* 4. (*Fig. bona*).

Elle differe des précédentes, parce qu'elle eſt un peu plus grande, & que tout ſon corps eſt comme marbré de taches noires & de taches blanches.

A præcedentibus differt magnitudine quâ eas paululùm antecellit, & colore, qui in toto corpore maculis albis & maculis nigris, marmoris in modum, variegatur.

Obſ. Je crois que ces trois Taupes ne ſont que des variétés de la même eſpece.

Obſ. Tres Talpæ præcedentes ejuſdem ſpeciei varietates mihi videntur.

Digitized by Google

4. La Taupe de Virginie.

Talpa caudata, nigricans, ex saturatè purpureo mixta, pedibus anticis & posticis pentadactylis... Talpa Virginiana.

Talpa caudata. *Faun. Suec. Linn. N°.* 17.
Talpa nigra Virginiana. *Klein. Quadr. p.* 60.
Talpa Virginianus niger. *Seb. Vol. I. p.* 51. *Fig. T.* 32. *F.* 3. (*Fig. bona*).

Magnitudine & figurâ *Talpam vulgarem* æmulatur : ab eâ tantùm differt colore pilorum, qui nigricantes sunt, splendentes, & saturatè purpureo coruscantes. Habitat in *Virginiâ*.

Elle est de la grandeur & de la figure de la *Taupe ordinaire* : elle en differe seulement par la couleur de son poil qui est noirâtre, luisant, & mêlé d'un pourpre foncé. On la trouve en *Virginie*.

5. La Taupe rouge d'Amérique.

Talpa caudata, ex dilutè cinereo rufa, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis... Talpa Americana rufa.

Talpa rubra Americana. *Klein. Quadr. p.* 60.
Seb. Vol. I. p. 51. *Fig. T.* 32. *F.* 2. (*Fig. bona*).

Magnitudine & figurâ corporis *Talpam vulgarem* æmulatur; ab eâ autem differt figurâ pedum, quorum anteriores in 3 tantùm fissi sunt digitos, quorum exterior unguem gerit validissimum, longum, acutum, & parumper incurvum ; medius minor, minore etiam ungue munitus est ; interior verò minimus. Pedes posteriores in 4 abeunt digitos æqualibus ferè unguibus armatos. Per universum corpus vestitur pilis ex dilutè

Elle est de la grandeur de la *Taupe ordinaire* : elle luy ressemble par la figure de son corps ; mais elle en differe par celle de ses pieds, dont ceux de devant n'ont que trois doigts, dont l'extérieur est muni d'un ongle très fort, long, pointu, & un peu recourbé ; le doigt du milieu est plus petit, ainsi que son ongle ; & le doigt intérieur est très petit. Les pieds de derriere ont chacun 4 doigts armés d'ongles presque égaux. Tout son corps est couvert de poils

Digitized by Google

d'un roux tirant ſur un cendré clair. On la trouve en *Amérique.*

cinereo rufis. Habitat in *Americâ.*

6. La Taupe dorée de Siberie.

Talpa ecaudata, ex viridi aurea, pedibus anticis tridactylis, poſticis tetradactylis... Talpa Siberica aurea.

Talpa ecaudata. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g.* 13. *ſp.* 2.
Talpa Sibericus verſicolor, *Aſpalax* dictus. *Klein. Quadr. p.* 60.
Seb. Vol. I. p. 51. *Fig. T.* 32. *Mas F.* 4. *Fœmina F.* 5. [*Fig. bonis*].

Elle eſt à peu près de la grandeur de la *Taupe ordinaire*; elle en differe parce qu'elle a le nez beaucoup plus court, qu'elle n'a point de queue, & par la figure de ſes pieds, qui ſont ſemblables à ceux de la précédente. Tout ſon corps eſt marqueté de diverſes couleurs, parmi leſquelles domine l'or & le verd. On la trouve en *Siberie.*

Magnitudine *Talpam vulgarem* circiter æquat; ab eâ autem differt naſo multò breviore, caudæ defectu, & figurâ pedum pedibus præcedentis ſimilium. In toto corpore variis refulget coloribus, quos inter præcipuè emicat ex viridi aureus. Habitat in *Siberiâ.*

ORDO XVIII.

QUADRUPEDA

Dentibus inciſoribus in maxillâ ſuperiore decem, in inferiore octo; & digitis unguiculatis donata.

UNICO Genere, *Philandri* ſcilicet, hic ordo, ſicut & præcedens, conſtituitur.

XLII.

Genus Philandri.

Hujus character eſt
Dentes inciſores in maxillâ ſuperiore decem, in inferiore octo:
In ſingulis pedibus digiti quinque unguiculati:
Pollex diſtinctus.

Obſ. 10. Omnes hujus Generis ſpecies caudam habent caudæ *Murinæ* æmulam, & longiſſimam, exceptâ ſpecie ultimâ, quæ breviſſimâ caudâ donatur.

Obſ. 20. In maxillâ ſuperiore 10 ſunt dentes inciſores, quorum 2 intermedii aliis ſunt majores; in maxillâ inferiore octo tantùm: præterea in utrâque maxillâ den-

ORDRE XVIII.

LES QUADRUPEDES

Qui ont dix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, & huit à l'inférieure; & les doigts onguiculés.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans le précédent, qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Philandre.*

XLII.

Le Genre du Philandre.

Son caractere eſt
D'avoir dix dents inciſives à la mâchoire ſupérieure, huit à l'inférieure:
A chaque pied cinq doigts onguiculés:
Le pouce bien diſtinct.

Obſ. 1°. Toutes les eſpeces de ce Genre ont une queue ſemblable à celle d'un *Rat*, & très longue, excepté la derniere, qui l'a très courte.

Obſ. 2°. Elles ont toutes à la mâchoire ſupérieure 10 dents inciſives, dont les 2 du milieu ſont plus grandes que les autres; & 8 à la mâchoire inférieure: elles ont en outre à chaque

Digitized by Google

mâchoire plusieurs dents canines de chaque coté, & ensuite plusieurs dents molaires dont le nombre varie.

Obſ. 30. Leurs pieds ſont conformés de même que ceux des *Singes*. Comme eux, elles s'appuyent ſur le talon en marchant. Leurs ongles ſont aigus.

tes canini plures utrinquè, & deinde molares etiam plures utrinquè, quorum variat numerus.

Obſ. 30. Pedes habent pedibus *Simiarum* ſimiles; *Simiarumque* inſtar ſuper calcanea incedunt. Unguibus acutis donantur.

** 1. LE PHILANDRE.

Philander ſaturatè ſpadiceus in dorſo, in ventre flavus, maculis ſuprà oculos flavis... PHILANDER.

Philander, Opaſſum, ſeu Carigueia Braſilienſis. *Seb. Vol. I. p. 56. Fig. T. 36. Mas F. 1. Fœmina F. 2. Pullus F. 3. (Fig. optimis).*
Didelphis mammis intrà abdomen. Poſſum. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 1.*
Mus Marſupialis ſylveſtris Braſilienſis. *Klein. Quadr. p. 59.*
Carigueya Braſilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p. 182.*
Marcgr. Hiſt. Br. Fig. p. 222. (Fig. mala).
Carigueya. *Jonſt. Quadr. p. 94. Fig. T. 63. [Fig. mala].*
Piſon. Hiſt. Nat. Fig. p. 323. [Fig. mala].
Carigue, vel Sarigoy. *Jo. de Laët. p. 82.*
Opaſſum. *Jo. de Laët. p. 82.*
Opoſſum. *Cat. App. p. 29.*
Tlaquatzin. *Jonſt. Quadr. Fig. T. 73. [Fig. ſat bona, ſi pilus brevior eſſet].*
Euſ. Nieremb. Fig. p. 156. (Fig. utſuprà).
Hernand. Hiſt. Mex. p. 330.
Vulpes major putoria, caudâ tereti & glabrâ. *Barr. Hiſt. Fr. eq. p. 166.*
Semivulpa. *Geſn. Quadr. Fig. p. 981. (Fig. ficta). (n).*
Geſn. Icon. Quadr. Fig. p. 90. (Fig. eadem).
Jonſt. Quadr. Fig. T. 58. (Fig. eadem).
Aldro. Quadr. dig. viv. Fig. p. 223. (Fig. etiam ficta).
Carigoy, vel Sarigoy Lerii. *Raj. Jonſt. Marcgr.*
Jupatiima nonnullis. *Raj. Jonſt. Marcgr.*
Manicou du P. Feuillée. *Klein.*
Les Portugais l'appellent ROPOZA. *Raj.*
Les Anglois, POSSUM. *Raj.*
Les François de la Guiane, PUANT. *Barr.*
Les Guianois, AOUARÉ. *Barr.*

(n) Les Figures qu'ont donné de cet animal *Geſner*, *Jonſton*, & *Aldrovande*, ne lui reſſemblent en aucune façon, ni même à aucun *Quadrupede* connu.

(n) Figuræ, quas hujus animalis dederunt *Geſnerus*, *Jonſtonus*, & *Aldrovandus*, nullo modo id repræſentant, nec etiam ullum *Quadrupedem* notum.

Digitized by Google

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum usque, 8 circiter est pollicum; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 3 pollicum; caudæ 1 pedis. Crura anteriora 3 pollices longa sunt; posteriora verò paulò plus 4 pollices. Rostrum habet acuminatum; maxillam superiorem ultrà inferiorem paulò prominentem; parvos, rotundos, & lucidos oculos; auriculas longas, latas, glabras, ad tactum mollissimas, tenuissimas & transluciadas, *Vulpinarum* instar erectas; barbam *Felinam*, nigris conflatam setis, cujusmodi & in genis & suprà oculos habentur. Cauda, ab exortu ad tertiam longitudinis partem, pilis obsita est; in reliquâ longitudine squamulis tegitur, caudamque *Murinam* æmulatur. Pili saturatè spadicei partem corporis superiorem obtegunt; qui verò oris ambitum, ventrem, & crura cooperiunt, sunt flavi. Caput pilis fuscis vestitur, & suprà utrumque oculum macula inest flava. Habitat in *Americâ*.

Hujus speciei fœmina in infimo ventre, propè crura posteriora, sacculum habet, cujus orificium 2 ½ pollices longum est, in quo mammæ

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 8 pouces; celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 3 pouces; celle de sa queue de 1 pied; celle de ses jambes de devant de 3 pouces; & celle des jambes de derriere d'un peu plus de 4 pouces. Son museau est pointu; sa máchoire supérieure un peu plus longue que l'inférieure: ses yeux sont petits, ronds & brillants; ses oreilles longues, larges, sans poils, douces au toucher, très minces, transparentes, & droites comme celles d'un *Renard*. Il a une barbe semblable à celle d'un *Chat*, composée de soyes noires: il a aussi de pareilles soyes aux joues, & pardessus les yeux. Sa queue est couverte de poils depuis son origine jusqu'au tiers de sa longueur; le reste est couvert de petites écailles, & semblable à la queue d'un *Rat*. Toute la partie supérieure de son corps est d'un rouge-bay foncé: le tour de sa gueule, son ventre, & ses jambes sont jaunes. Sa tête est brune, & il a au-dessus de chaque œil une tache jaune. On le trouve en *Amérique*.

La femelle de cette espece a à la partie inférieure du ventre, auprès des jambes de derriere, une espece de sac, dont l'ouverture a environ 2 ½ pouces, dans

Digitized by Google

lequel sont renfermées les mammelles, & où elle met ses petits nouvellement nez.

includuntur, & in quem fœtus, postquàm editi sunt, recipit.

2. Le Philandre Oriental.

Philander saturatè fuscus in dorso, in ventre flavus, maculis suprà oculos flavis... Philander Orientalis.

Philander Orientalis. *Seb. Vol. I. p. 61. Fig. T. 38. F. 1. (Fig. optima).*
Mus Marsupialis. *Klein. Quadr. p. 59.*
Les Indiens l'appellent Pelandor-Aroe *; selon Fr. Valentin. Seba.*

Il ressemble parfaitement au précédent par la figure de toutes ses parties; mais il est beaucoup plus grand. La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 11 pouces; & celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 4 pouces; le reste à proportion. La partie supérieure de son corps est d'un brun foncé; & l'inférieure est jaune: il a aussi une tache jaune pardessus chaque œil. On le trouve aux *Indes Orientales*.

Sa femelle a, comme celle du précédent, à la partie inférieure du ventre ce petit sac, dans lequel elle renferme ses petits nouvellement nez.

Omnium partium figurâ præcedenti simillimus est; ab eo autem differt magnitudine quâ eum antecellit. Corporis enim longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 11 pollices circiter æquat; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 4 pollices; reliquæ partes servatâ proportione longæ sunt. In parte corporis superiore saturatè fuscus est; in inferiore flavus: & suprà utrumque oculum macula est flava. Habitat in *Indiâ Orientali*.

Hujus speciei fœmina, sicut & præcedentis, in infimo ventre sacculo donatur, in quem fœtus, postquàm editi sunt, recipit.

3. Le

3. Le Philandre d'Amboine.

Philander atro spadiceus in dorso, in ventre ex albido cinereo flavicans, maculis suprà oculos obscurè fuscis... Philander Amboinensis.

Philander maximus Orientalis. *Seb. Vol. I. p. 64. Fig. T. 39. (Fig. optima).*
Didelphis mammis intra abdomen. Possum. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 1.*
Mus Marsupialis maximus Orientalis. *Klein. Quadr. p. 59.*
On l'appelle à Amboine Coes-Coes. *Seba.*

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ initium usque, 13 est circiter pollicum; capitis, ab extremitate rostri ad occipitium, 4 ½ pollicum. Caudam habet longissimam, squamis rhomboideis in totâ longitudine tectam; rostrum valdè elongatum; auriculas latas, & arrectas; barbam barbæ præcedentium æmulam. Pili partem corporis superiorem tegentes, longi sunt, setacei, atro spadicei; & ad ventris latera utrinquè paulò dilutiorem acquirunt colorem: qui verò partem corporis inferiorem vestiunt, sunt ex albido cinereo flavicantes. Suprà utrumque oculum macula est obscurè fusca. Habitat in *Ambionensi Insulâ.*

Hujus speciei fœmina, sicut & præcedentium fœminæ, in infimo ventre sacculo

La longueur de son corps, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ 13 pouces; & celle de sa tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, de 4 ½ pouces. Sa queue est très longue, & toute couverte d'écailles rhomboïdes. Son museau est fort allongé. Ses oreilles sont larges, & élevées. Il a une barbe pareille à celle des précédents. Les poils qui couvrent la partie supérieure de son corps, sont longs & soyeux, & d'un rouge-bay noirâtre; & cette couleur s'éclaircit un peu de chaque côté, en s'approchant du ventre: ceux qui couvrent la partie inférieure, sont d'un blanchâtre qui tire un peu sur le jaune cendré. Il a au dessus de chaque œil une tache d'un brun foncé. On le trouve à l'*Isle d'Amboine.*

La femelle de cette espece a aussi à la partie inférieure du ventre ce petit sac, dans lequel

elle met ses petits nouvellement nez.

Obs. Je ne sçais si les especes suivantes ont le caractere de ce Genre: je ne les ai jamais vûes; & les Auteurs qui les ont décrites, n'ont point déterminé le nombre de leurs dents incisives. Aucune de ces especes n'a à la partie inférieure du ventre ce petit sac propre à renfermer les petits nouvellement nez; mais, à ce sac près, elles ressemblent assez aux especes précédentes. La forme de leur tête & de leur museau, celle de leur queue, de leurs pieds, qui ont chacun 5 doigts, & dont le pouce est très distinct, sont à peu près les mêmes. D'ailleurs elles ont à peu près la même façon de vivre; ce qui m'a déterminé à les placer dans ce Genre, jusqu'à ce que de plus exactes observations nous ayent instruit de leur vrai caractere.

donatur, in quem fœtus recenter natos recipit.

Obs. Utrùm species sequentes hujus Generis characterem habeant prorsùs ignoro: eas nunquam vidi; auctoresque, qui earum descriptionem dederunt, nullam de numero dentium incisorum mentionem fecerunt. Nullæ in infimo ventre sacculum habent, ad fœtus recenter natos includendos, comparatum; in omnibus verò aliis, solo sacculo excepto, cum præcedentibus speciebus satis bene conveniunt. Forma capitis, rostri, caudæ, & pedum in 5 digitos fissorum, pollice distincto, est ferè eadem. Præterea, eodem ferè modo victitant; ob quas rationes, eas in hoc Genere reposui, usque dum exactis observationibus ipsarum characteris veram cognitionem habeamus.

4. Le Philandre du Brésil.

Philander pilis in exortu albis, in extremitate nigricantibus vestitus... Philander Brasiliensis.

Taijbi Brasilienſibus. *Raj. Syn. Quadr. p.* 185.
Marcgr. Hiſt. Br. p. 223.
Mus Tlaquatzin, ſeu Taijbi Braſilienſibus. *Klein. Quadr. p.* 59.
Tlaquatzin, ſeu Taijbi Braſilienſibus dicta. *Seb. Vol. I. p.* 57. *Fig. T.* 36. *F.* 4. [*Fig. bona*].
Taijbi. *Jonſt. Quadr. p.* 95.
Les Portugais l'appellent Cachorro domato. *Raj. Jonſt. Marcgr. Seba.*
Les Flamands, Boschratte. *Raj. Marcgr.*

Son corps est long de 14 doigts, depuis l'occiput jusqu'à l'origine de la queue. Son museau est pointu: ses yeux sont noirs, & à fleur de tête; ses oreilles arrondies, denuées de

Corporis longitudo, ab occipitio ad caudæ exortum, 14 est digitorum. Orem habet acutum; nigros & prominentes oculos; auriculas subrotundas, glabras, & te-

Digitized by Google

nuissimas; barbam barbæ *Felinæ* æmulam; caudam longissimam, ab exortu ad tertiam circiter longitudinis partem, pilis in exortu albis in extremitate nigricantibus obsitam, reliquâ longitudine squamulis tectâ. Per universum corpus vestitur pilis in exortu albis splendentibus, in extremitate nigricantibus, & magis quidem in dorso, maximè tamen in cruribus. Habitat in *Brasiliâ.*

poils, & fort minces. Il a une barbe semblable à celle d'un *Chat.* Sa queue, qui est très longue, est couverte, depuis son origine environ jusqu'au tiers de sa longueur, de poils blancs à leur origine & terminés de noirâtre; le reste est couvert de petites écailles. Les poils, qui couvrent tout son corps, sont d'un blanc éclattant à leur origine, & leur extrémité est noirâtre: cette derniere couleur est plus foncée sur le dos, & beaucoup plus encore sur les jambes. On le trouve au *Brésil.*

5. Le Philandre d'Amérique.

Philander saturatè spadiceus in dorso, in ventre dilutè flavus; pedibus albicantibus... Philander Americanus.

Mus Scalopes. *Klein. Quadr. p.* 58.
Mus sylvestris Americanus, *Scalopes* dictus. *Seb. Vol. I. p.* 48. *Fig. T.* 31. *Mas F.* 1. *Fœmina F.* 2. (*Fig. bonis*).
Scalopes. *Aldro. Quadr. dig. viv. p.* 416.
Les Brasiliens l'appellent Marmosa. *Seba.*

Magnitudine *Rattum* circiter æquat. Rostrum habet elongatum, & in acumen desinens; magnos & nigros oculos; auriculas latas, pendulas, rarisque dumtaxat pilis obsitas. Promissus mystax labium superius ornat. Cauda est longissima, omninò pilis destituta, & in extremo spiraliter intorta. Superior corporis pars, & oculorum circumferentia sunt saturatè spa-

Il est à peu près de la grandeur d'un *Rat.* Son museau est allongé, & se termine en pointe: ses yeux sont grands & noirs; ses oreilles larges, pendantes, garnies seulement de quelques poils clair-semés. Il a à la lévre supérieure une longue moustache. Sa queue est très longue, & tout à fait denuée de poils; & son extrémité est roulée en spirale. La partie supérieure du corps, & le tour des yeux sont

Digitized by Google

d'un rouge-bay foncé : le ventre & le front ſont d'un jaune clair : ſes pieds ſont ſans poils, & blanchâtres. On le trouve en *Amérique*.

diceæ ; venter autem cum fronte dilutè flavus : pedes glabri ſunt & albicantes. Habitat in *Americâ*.

6. Le Philandre d'Afrique.

Philander ſaturatè ſpadiceus in dorſo, in ventre ex albo flavicans, cauda ex ſaturatè ſpadiceo maculata... Philander Africanus.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 2.*
Mus Africanus, *Kayopollin* dictus. *Klein. Quadr. p. 58.*
Seb. Vol. I. p. 49. Fig. T. 31. F. 3. [*Fig. bona*].
Mus Indicus, dictus *Coyopollin. Charlet. exer. p. 25. No. 5.*
Animal caudimanum, ſeu Coyopollin. *Euſ. Nieremb. p. 158.*
Coyopollin. *Jonſt. Quadr. p. 118.*
Fern. Hiſt. N. Hiſp. p. 10.

Il eſt de la grandeur, & de la figure du précédent ; il a ſeulement la tête plus groſſe, ainſi que la queue, qui eſt toute tachetée de rouge-bay foncé. Ses oreilles ſont très minces & tranſparentes. La partie ſupérieure de ſon corps eſt d'un rouge-bay foncé ; ſon ventre d'un blanc jaunâtre ; & ſes jambes & ſes pieds ſont blancs. On le trouve en *Afrique*.

Magnitudine & figurâ præcedentem æmulatur ; paulò tamen craſſius ejus caput eſt ; ita & cauda tantillùm craſſior & ex ſaturatè ſpadiceo maculata. Auriculæ tenuiſſimæ ſunt & tranſlucidæ. Corporis pars ſuperior ſaturatè ſpadicea eſt ; venter ex albo flavicans ; cruraque & pedes albi. Habitat in *Africâ*.

7. Le Philandre de Surinam.

Philander ex rufo helvus in dorſo, in ventre ex flavo albicans... Philander Surinamensis.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 2.*
Mus ſylveſtris Americanus, catulos ſuos ſuprà dorſum ferens. *Klein. Quadr. p. 58.*
Mus ſeu ſorex ſylveſtris Americanus. *Seb. Vol. I. p. 49. Fig. T. 31. Mas F. 4. Fœmina F. 5.* [*Fig. bonis*].

Digitized by Google

Magnitudine, & figurâ præcedentes æmulatur. Mirè lucidos habet oculos; auriculas nudas & rigidas; prolixam in labio superiore barbam; & suprà quemlibet oculum binas setas quasi *Suillas*; caudam glabram, in extremo spiraliter intortam, maculis saturatè spadiceis per totam longitudinem dispersis, in mare tantùm, non quidem in fœminâ. Corporis pars superior ex rufo helva est: venter, pedes, rostrum, & frons ex flavo albicant: & oculorum ambitus est saturatè fuscus. Ungues omnes pedum anteriorum, sicut & ungues pollicum pedum posteriorum, breves sunt & obtusi, reliquis unguibus acutis. Habitat in *Surinamensi Insulâ*.

Il est de la grandeur, & de la figure des précédents. Ses yeux sont brillants; ses oreilles dénuées de poils, & roides. Il a à la lévre supérieure une longue barbe; & sur chaque œil deux poils semblables à des soyes de *Cochon*. Sa queue est nuë, roulée en spirale à son extrémité, & marquetée, dans le mâle seulement, de taches d'un rouge-bay foncé. La partie supérieure du corps est d'un roux tirant sur le rouge clair: le ventre, les pieds, le museau & le front sont d'un jaune blanchâtre: & le tour des yeux est d'un brun foncé. Tous les ongles des pieds de devant, & ceux des pouces des pieds de derriere sont courts & obtus, & les autres sont aigus. On le trouve à *Surinam*.

8. Le Philandre a grosse teste.

Philander ex rufo luteus in dorso, in ventre ex flavo albicans, capite crasso... PHILANDER CAPITE CRASSO.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. Syst. nat. ed. 6. g. 23. sp. 2.*
Mus Americanus major, agrestis, capite grandi. *Klein. Quadr. p. 58.*
Mus seu sorex Americanus, major agrestis, capite grandi. *Seb. Vol. I. p. 50. Fig. T. 32. F. 8.* (*Fig. bona*).

Caput habet crassum, latum, & albicans; auriculas ingentes & glabras; prolixam in labio superiore barbam. Dorsum est ex rufo luteum: venter verò, cauda crura-

Il a la tête grosse, large & blanchâtre; les oreilles grandes & sans poils; une longue barbe à la lévre supérieure. Son dos est d'un roux qui tire sur le jaune: son ventre, le dessous de

Digitized by Google

ſa queue & de ſes jambes ſont d'un jaune blanchâtre. On le trouve en *Amérique*.

que ſubtùs ex flavo albicant. Habitat in *Americâ*.

9. Le Philandre a courte queue.

Philander obſcurè rufus in dorſo, in ventre helvus, caudâ brevi & craſſâ... PHILANDER CAUDA BREVI.

Didelphis mammis extrà abdomen. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 23. ſp. 2.*
Mus ſylveſtris Americanus. *Seb. Vol. I. p. 50. Fig. T. 31. F. 6. (Fig. bona).*

Il eſt de la grandeur, & de la figure du *Philandre de Surinam*. Ses oreilles ſont denuées de poils. Il a à la lévre ſupérieure une longue barbe; & ſur chaque œil deux poils ſemblables à des ſoyes de *Cochon*. Sa queue eſt courte & groſſe. Tous ſes ongles ſont aigus. Son dos eſt d'un roux foncé; ſon ventre d'un roux pâle: ſon muſeau & ſon front ſont d'un jaune blanchâtre; & le tour de ſes yeux eſt d'un brun foncé. On le trouve en *Amérique*.

Magnitudine & figurâ *Philandrum Surinamenſem* æmulatur. Glabras habet auriculas; prolixam in labio ſuperiore barbam; & ſuprà quemlibet oculum binas ſetas, quaſi *Suillas*; caudam brevem & craſſam; ungues omnes acutos. Obſcurè rufus eſt in dorſo; in ventre verò helvus: roſtrum & frons ex flavo albicant; & oculorum ambitus eſt ſaturatè fuſcus. Habitat in *Americâ*.

Digitized by Google

Fig. 4.

Fig. 2.

Fig. 6

Mairemeuve sculp.

Digitized by Google

Digitized by Google

FIGURARUM Explicatio.

Figura 1. Caput Armadilli Guianensis. *a*, *a*, dentes ipsius molares.

Fig. 2. Caput Musaranei. *a*, *a*, dentes incisores superiores. *b*, *b*, dentes incisores inferiores. *c*, *c*, *c*, dentes canini.

Fig. 3. Caput Erinacei. *a*, dentes incisores superiores. *b*, dentes incisores inferiores. *c*, *c*, dentes canini.

Fig. 4. Caput Pteropi. *a*, *a*, *a*, *a*, dentes incisores. *b*, *b*, *b*, dentes canini.

Fig. 5. Caput Prosimiæ. *a*, *a*, *a*, dentes incisores superiores. *b*, *b*, dentes incisores inferiores. *c*, *c*, dentes canini.

Fig. 6. Caput Vespertilionis Minoris. *a*, dentes incisores superiores. *b*, dentes incisores inferiores. *c*, dentes canini. *d*, dens incisorius superior intermedius ope microscopii auctus. *e*, dens incisorius inferior etiam ope microscopii auctus.

Fig. 7. Caput Talpæ. *a*, dentes incisores superiores. *b*, dentes incisores inferiores. *c*, *c*, dentes canini.

EXPLICATION des Figures.

Figure 1. Tête de l'Armadille de Cayenne. *a*, *a*, ses dents molaires.

Fig. 2. Tête de la Musaraigne. *a*, *a*, ses dents incisives supérieures. *b*, *b*, ses dents incisives inférieures. *c*, *c*, *c*, ses dents canines.

Fig. 3. Tête du Hérisson. *a*, ses dents incisives supérieures. *b*, ses dents incisives inférieures. *c*, *c*, ses dents canines.

Fig. 4. Tête de la Roussette. *a*, *a*, *a*, *a*, ses dents incisives. *b*, *b*, *b*, ses dents canines.

Fig. 5. Tête du Maki. *a*, *a*, *a*, ses dents incisives supérieures. *b*, *b*, ses dents incisives inférieures. *c*, *c*, ses dents canines.

Fig. 6. Tête de la Petite Chauve-Souris de notre pays. *a*, ses dents incisives supérieures. *b*, ses dents incisives inférieures. *c*, ses dents canines. *d*, une des dents incisives supérieures intermediaires grossie à la loupe. *e*, une des dents incisives inférieures aussi grossie à la loupe.

Fig. 7. Tête de la Taupe. *a*, ses dents incisives supérieures. *b*, ses dents incisives inférieures. *c*, *c*, ses dents canines.

Digitized by Google

TABLE

Digitized by Google

TABLE
DES QUADRUPEDES,

Selon l'Ordre dans lequel ils ſont rangés dans cet Ouvrage.

ORDRE I.

SECTION I.

I. *Genre du Fourmiller.*

1. LE Fourmiller *Tamanoir.*
2. Le Fourmiller.
3. Le Fourmiller aux longues oreilles.
4. Le Petit Fourmiller.

SECTION II.

II. *Genre du Pholidote.*

1. Le Pholidote.
2. Le Pholidote à longue queue.

ORDRE II.

SECTION I.

III. *Genre du Pareſſeux.*

1. Le Pareſſeux.
2. Le Pareſſeux de Ceylan.

SECTION II.

IV. *Genre de l'Armadille.*

1. L'Armadille.
2. L'Armadille Oriental.
3. L'Armadille des Indes.
4. L'Armadille du Mexique.
5. L'Armadille du Bréſil.
6. L'Armadille de Cayenne.
7. L'Armadille d'Afrique.

ORDRE III.

V. *Genre de l'Elephant.*

1. L'Elephant.

VI. *Genre de la Vache-Marine.*

1. La Vache-Marine.
2. Le Lamantin.

ORDRE IV.

VII. *Genre du Chameau.*

1. Le Chameau.
2. Le Dromadaire.
3. Le Chameau du Perou.
4. La Vigogne.

ORDRE V.

SECTION I.

VIII. *Genre de la Giraffe.*

1. La Giraffe.

IX. *Genre du Bouc.*

1. Le Bouc. La Chevre domeſtique.
2. La Chevre d'Angora.
3. Le Bouc-Eſtain.
4. La Petite Chevre d'Amérique.
5. Le Petit Chamois d'Amérique.
6. Le Chamois, ou l'Yzard.
7. La Gazelle des Indes.
8. La Gazelle.
9. La Gazelle du Bezoar.

Digitized by Google

10. La Gazelle d'Afrique.
11. La Gazelle de la Nouvelle Eſpagne.
12. La Chevre du Levant.
13. La Chevre de Sirie.
14. La Chevre de la Nouvelle Eſpagne.
15. La Chevre de Créte.

X. *Genre du Bellier.*

1. La Brebis Domeſtique.
2. La Brebis à large queue.
3. La Brebis à longue queue.
4. La Brebis d'Afrique.
5. La Brebis de Guinée.

XI. *Genre du Bœuf.*

1. Le Bœuf Domeſtique.
2. Le Buffle d'Afrique.
3. L'Aurochs.
4. Le Buffle.
5. Le Biſon blanc.
6. Le Biſon.
7. Le Biſon d'Amérique.
8. Le Bœuf ſauvage.

SECTION II.

XII. *Genre du Cerf.*

1. Le Cerf.
2. Le Cerf d'Allemagne.
3. Le Cerf de Canada.
4. Le Cerf de Groënland.
5. Le Chevreuil.
6. Le Karibou.
7. Le Daim.
8. Le Rhenne.
9. L'Elan.

SECTION III.

XIII. *Genre du Chevrotain.*

1. Le Chevrotain des Indes.
2. Le Chevrotain de Guinée.
3. Le Chevrotain de Surinam.
4. Le Chevrotain d'Afrique.
5. Le Muſc.

ORDRE VI.

XIV. *Genre du Cheval.*

1. Le Cheval.
2. Le Zébre, ou l'Âne rayé.
3. L'Aſne.
4. Le Mulet.
5. L'Aſne ſauvage.

ORDRE VII.

XV. *Genre du Cochon.*

1. Le Cochon Domeſtique.
2. Le Cochon de la Chine.
3. Le Sanglier.
4. Le Cochon de Guinée.
5. Le Sanglier des Indes Orientales.
6. Le Sanglier du Mexique.

ORDRE VIII.

XVI. *Genre du Rhinoceros.*

1. Le Rhinoceros.

ORDRE IX.

XVII. *Genre du Cabiai.*

1. Le Cabiai.

ORDRE X.

XVIII. *Genre du Tapir, ou Manipouris.*

1. Le Tapir, ou Manipouris.

ORDRE XI.

XIX. *Genre de l'Hippopotame.*

1. L'Hippopotame.

Digitized by Google

ORDRE XII.

SECTION I.

XX. *Genre du Porc-Epic.*

1. Le Porc-Epic.
2. Le Porc-Epic de la Nouvelle Eſpagne.
3. Le Porc-Epic de la Baye de Hudſon.
4. Le Porc-Epic d'Amérique.
5. Le Grand Porc-Epic d'Amérique.
6. Le Porc-Epic des Indes Orientales.

SECTION II.

XXI. *Genre du Caſtor.*

1. Le Caſtor, ou le Biévre.
2. Le Caſtor blanc.
3. Le Rat muſqué.
4. Le Rat muſqué de Canada.

XXII. *Genre du Liévre.*

1. Le Liévre.
2. Le Liévre blanc.
3. Le Liévre noir.
4. Le Lapin de notre pays.
5. Le Riche.
6. Le Lapin d'Angora.
7. Le Liévre du Bréſil.

XXIII. *Genre du Lapin.*

1. Le Lapin de Java.
2. L'Agouty.
3. Le Lapin d'Amérique.
4. Le Pak.
5. Le Lapin de Norvege.
6. Le Lapin d'Allemagne.
7. Le Lapin des Indes.
8. Le Lapin du Bréſil.

XXIV. *Genre de l'Ecureuil.*

1. L'Ecureuil.
2. L'Ecureuil blanc de Siberie.
3. L'Ecureuil noir.
4. L'Ecureuil varié.
5. L'Ecureuil d'Amérique.
6. L'Ecureuil de Virginie.
7. L'Ecureuil du Bréſil.
8. L'Ecureuil de la Nouvelle Eſpagne.
9. L'Ecureuil de la Caroline.
10. L'Ecureuil Palmiſte : *vulgairement* Rat Palmiſte.
11. L'Ecureuil de Barbarie.
12. L'Ecureuil volant.
13. L'Ecureuil volant de Siberie.
14. L'Ecureuil volant de Virginie.

XXV. *Genre du Loir.*

1. Le Loir.
2. Le Lérot.
3. Le Croque-noix.
4. La Marmotte de Bahama.
5. La Marmotte d'Amérique.
6. La Marmotte de Pologne.
7. La Marmotte des Alpes.
8. La Marmotte de Straſbourg.

XXVI. *Genre du Rat.*

1. Le Rat.
2. La Souris.
3. Le Rat de bois.
4. Le Grand Rat des champs.
5. La Souris d'Amérique.
6. Le Rat d'Amérique.
7. Le Rat blanc de Virginie.
8. Le Rat de Norvege.
9. Le Mulot.
10. Le Rat Oriental.
11. Le Rat d'eau.
12. Le Petit Rat des champs.

SECTION III.

XXVII. *Genre de la Muſaraigne.*

1. La Muſaraigne.
2. La Muſaraigne du Bréſil.

SECTION IV.

XXVIII. *Genre du Hériſſon.*

1. Le Hériſſon.

Digitized by Google

2. Le Hériſſon de Siberie.
3. Le Hériſſon de Malacca.
4. Le Hériſſon d'Amérique.

ORDRE XIII.

SECTION I.

XXIX. *Genre du Singe.*

Race I. Le Singe.
1. Le Singe.
2. L'Homme des bois.
3. Le Singe de Ceylan.

Race II. Le Singe Cynocéphale.
1. Le Singe Cynocéphale.
2. Le Singe Cynocéphale de Ceylan.

Race III. Le Babouin.
1. Le Babouin.

Race IV. Le Cercopithéque.
1. Le Sapajou brun.
2. Le Sapajou noir.
3. Le Sapajou cornu.
4. Le Sapajou à queue de Renard.
5. Le Petit Singe Négre.
6. Le Singe de Guinée.
7. Le Singe muſqué.
8. Le Sapajou jaune.
9. Le Singe varié.
10. Le Tamarind.
11. Le Petit Singe-Lion.
12. Le Petit Singe de Para.
13. Le Singe à queue de Rat.
14. Le Sagouin.
15. Le Singe à queue de Lion.
16. Le Singe-Lion.
17. Le Singe verd.
18. Le Grand Singe de la Cochinchine.
19. Le Singe de Guinée à barbe jaunâtre.
20. Le Singe roux de Cayenne.
21. Le Singe blanc à barbe noire.
22. Le Singe noir à barbe blanche.
23. Le Singe de Guinée à barbe blanche.
24. Le Singe barbu.
25. Le Singe barbu à queue de Lion.
26. Le Singe noir d'Egypte.
27. Le Singe roux d'Egypte.
28. Le Petit Singe du Mexique.
29. Le Belzébut.

Race V. Le Cercopithéque Cynocéphale.
1. Le Cercopithéque Cynocéphale.
2. Le Makaque.
3. Le Magot, ou Tartarin.

SECTION II.

XXX. *Genre de la Rouſſette.*

1. La Rouſſette.
2. La Rouſſette à col rouge.
3. La Rouſſette à longues oreilles.

ORDRE XIV.

SECTION I.

XXXI. *Genre du Maki.*

1. Le Maki.
2. Le Maki aux pieds blancs.
3. Le Maki aux pieds fauves.
4. Le Maki à queue annelée.

SECTION II.

XXXII. *Genre de la Chauve-Souris.*

1. La Grande Chauve-Souris de notre pays.
2. La Petite Chauve-Souris de Ternate.
3. La Petite Chauve-Souris de notre pays.
4. La Grande Chauve-Souris de Ternate.
5. La Chauve-Souris rouſſe d'Amérique.
6. La Chauve-Souris d'Amérique.

Digitized by Google

ORDRE XV.

XXXIII. *Genre du Phocas.*

1. Le Phocas, ou Veau-Marin.

ORDRE XVI.

SECTION I.

XXXIV. *Genre de l'Hyene.*

1. L'Hyene.

XXXV. *Genre du Chien.*

1. Le Chien.
2. Le Loup.
3. Le Loup doré.
4. Le Loup du Mexique.
5. Le Renard.
6. Le Renard croisé.
7. Le Renard gris.
8. Le Renard blanc.

XXXVI. *Genre de la Belette.*

1. La Belette.
2. L'Hermine.
3. Le Furet.
4. Le Furet des Indes.
5. Le Furet de Java.
6. Le Vison.
7. La Fouine.
8. La Marte.
9. La Marte Zibeline.
10. Le Putois.
11. Le Putois rayé.
12. L'Ichneumon, ou la Mangouste; *vulgairement*, le Rat de Pharaon.
13. La Genette.

XXXVII. *Genre du Blaireau.*

1. Le Blaireau, ou Taisson.
2. Le Blaireau blanc.
3. Le Blaireau du Surinam.
4. La Civette.

XXXVIII. *Genre de l'Ours.*

1. L'Ours.
2. L'Ours blanc.
3. L'Ours de la Baye de Hudson.
4. Le Coati.
5. Le Coati-Mondi.
6. Le Coati-Mondi à queue annelée.

XXXIX. *Genre du Chat.*

1. Le Chat Domestique.
2. Le Chat sauvage.
3. Le Chat sauvage tigré.
4. Le Chat d'Angora.
5. Le Lion.
6. Le Tigre.
7. Le Tigre Royal.
8. Le Tigre d'Amérique.
9. Le Tigre Noir.
10. Le Tigre-Barbet, ou le Tigre frisé.
11. Le Tigre rouge.
12. Le Leopard.
13. Le Chat-Pard.
14. Le Chat-Cervier.
15. Le Loup-Cervier.

SECTION II.

XL. *Genre de la Loutre.*

1. La Loutre.
2. La Loutre du Brésil.

ORDRE XVII.

XLI. *Genre de la Taupe.*

1. La Taupe.
2. La Taupe blanche.
3. La Taupe variée.
4. La Taupe de Virginie.
5. La Taupe rouge d'Amérique.
6. La Taupe dorée de Siberie.

ORDRE XVIII.

XLII. *Genre du Philandre.*

1. Le Philandre.

Digitized by Google

2. Le Philandre Oriental.
3. Le Philandre d'Amboine.
4. Le Philandre du Bréſil.
5. Le Philandre d'Amérique.
6. Le Philandre d'Afrique.
7. Le Philandre de Surinam.
8. Le Philandre à groſſe tête.
9. Le Philandre à courte queue.

Digitized by Google

TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre: la lettre R, la Race: & la lettre E, l'Eſpece.

A.

	G.	E.
AGneau,	10	1.
Agouti,	23	2.
Agouty,	23	2.
Aſne,	14	3.
— Rayé,	14	2.
— Sauvage,	14	2.
—	14	5.
Armadille,	4.	
—	4	1.
— D'Afrique,	4	7.
— Du Bréſil,	4	5.
— De Cayenne,	4	6.
— Des Indes,	4	3.
— Du Mexique,	4	4.
— Oriental,	4	2.
Aurochs,	11	3.

B.

	G.	R.	E.
BAbouin,	29	3.	
—	29	3	1.
Belette,	36		
—	36		1.
Bellier,	10		
—	10		1.
Belzébut,	29	4	29.
Bête à la grande dent,	6		1.
Biche,	12		1.
— Des Bois,	12		5.
— Des Paletuviers,	12		5.
Biévre,	21		1.
Biſon,	11		6.
— Amériquain,	11		7.
— D'Amérique,	11		7.
— Blanc,	11		5.
Blaireau,	37.		
—	37		1.
— Blanc,	37		2.
— De Surinam,	37		3.
Bœuf,	11.		
—	11		1.
— Domeſtique,	11		1.
— Marin,	6		2.
— Sauvage,	11		8.
Bouc,	9		
—	9		1.
Bouc-Eſtain,	9		3.
Brebis,	10		1.
— D'Afrique,	10		4.
— Domeſtique,	10		1.
— De Guinée,	10		5.
— A l'arge queue,	10		2.
— A longue queue,	10		3.
Buffle,	11		4.
—	11		7.
— D'Afrique,	11		2.

C.

	G.	R.	E.
CAbiai,	17.		
—	17		1.
Caſtor,	21.		
—	21		1.
— Blanc,	21		2.
Cercopithéque,	29	4.	
— Cynocéphale,	29	5.	
—	29	5	1.

Digitized by Google

	G.	E.
Cerf,	12.	
—	12	1.
— D'Allemagne,	12	2.
— De Canada,	12	3.
— De Groënland,	12	4.
Chameau,	7.	
—	7	1.
—	7	2.
— Du Perou,	7	3.
Chamois,	9	6.
— (Petit) d'Amérique,	9	5.
Chat,	39.	
— D'Angora,	39	4.
— Cervier,	39	14.
— Domestique,	39	1.
— Epineux,	20	4.
— Pard,	39	13.
— Sauvage,	39	2.
— Sauvage tigré,	39	3.
— Tigre,	39	3.
Chauve-Souris,	32.	
— D'Amérique,	32	6.
— (Grande) de notre pays,	32.	1.
— (Grande) de Ternate,	32	4.
— (Petite) de notre pays,	32	3.
— (Petite) de Ternate,	32	2.
— Rousse d'Amérique,	32	5.
Cheval,	14.	
—	14	1.
— Marin,	19	1.
— Ongre,	14	1.
Chevre,	9	1.
— D'Angora,	9	2.
— De Congo,	13	1.
— De Créte,	9	15.
— Domestique,	9	1.
— Du Levant,	9	12.
— De la Nouvelle Espagne,	9	14.
— (Petite) d'Amérique,	9	4.
— Privée,	9	1.
— De Sirie,	9	13.
Chevreau,	9	1.
Chevreuil,	12	5.
— Du Brésil,	12	5.
Chevrotain,	13.	
— D'Afrique,	13	4.
— De Guinée,	13	2.
— Des Indes,	13	1.
— De Surinam,	13	3.
Chien,	35.	
—	35	1.
— Marin,	33	1.
— De mer,	33	1.
Chienne,	35	1.
Civette,	37	4.
Coati,	38	4.
— Mondi,	38	5.
—	38	6.
— Mondi à queue annelée,	38	6.
— Simplement dit,	38	4.
Cochon,	15.	
—	15	1.
— De la Chine,	15	2.
— Domestique,	15	1.
— D'Eau,	17	1.
— De Guinée,	15	4.
— d'Inde,	23	7.
— Noir,	15	6.
— De Terre,	1	1.
Croque-Noix,	25	3.

D.

	G.	E.
DAim,	12	7.
— D'Espagne,	12	7.
— De Groënlande,	12	4.
— De Virginie,	12	7.
Diable de Java,	2	1.
— De Tajoan,	2	2.
Dromadaire,	7	2.

E

	G.	E.
ECureuil,	24.	
—	24	1.

— D'Amérique,

Digitized by Google

	G.	E.
— D'Amérique,	24	5.
— De Barbarie,	24	11.
— Blanc de Siberie,	24	2.
— Du Bréſil,	24	7.
— De la Caroline,	24	9.
— (Grand) Gris,	24	6.
— Noir,	24	3.
— De la Nouvelle Eſpagne,	24	8.
— Palmiſte,	24	10.
— De Terre,	24	9.
— Varié,	24	4.
— De Virginie,	24	6.
— Volant,	24	12.
— Volant de Siberie,	24	13.
— Volant de Virginie,	24	14.
Elan,	9	7.
—	12	9.
Elant,	12	9.
Elephant,	5.	
—	5	1.

F.

	G.	E.
Faon,	12	1.
Fouine,	36	7.
Fourmiller,	1.	
—	1	2.
— Aux longues oreilles,	1	3.
— (Petit)	1	4.
— *Tamanoir*,	1	1.
Furet,	36	3.
— De Java,	36	5.
— Des Indes,	36	4.

G.

	G.	E.
Gazelle,	9	8.
— D'Afrique,	9	10.
— Du Bezoar,	9	9.
— Des Indes,	9	7.
— De la Nouvelle Eſpagne,	9	11.
Genette,	36	13.
Giraffe,	8.	
—	8	1.

H.

	G.	R.	E.
Haſe,	22		1.
Hériſſon,	28.		
—	28		1.
— D'Amérique,	28		4.
— De Malacca,	28		3.
— De Siberie,	28		2.
Hermine,	36		2.
Hippopotame,	19.		
—	19	1	1.
Homme des bois,	29	1	2.
Hyene,	34.		
—	34		1.

I.

	G.	E.
Ichneumon,	36	12.
— De Yzquiepatl,	37	3.
Jumene,	14	1.

K.

	G.	E.
Karibou,	12	6.

L.

	G.	E.
Lamantin,	6	2.
Lapin,	23.	
—	22	4.
— D'Allemagne,	23	6.
— D'Amérique,	23	3.
— D'Angora,	22	6.
— De Bahama,	25	4.
— Du Bréſil,	23	8.
— De Java,	23	1.
— Des Indes,	23	7.
— De Norvege,	23	5.
— De Notre pays,	22	4.
Lapreau,	22	4.
Laye,	15	3.
Leopard,	39	12.
Lérot,	25	2.
Lévraut,	22	1.
Lezard de Cluſius,	2	2.

Digitized by Google

	G.	E.
— Ecaillé,	2	1.
— Ecailleux,	2	1.
— Des Indes Orientales,	2	2.
Liévre,	22.	
—	22	1.
— Blanc,	22	2.
— Du Bréſil,	22	7.
— De Java,	23	1.
— Noir,	22	3.
Lion,	39	5.
Lionne,	39	5.
Loir,	25.	
—	25	1.
Loup,	35	2.
— Cervier,	36	15.
— Doré,	35	3.
— Marine,	33	1.
— Du Mexique,	35	4.
— Tigre,	39	10.
Loutre,	40.	
—	40	1.
—	40	2.
— Du Bréſil,	40	2.
Louve,	35	2.
Louveteau,	35	2.
—	38	3.
Linx,	39	15.

M.

	G.	R.	E.
Magot,	29	5	3.
Makaque,	29	5	2.
Maki,	31.		
—	31		1.
— Aux pieds blancs,	31		2.
— Aux pieds fauves,	31		3.
— A queue annelée,	31		4.
Mange-Fourmis,	1		1.
Mangeur de Fourmis,	1		2.
— (Gros)	1		1.
— (Petit)	1		4.
Mangouſte,	36		12.
Manicou,	42		1.
Manipouris,	18.		
—	18		1.

	G.	E.
Marcaſſin,	25	3.
Marmotte,	25	7.
— Des Alpes,	25	7.
— Amériquaine,	25	5.
— D'Amérique,	25	5.
— De Bahama,	25	4.
— De Pologne,	25	6.
— De Straſbourg,	25	8.
Marte,	36	8.
— Zibeline,	36	9.
Mouton,	10	1.
— De Perou,	7	3.
Mule,	14	4.
Mulet,	14	4.
Mulot,	26	9.
Muſaraigne,	27.	
—	27	1.
— Du Bréſil,	27	2.
Muſc,	13	5.

O.

	G.	E.
Orignal,	12	9.
Ours,	38.	
—	38	1.
— De la Baye de Hudſon,	38	5.
— Blanc,	38	2.
— (Petit)	38	3.

P.

	G.	E.
Pak,	23.	4.
Panthere,	39	12.
Pareſſeux,	3.	
—	3	1.
— De Ceylan,	3	2.
Philandre,	42.	
—	42	1.
— D'Afrique,	42	6.
— D'Amboine,	42	3.
— D'Amérique,	42	5.
— Du Bréſil,	42	4.
— A courte queue,	42	9.
— A Groſſe tête,	42	8.

Digitized by Google

	G.	E.
— Oriental,	42	2.
— De Surinam,	42	7.
Phocas,	33.	
—	33	1.
Pholidote,	2.	
—	2	1.
— A longue queue,	2	2.
Porc,	15	1.
Porc-Epic,	20.	
—	20	1.
— D'Amérique,	20	4.
— De l'Amérique Septentrionale,	20	3.
— De la Baye de Hudson,	20	3.
— (Grand) d'Amérique,	20	5.
— Des Indes Orientales,	20	6.
— De la Nouvelle Espagne,	20	2.
Porte-Corne,	16	1.
Poulain,	14	1.
Puant,	42	1.
Putois,	36	10.
—	36	11.
— Rayé,	36	11.

R.

	G.	E.
RAt,	26.	
—	26	1.
— D'Amérique,	26	6.
— Blanc de Virginie,	26	7.
— De Bois,	26	3.
— D'Eau,	26	11.
— (Grand) des Champs,	26	4.
— Musqué,	21	3.
—	21	4.
— Musqué de Canada,	21	4.
— De Norvege,	26	8.
— Oriental,	26	10.
— Palmiste,	24	10.
— (Petit) des Champs,	26	12.
— De Pharaon,	36	12.
— De Pont,	24	12.
— De Tartarie,	24	12.
Renard,	35	5.
— Amériquain,	1	1.
— Blanc,	35	8.
— Croisé,	35	6.
— Gris,	35	7.
Rhenne,	12	8.
Rhinoceros,	16.	
—	16	1.
Riche,	22	5.
Rouſſette,	30.	
—	30	1.
— A col rouge,	30	2.
— A longues oreilles,	30	3.

S.

	G.	R.	E.
SAgouin,	29	4	14.
Sanglier,	15		3.
— Appellé *Pecaris*,	15		6.
— Des Indes Orientales,	15		5.
— Du Mexique,	15		6.
Sapajou Brun,	29	4	1.
— Corne,	29	4	3.
— Jaune,	29	4	8.
— Noir,	29	4	2.
— A queue de Renard,	29	4	4.
Singe,	29.		
—	29	1.	
—	29	1	1.
— Barbu,	29	4	24.
— Barbu à queue de Lion,	29	4	25.
— Blanc à barbe noire,	29	4	21.
— De Ceylan,	29	1	3.
— Cynocéphale,	29	2.	
—	29	2	1.
— Cynocéphale de Ceylan,	29	2	2.
— [Grand] de la Cochinchine,	29	4	18.
— De Guinée,	29	4	6.
— De Guinée à barbe blanche,	29	4	23.
— De Guinée à barbe jaunâtre,	29	4	19.

Digitized by Google

	G.	R.	E.
— Lion,	29	4	16.
— Musqué,	29	4	7.
— Noir à barbe blanche,	29	4	22.
— Noir d'Egypte,	29	4	26.
— [Petit] Lion,	29	4	11.
— [Petit] du Mexique,	29	4	28.
— [Petit] Negre,	29	4	5.
— [Petit] de Para,	29	4	12.
— A queue de Lion,	29	4	15.
— A queue de Rat,	29	4	13.
— Rouge,	29	4	20.
— Rouge de Cayenne,	29	4	20.
— Roux d'Egypte,	29	4	27.
— Varié,	29	4	9.
— Verd,	29	4	17.
Souris,	26		2.
— D'Amérique,	26		5.

T.

	G.	R.	E.
Taisson,	37		1.
Tamanoir,	1		1.
Tamarind,	29	4	10.
Tapir,	18.		
—	18		1.
Tartarin,	29	5	3.
Taupe,	41.		
—	41		1.
— Blanche,	41		2.
— Dorée de Siberie,	41		6.
— Rouge d'Amérique,	41		5.
— Variée,	41		3.
— De Virginie,	41		4.
Taureau,	11		1.
Tigre,	39		6.
—	39		8.
—	39		11.
— D'Amérique,	39		8.
— Barbet,	39		10.
— (Espece de)	39		9.
— Frisé,	39		10.
— De la grande espece,	39		7.
— (Gros) de la Guiane,	39		8.
— (Loup)	39		10.
— Noir,	39		9.
— Rouge,	39		11.
— Royal,	39		7.
Truye,	15		1.

V.

	G.	E.
Vache,	11	1.
— Marine,	6.	
—	6	1.
Veau,	11	1.
— Marin,	33.	
—	33	1.
— De Mer,	33	1.
Verrat,	15	1.
Vigogne,	7	4.
Vison,	36	6.

Y.

	G.	E.
Yzard,	9	6.

Z.

	G.	E.
Zébre,	14	2.

Digitized by Google

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; Litteræ ST, Stirpem, & Littera S, Speciem.

A.	G.	ST.	S.
A Bada,	16		1.
A Acanthio terrestris,	28		1.
Acanthion aculeis longissimis,	28		3.
— Cauda prælonga &c,	20		6.
— Cristatus,	20		2.
— Echinatus,	28		2.
	28		4.
— Vulgaris nostras,	28		1.
Acbar,	26		2.
Acbera,	26		2.
Acuti,	23		2.
Adil,	35		3.
Æber,	15		1.
Ælg,	12		9.
Aft,	29	1	1.
Africana,	39		12.
Agarono,	10		1.
Agilis,	3		1.
Agna,	10		1.
Agneau,	10		1.
Agnello,	10		1.
Agno,	10		1.
Agnus,	10		1.
Agouti,	23		2.
Agouty,	23		2.
Aguti,	23		2.
Ahu,	9		6.
Ai,	3		1.
Aial,	12		1.
Aiala,	12		1.
Aiatochtli,	4		5.

	G.	ST.	S.
Aiela,	12		1.
Aielet,	12		1.
Ail,	10		1.
Αἴλουρος,	39		1.
Αἴξ,	9		1.
Akbar,	25		1.
Akbera,	25		1.
Alaoüata,	29	4	20.
Alce,	12		9.
— Vera & legitima,	12		9.
Alces,	12		9.
Aleph,	11		1.
Algazel,	9		8.
— Ex Aphrica,	9		10.
Αλκη,	12		9.
Αλκαξὲ,	35		5.
Ana,	10		1.
Ane,	14		3.
— Rayé,	14		2.
— Sauvage,	14		2.
—	14		5.
Animal, (Asiaticum)	35		3.
— Bezoarticum Orientale,	9		9.
— Caudimanum,	42		6.
— Cuncta prætentans manibus,	38		4.
— (Elegantissimum)	29	1	3.
— Ermineum recentiorum,	36		2.
— (Exoticum)	4		3.
— Magnum,	12		9.
— Moschiferum,	13		5.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
— Ex Moſcovia,	21		3.
Muſci,	13		5.
— Necrophagum,	34		1.
— Zibethi,	37		4.
— Zibethicum,	37		4.
Animalculum Cynocephalum Ceylonicum,	29	2	2.
Anſe,	9		1.
Anſeb,	32		1.
Ant-Bear, (Great)	1		1.
— [Leſſer]	1		2.
Anta,	18		1.
Aonaré,	42		1.
Ape,	29	1	1.
Aper,	15		3.
— Agreſtis,	15		3.
— Indicus,	15		5.
—	15		6.
— Mexicanus,	15		6.
— Mexicanus Moſchiferus,	15		6.
— Orientalis,	15		5.
Aperea,	23		8.
Arctomys Paleſtinæ,	25		8.
Arctopithecus,	5		2.
—	29	3	1.
Ari,	39		5.
Ariavan,	39		5.
Ariech,	39		5.
Aries,	10.		
—	10		1.
— Albus Judeorum,	10.		5.
— Cretenſis,	9		15.
— Cretenſis Strepſiceros,	9		15.
— Guineenſis,	10		5.
— Orientalis,	10		2.
Ariete,	10		1.
Ἄρκτος,	38		1.
Armadille,	4.		
—	4		1.
— D'Afrique,	4		7.
— Du Bréſil,	4		5.
— De Cayenne,	4		6.
— Des Indes,	4		3.
— Du Mexique,	4		4.
— Oriental,	4		2.
Armadillo,	4		1.
—	4		2.
—	4		4.
—	4		5.
—	4		6.
— Africanus,	4		7.
— Braſilianus,	4		5.
— Guianenſis,	4		6.
— Indicus,	4		3.
— Mexicanus,	4		4.
— Nothus,	4		7.
— Orientalis,	4		2.
— (Weſle-Headed)	4		1.
Armelino,	36		2.
Armodillo,	2		1.
— Africanus,	4		7.
— Americanus,	4		6.
— Orientalis,	4		2.
Armodillus ſquamatus major,	2		1.
Arneba,	22		1.
Arnebet,	22		1.
Arneph,	22		1.
Aroe, [Pelandor]	42		2.
Aſad,	39		5.
Aſbetha,	14		1.
Aſiaticum Animal,	35		3.
Aſiniferus,	14		5.
Aſinus,	14		3.
— Biformis,	14		4.
— Domeſticus,	14		3.
— Hybridus,	14		4.
— Sylveſtris,	14		5.
Aſna,	14		3.
Aſno,	14		3.
Aſpalax,	41		6.
Ἀσπάλαξ,	41		1.
Aſs, (Wild)	14		5.
Aſſapanick,	24		12.
Aſſe,	14		3.
Ataleph,	32		1.
Ataleph,	32		1.

Digitized by Google

	G.	S.
Aver-Ochs,	11	3.
Aurochs,	11	3.
Ayotochtli,	4	4.

B.

	G.	ST.	S.
Babi-Roesa,	15		5.
Babian,	29	3	1.
Babio,	29	3	1.
Baboon,	29	3	1.
Babouin,	29	3.	
—	29	3	1.
Babuino,	29	3	1.
Babyrouſſa,	15		5.
Bactrianns,	7		1.
Badger,	37		1.
Bäffwer,	21		1.
Baiel,	14		1.
Bakar,	11		1.
Ballottula,	36		1.
Baphas,	32		1.
Bär,	38		1.
Barah,	10		1.
Barbaſtello,	32		1.
Bardato,	4		4.
Barg,	25		1.
Baris,	29	1	2.
Barrus,	5		1.
Bat,	32		1.
Baviaan,	29	3	1.
Bauwol,	11		4.
Bawol,	11		4.
Beal,	14		4.
Bear,	38		1.
Beaver,	21		1.
Beccho,	9		1.
Beer,	38		1.
Behemot,	19		1.
Belbus,	34		1.
Belette,	36.		
—	36		1.
Bellier,	10.		
—	10		1.
Belzébut,	29	4	29.
Benula,	36		1.

	G.	S.
Beſangerah,	22	4.
Beſchet,	7	1.
Bête à la grande dent,	6	1.
Bevaro,	21	1.
Bever,	21	1.
Bevero,	21	1.
Biber,	21	1.
Biche,	12	1.
— Des Bois,	12	5.
— Des Paletuviers,	12	5.
Bicho Vergonhôſo,	2	2.
Bievre,	24	2.
Biörn,	38	1.
Biſem-Muſs,	27	1.
Biſemreech,	13	5.
Biſemthier,	13	5.
Biſon,	1	6.
— Amériquain,	1	7.
— D'Amérique,	11	7.
— Blanc,	11	5.
Biſon,	11	3.
—	11	6.
— Albus,	11	5.
— Albus Calydonius,	11	5.
— Albus Scoticus,	11	5.
— Americanus,	11	7.
— Indicus,	11	7.
— Jubatus,	11	6.
— Scoticus,	11	5.
Bison,	11	6.
Bivaro,	21	1.
Blaireau,	37.	
—	37	1.
— Blanc,	37	2.
— De Surinam,	37	3.
Blårâf,	35	8.
Blerellus,	37	1.
Boar,	15	1.
— (Wild)	15	3.
Bobak,	25	6.
Bobr,	21	1.
Bock,	9	1.
Bœuf,	11.	
—	11	1.
— Domeſtique,	14	1.

Digitized by Google

	G.	S.
— Marin,	6	2.
— Sauvage,	11	8.
Bomarin,	19	1.
Βόναρις,	11	8.
Bonasus,	11	8.
Boophagus,	34	1.
Borsuk,	37	1.
Bos,	11.	
—	11	1.
— Africanus Bellonii,	11	2.
— Domesticus,	11	1.
— (Elegans & Parvus Africanus)	11	2.
— (Exiguus Africanus)	11	2.
Boschratte,	23	8.
—	42	4.
Βούβαλις,	11	4.
Bouc,	9.	
—	9	1.
Bouc-Estain,	9	3.
Bove Marino,	33	1.
Βοῦς,	11	1.
Bradypus &c,	3.	
Bandhirts,	12	2.
Brebis,	10	1.
— D'Afrique,	10	4.
— Domestique,	10	1.
— De Guinée,	10	5.
— A large queue,	10	2.
— A longue queue,	10	3.
Brock,	37	1.
Bubalus,	11	2.
—	11	4.
— Africanus,	11	2.
— Veterum,	11	2
— Vulgaris,	11	4.
Bäch Marder,	36	7.
Buck,	12	7.
Bue,	11	1.
Buey,	11	1.
— (Pege)	6	2.
Bufalo,	11	4.
Bufano,	11	4.
Buffel,	11	4.
— (Wilde)	11	8.
Buffelus,	11	4.
Buffes,	11	3.
Buffle,	11	4.
—	11	7.
— D'Afrique,	11	2.
Bugill,	11	4.
Buk,	15	1.
Bulges,	11	3.
Bull,	11	1.
Buntsing,	36	10.
Buo Marino,	33	1.
Bupotamus,	19	1.
Burro do Matto,	14	2.
Busan,	9	1.
Buyrezio,	11	1.
Buz,	9	1.

C.

	G.	ST.	S.
Caigoara,	15		6.
Caballus Marinus,	19		1.
Cabiai,	17.		
—	17		1.
Cabionara,	17		1.
Cabra,	9		1.
Cabrito,	9		1.
Cabron,	9		1.
Cabronzillo Montés,	12		5.
Cachorro Domato,	42		4.
Cagui Major,	29	4	10.
— Minor,	29	4	14.
Caitaia,	29	4	7.
—	29	4	14.
Caitaja,	29	4	7.
Caldah,	36		1.
Calf,	11		1.
—	12		1.
— (Sea)	33		1.
Camel,	7		1.
—	7		2.
Camello,	7		1.
Camelo Congener,	7		4.
Camelopardalin,	8		1.
Camelopardalis,	8		1.
Camelopardalus,	8		1.

Camelus,

Digitized by Google

	G.	S.
Camelus,	7.	
—	7	1.
—	7	2.
— Arabica,	7	2.
— Dromas,	7	2.
— Indicus,	8	1.
— Laniger,	7	4.
— Minimus,	7	2.
— Peruanus,	7	3.
—	7	4.
— Spurius,	7	3.
Camorcia,	9	6.
Campagnoli,	26	4.
—	26	12.
Camuza,	9	6.
Cane,	35	1.
Canicula aquatica,	40	1.
Canis,	35.	
—	35	1.
— Domeſticus,	35	1.
— Fluviatilis,	40	1.
— Pilis cervicis erectis, &c,	34	1.
— Ponticus,	21	1.
— Sylveſtris,	35	2.
— Volans ex Novâ Hiſpania,	30	3.
— Volans Ternatanus Orientalis,	30	1.
Caper,	9	1.
— Mambrinus,	10	5.
— Montanus Alberti,	9	3.
Capra,	9	1.
— &c,	13	1.
—	13	4.
— Bezaartica,	9	9.
— Bezoartica,	9	9.
— Cretenſis,	9	15.
— Domeſtica,	9	1.
— Fera Varroni,	9	3.
— Indica,	9	13.
— Mambrina,	9	13.
— Montés,	9	6.
— Moſchi,	13	5.
— Novæ Hiſpaniæ,	9	14.
— Orientalis,	9	12.
— Parva Americana,	9	4.
— Pazahartica,	9	9.
— Strepſiceros,	9	8.
— Sylveſtris Africana,	13	4.
— Syriaca,	9	13.
Caprea,	9	6.
—	12	5.
— Groenlandica,	12	4.
— Plinii,	12	5.
Capreolus,	12	5.
— Braſilianus,	12	5.
— Marinus,	12	5.
— Moſchi,	13	5.
Capricerva,	9	9.
Capricornus,	9	3.
Capriola,	12	5.
Capriolo,	12	5.
— Del Muſco,	13	5.
Capybara,	17	1.
Care,	14	3.
Carigoy,	42	1.
Carigue,	42	1.
Carigueibeju,	40	2.
Carigueibeju,	40	2.
Carigueya,	42	1.
— Braſilienſis,	42	1.
Carnero,	10	1.
Carnevoca,	26	2.
Carygueibeju,	40	2.
Caſtor,	21.	
—	21	1.
— Blanc,	21	2.
Caſtor,	21.	
—	21	1.
— Albus,	21	2.
— Cauda lineari tereti,	26	11.
Cat,	39	1.
— (Civet)	37	4.
— A Mountain,	39	13.
Cataph,	29	1 1.
Cataphractus,	4.	
Catharet,	36	10.
Catul,	39	1.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
Catus,	39		1.
— Cervarius,	39		14.
— Domeſticus,	39		1.
— Feralis,	39		2.
— Hiſpaniæ,	36		13.
— Montanus Americanoram,	39		13.
— Pardus,	39		13.
— Pardus Mexicanus,	39		13.
— Sylveſtris,	39		2.
— Sylveſtris ferus,	39		2.
— *Tepe Maxtlaton* dictus,	39		3.
— Tigrinus,	39		3.
— Zibethi,	37		4.
— Zibethicus,	37		4.
Cavallo,	14		1.
Cavia Aguti,	23		2.
— Aperea,	23		8.
— Bahamenſis,	25		4.
— Cobaya,	22		7.
—	23		7.
— Hudſonis,	20		3.
— Javenſis,	23		1.
— Paca,	23		4.
— Surinamenſis,	23		3.
Cavretto,	9		1.
Cavriola,	12		5.
Cavriolo,	12		5.
Cay,	29	4	5.
Cebalus,	36		9.
Cebus Angolenſis major,	29	5	2.
— Barbatus,	29	4	23.
— Barbatus alius Guineenſis,	29	4	19.
— Barbatus primus Cluſii,	29	4	25.
— Barbatus ſecundus Cluſii,	29	4	24.
— Caput mortuum,	29	4	13.
— Elaurandus,	29	4	21.
— Guariba,	29	4	2.
— Imberbis primus Cluſii,	29	4	15.
— Imberbis ſecundus Cluſii,	29	4	16.
— Moſchum redolens Braſilienſis,	29	4	7.
— Papio,	29	3	1.
— *Sagouin* dictus,	29	4	14.
— Similolus Ceylonicus,	29	4	8.
— Tertius Guineenſis,	29	4	6.
Cenalfa,	5		1.
Cercopithecus,	29	4	
—	29	5	1.
— Americanus minor,	29	4	13.
— Angolenſis major,	29	5	1.
— Barbatus alius Guineenſis,	29	4	19.
— Barbatus Cluſii,	29	4	25.
— Barbatus Guincenſis,	29	4	23.
— Barbatus maximus &c,	29	4	20.
— Barbatus primus Cluſii,	29	4	25.
— Barbatus ſecundus Cluſii,	29	4	24.
— Braſilianus primus,	29	4	7.
— Braſilianus ſecundus,	29	4	5.
— Braſilianus tertius,	29	4	14.
— *Caitaja* dictus,	29	4	7.
— Ceylonicus,	29	1	3.
— Cynocephalus,	29	5	
— *Guariba* dictus,	29	4	2.
— Guineenſis alius,	29	4	6.
— Guineenſis tertius,	29	4	6.
— Meerkatz,	29	4	2.
— Minimus &c,	29	4	10.
— Minor luteus,	29	4	8.
— *Monkje* dictus,	29	4	13.
— Moſcatus,	29	4	7.
— Niger &c,	29	4	22.
— Non Barbatus primus Cluſii,	29	4	15.
— Non Barbatus ſecundus Cluſii,	29	4	16.
— Sagouin,	29	4	14.
Cercopithéque,	29	4	
— Cynocéphale,	29	5	
—	29	5	1.

Digitized by Google

	G.	S.
Cerf,	12.	
—	12	1.
— D'Allemagne,	12	2.
— De Canada,	12	3.
— De Groëland.	12	4.
Cerva,	12	1.
— Parvula Africana,	13	1.
Cervo,	12	1.
Cervula Africana,	13	1.
— Subrubra,	13	3.
— Surinamensis subrubra,	13	3.
Cervulus,	12	5.
Cervus,	12.	
—	9	14.
—	12	1.
— Africanus,	13	2.
— Burgundicus,	12	6.
— Canadensis,	12	3.
— Cornibus simplicissimis,	8	1.
— Cornutus ex Nova Hispania,	9	14.
— Germanicus,	12	2.
— Groenlandicus,	12	4.
— Juvencus pergracilis Africanus,	13	1.
— Juvencus perpusillus Guineensis,	13	1.
— Major &c,	12	5.
— Minimus,	12	5.
— Minor &c,	12	5.
— Mirabilis,	12	8.
— Nobilis,	12	1.
— Odoratus,	13	5.
— Palmatus,	12	7.
—	12	8.
—	12	9.
— Platyceros,	12	7.
— Rangifer,	12	8.
— Temamaçama,	9	11.
Chameau,	7.	
—	7	1.
—	7	2.
— Du Perou,	7	3.
Chamois,	9	6.
— (Petit) d'Amérique,	9	5.
Chamor,	14	3.
Chasir,	15	2.
Chasira,	15	1.
Chat,	39.	
— D'Angora,	39	4.
— Cervier,	39	14.
— Domestique,	39	1.
— Epineux,	20	4.
— Pard,	39	13.
— Sauvage,	39	2.
— Sauvage Tigré,	39	3.
— Tigre,	39	3.
Chaus,	39	13.
Chauve-Souris,	32.	
— D'Amérique,	32	6.
— [Grande] de notre pays,	32	1.
— (Grande) de Ternate,	32	4.
— (Petite) de notre pays,	32	3.
— (Petite) de Ternate,	32	2.
— Rousse d'Amérique,	32	5.
Cheval,	14.	
—	14	1.
— Marin,	19	1.
— Ongre,	14	1.
Chevre,	9	1.
— D'Angora,	9	2.
— De Congo,	13	1.
— De Créte,	9	15.
— Domestique,	9	1.
— Du Levant,	9	12.
— De la Nouvelle Espagne,	9	14.
— (Petite) d'Amérique,	9	4.
— Privée,	9	1.
— De Sirie,	9	13.
Chevreau,	9	1.
Chevreuil,	12	5.
— Du Brésil,	12	5.
Chevrotain,	13.	
— D'Afrique,	13	4.
— De Guinée,	13	2.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
— Des Indes,	13		1.
— De Surinam,	13		3.
Chien,	35.		
—	35		1.
— Marin,	33		1.
— De Mer,	33		1.
Chienne,	35		1.
Chimpantée,	29	1	2.
Chirquinchum,	4		4.
Choakamna,	29	3	1.
Χοίρος,	15		1.
— Ἄγριος,	15		3.
Chomik,	25		8.
Chulda,	36		1.
Chuldah,	36		1.
Cierva,	12		1.
Ciervo,	12		1.
Cinghiale,	15		3.
Cinghiare,	15		3.
Civet Cat,	37		4.
Civetta,	37		4.
Civette,	37		4.
Coati,	38		4.
— Mondi,	38		5.
	38		6.
— Mondi à queue annelée,	38		6.
— Simplement dit,	38		4.
Coati,	38		4.
— Brasilienſium,	38		4.
— Cauda brevi,	37		1.
— Civetta,	37		4.
— Ginetta,	36		13.
— Griſeus,	37		1.
— Hernandeſii,	37		3.
— Urſulo affinis Americanus,	38		3.
Coaty,	1		4.
Cochon,	15.		
—	15		1.
— De la Chine,	15		2.
— Domeſtique,	15		1.
— D'Eau,	17		1.
— De Guinée,	15		4.
— D'Inde,	23		7.
— Noir,	15		6.
— De Terre,	1		1.
Coes-Coes,	42		3.
Coja-Metl,	15		6.
Comadreia,	36		1.
Comozza,	9		6.
Conéio,	22		4.
Conepatl,	37		3.
Coniglio,	22		4.
Cony,	22		4.
Cordero,	10		1.
Corza,	12		7.
Cotia,	23		2.
Cow,	11		1.
Coyametl,	15		6.
Coyopollin,	42		6.
Cricetus,	25		8.
Croque-Noix,	25		3.
Cuandu,	20		4.
— Major,	20		5.
Cuati,	38		4.
Cudana,	14		4.
Cuetlachtli,	35		4.
Cuguacu-Apara,	12		5.
— Ara,	39		11.
— Arana,	39		11.
— Eté,	12		5.
Cuniculi Braſilienſis ſpecies,	22		7.
—	23		2.
—	23		4.
Cuniculus,	23.		
—	22		4.
— Americanus,	23		3.
— Americanus & Guineenſis,	23		7.
— Angorenſis,	22		6.
— Braſilienſis,	22		7.
—	23		8.
— Germanicus,	23		6.
— Javenſis,	23		1.
— Indicus,	23		7.
—	23		8.
— Indus,	23		7.
— Major paluſtris,	23		4.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
— Norvagicus,	23		5.
— Noſtras,	22		4.
— Omnium vulgatiſſimus,	23		2.
Cynocephalus,	29	5	3.
— Primus,	29	2	1.
— Secundus,	29	5	3.

D.

	G.	S.
Dabha,	34	1.
Dabuh,	34	1.
Dachs,	37	1.
Dahab,	34	1.
Daim,	12	7.
— D'Eſpagne,	12	7.
— De Groënlande,	12	4.
— De Virginie,	12	7.
Daino,	12	7.
Dam,	12	7.
Dama,	12	7.
— Cervus,	12	7.
— Hiſpanica,	12	7.
— Recentiorum,	12	7.
— Virginiana,	12	7.
— Vulgaris,	12	7.
Damhirſch,	12	7.
Damhirts,	12	7.
Dämlin,	12	7.
Damula,	36	12.
Daniel,	12	7.
Danio,	12	7.
Dar,	37	1.
Daſypus &c,	4.	
— Cucurbitinus,	4	4.
Δασύπους,	22	4.
Deba,	8	1.
—	35	2.
Deeba,	35	2.
Deſman,	21	3.
Deſmanskatt,	36	13.
Diable de Java,	2	1.
— De Tajoan,	2	2.
Diabolus Tajovanicus,	2	1.
Dib,	35	2.
Didelphis &c,	42.	
Dikerin,	10	1.
Dob,	38	1.
Doe,	12	7.
Dof,	12	7.
Dofhiort,	12	7.
Dog,	35	1.
Donnola,	36	1.
Donola,	36	12.
Dorcas,	9	6.
—	12	5.
Δορκάδιον,	12	5.
Dormouſe,	25	3.
— (Greater)	25	2.
Dornſchweyn,	20	1.
Doujong,	6	2.
Dromadaire,	7	2.
Dromas,	7	2.
Δρομας,	7	2.
Dromedario,	7	2.
Dromedarius,	7	1.
—	7	2.
Dromedary,	7	2.
Duba,	38	1.
Dubbe,	38	1.
Dujung,	6	2.
Dzyka-Koſa,	9	6.

E.

	G.	S.
Ebamari,	7	2.
Echinus,	28	1.
— Braſilianus,	4	4.
— Indicus albus,	28	4.
— Sibiricus,	28	2.
— Terreſtris,	28	1.
— (Teſtudinatus)	4	3.
Ecureuil,	24.	
—	24	1.
— D'Amérique,	24	5.
— De Barbarie,	24	11.
— Blanc de Siberie,	24	2.
— Du Bréſil,	24	7.
— De la Caroline,	24	9.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
— (Grand) gris,	24		6.
— Noir,	24		3.
— De la Nouvelle Eſpagne,	24		8.
— Palmiſte,	24		10.
— De Terre,	24		9.
— Varié	24		4.
— De Virginie,	24		6.
— Volant,	24		12.
— Volant de Siberie,	24		13.
— Volant de Virginie,	24		14.
Eel,	10		1.
Egel,	11		1.
Egela,	11		1.
Egin,	7		2.
Eichhermelin,	24		1.
Ενίνος,	28		1.
Elan,	9		7.
—	12		9.
Elant,	12		9.
Ελαφος,	12		1.
Elegans & parvus Africanus Bos,	11		2.
Elegantiſſimum Animal,	29	1	3.
Elephant,	5.		
—	5		1.
Elephante,	5		1.
Elephas,	5.		
—	5		1.
— Africanus,	5		1.
Ελεφας,	5		1.
Elewandum,	29	4	21.
Elg,	10		1.
Elk,	12		9.
Elkerkedom,	16		1.
Ellend,	12		9.
Elſſiur,	12		9.
Encubertado,	4		4.
Encuberto,	4		4.
Enhôrning,	16		1.
Ενυδρις,	40		1.
Eques Arborum,	39		2.
Equi-Cervus,	12		9.
Equus,	14.		
—	14		1.
— Cicuratus,	14		1.
— Domeſticus,	14		1.
— Ferus,	14		2.
— Marinus,	6		1.
Erdmufz,	26		4.
Erinaceus,	28.		
—	28		1.
Americanus,	28		4.
— Americanus albus,	28		4.
— Auriculatus,	28		1.
— Malaccenſis,	28		3.
— Noſtras,	28		1.
— Sibericus,	28		2.
— Subauriculatus,	28		4.
— Surinamenſis,	28		4.
— Terreſtris,	28		1.
Erizo,	28		1.
Ermine,	36		2.
Ermineum,	36		2.
— (Animal) Recentiorum,	36		2.
Ernab,	22		1.
Eſel,	14		3.
Eſpinho,	20		4.
—	20		5.
Eſquilo,	24		1.
Exiguus Africanus Bos,	11		2.
Exoticum Animal,	4		3.
Exquima,	29	4	23.
— Guineenſis,	29	4	23.
Eychhorn,	24		1.
Eychorn,	24		1.
Eza,	9		1.
Ezel, [Wald]	14		5.

F.

	G.	S.
Fallow-Deer,	12	7.
Faon,	12	1.
Fätle,	15	1.
— [Span]	15	1.
Farra,	26	2.
Fawn,	12	7.
Fech,	24	4.
Feld Marder,	36	8.

Digitized by Google

	G.	S.
Feldmuſz,	26	4.
Feles,	39	1.
— Fera Tigrina,	39	3.
Felis,	39.	
—	39	1.
— Angorenſis,	39	4.
— Domeſtica,	39	1.
— Sylveſtris,	39	2.
— Sylveſtris Tigrina,	39	3.
— Sylveſtris Tigrinus,	39	3.
— Zibethi,	37	4.
Ferret,	36	3.
Fiallmus,	23	5.
Fiallracka,	35	8.
Fiber,	21	1.
Filfras,	34	1.
Fitchet,	36	1.
—	36	10.
Fl[e]dermus,	32	1.
Fl[e]dermuſs,	32	1.
Flitter-Mouſe,	32	1.
Flygande Ikorn,	24	12.
Flying Squirrel,	24	12.
Foar,	10	1.
Foetta,	36	10.
Foina,	36	7.
Foras Flebar,	19	1.
Fouine,	36	7.
Foumart,	36	1.
Fourmiller,	1.	
—	1	2.
— Aux longues oreilles,	1	3.
— (Petit)	1	4.
— *Tamanoir*,	1	1.
Fouyna,	36	7.
Fox,	35	5.
— (Gray)	35	7.
Foyna,	36	7.
Fret,	36	3.
Frett,	36	3.
Frettel,	36	3.
Fuchſs,	35	5.
Furam,	36	3.
Furet,	36	3.
— De Java,	36	5.
— Des Indes,	36	4.
Furette,	36	3.
Furo,	36	3.
Furunculus,	36	3.

G.

	G.	ST.	S.
Γαλη, Talpa,	36		1.
Galeopithecus,	36		1.
Galero,	29	4	14.
Galts,	25		1.
Gamal,	15		1.
Gamela,	7		1.
Gamo,	7		1.
Gamſs,	12		7.
Ganeme,	9		6.
Gata,	10		1.
Gato,	39		1.
— Montés,	39		1.
Gatta,	39		2.
Gatto,	39		1.
— [Lupo]	39		15.
Gazella,	9		7.
—	9		8.
— Africana,	9		8.
—	9		10.
— Bezoartica,	9		9.
— Indica,	9		7.
— Novæ Hiſpaniæ,	9		11.
Gazelle,	9		8.
— D'Afrique,	9		10.
— Du Bezoar,	9		9.
— Des Indes,	9		7.
— De la Nouvelle Eſpagne,	9		11.
Gehad,	39		5.
Geiſz,	9		1.
Gelen,	12		1.
Gelm,	12		9.
Gemal,	7		1.
Gemſs,	9		6.
Genas,	10		1.
Genethocatus,	36		13.
Genetta,	36		13.

Digitized by Google

	G.	S.
Genette,	36	13.
Genithkatz,	36	13.
Geſs,	28	1.
Get,	9	1.
Gevazen,	12	1.
Gezwecz,	37	1.
Gheit, (Wild)	9	3.
Ghiro,	25	1.
Ghush, (Siyah)	39	15.
Ginetta,	36	13.
Giraff,	8	1.
Giraffa,	8.	
—	8	1.
Giraffe,	8.	
—	8	1.
Girnaffa,	8	1.
Gitſe,	9	1.
Glama,	7	3.
Gliero,	25	1.
Glis,	25.	
—	25	1.
—	26	1.
— Americanus,	25	1.
— Cricetus,	25	1.
— Marmota Americanus,	25	1.
— Marmota Italis,	25	1.
— Moſchiferus,	21	1.
— Norvagicus,	26	1.
— Volans Ternatanus,	32	1.
Goat,	9	1.
Gomela,	16	1.
Goote, [Wild]	9	6.
Goſpand,	10	1.
Gote-Bucke,	9	1.
Gouandou,	20	4.
Gråf-ſvin,	37	1.
Graffa,	8	1.
Granbeſtia,	12	9.
Grau-Werck,	24	4.
Gray,	37	1.
— Fox,	35	7.
Greater-Dormouſe,	25	1.
— Sleeper,	25	1.
Greul,	25	1.
Gronoſtay,	36	2.
Groſſe-Haſſelmuſs,	25	1.
Guabiru,	26	1.
Guariba,	29	4 2.
Guiny Pig,	23	7.
Gulo,	34	1.
Gur,	39	5.
Gurba,	36	1.
Gyraffa,	8	1.

H.

	G.	S.
Haas,	22	1.
Hameſter,	25	8.
Hamſter,	25	8.
Harda,	24	1.
Hardy-Shrew,	27	1.
Hare,	22	1.
Hart,	12	1.
Haſe,	22	1.
Haſelmaus,	25	2.
Haſermuſs,	25	2.
Haſs,	22	1.
Haſſelmuſs, (Groſſe)	25	1.
Häſt,	14	1.
Haut,	3	1.
Hay,	3	1.
Hayma,	19	1.
Hedgehog,	28	1.
Hedgog, (Great Sterll'd)	4	4.
Heinit,	14	1.
Heirth,	10	1.
Helphant,	5	1.
Hiumm,	14	4.
Hericius,	28	1.
Herinaceus,	28	1.
Heriſſon,	28.	
—	28	1.
— D'Amérique,	28	4.
— De Malacca,	28	3.
— De Siberie,	28	2.
Herix,	28	1.
Herman,	10	1.
Hermelin,	36	2.
Hermellani,	36	2.

Hermellanus,

	G.	ST.	S.
Hermellanus,	36		2.
Hermine,	36		2.
Hiam,	13		5.
Hind,	12		1.
Hinde,	12		1.
— Kalb,	12		1.
Hindin,	12		1.
Hinnulus,	12		1.
— Pergracilis Africanus,	13		1.
Hiort,	12		1.
Hippelaphus,	12		2.
Hippopotame,	19.		
—	19		1.
Hippopotamus,	19.		
—	19		1.
— Antiquorum,	19		1.
— Falsò dictus,	6		1.
Hirco-Cervus,	12		2.
Hircus,	9.		
—	9		1.
— Angorensis,	9		2.
— Bezoarticus,	9		9.
— Bezoarticus,	9		9.
— Domesticus,	9		1.
— Ferus,	9		3.
— Pazaharticus,	9		9.
Hirpus,	35		2.
Hirs,	12		1.
Hirsch,	12		1.
Hirts,	12		1.
Histrice,	20		1.
Hœdus,	9		1.
Hog,	15		1.
— (Musk)	15		6.
Hogenain,	7		2.
Hogg,	10		1.
Hoitzlacuatzin,	20		2.
Hoitzlaquatzin,	20		2.
Homme des bois,	29	1	2.
Homo sylvestris,	29	1	2.
Hors-hwal,	6		1.
Horse,	14		1.
— (Sea)	6		1.
Huhfs Marder,	36		7.
Hund,	35		1.
— (Meer)	33		1.
— [Sal]	33		1.
— [Seal]	33		1.
— (See)	33		1.
Huron,	36		3.
Hyæna,	34.		
—	34		1.
— Gesneri,	29	3	1.
— Odorifera,	37		4.
— Veteribus,	37		4.
— (Zilio)	34		1.
Hydrochœrus,	17.		
—	17		1.
Hyene,	34.		
—	34		1.
Hystrix,	20.		
—	20		1.
—	20		5.
— Americanus,	20		4.
— Americanus major,	20		5.
— Genuina,	28		3.
— Hudsonis,	10		3.
— Malaccensis,	28		3.
— Novæ Hispaniæ,	10		2.
— Orientalis,	10		6.
— Orientalis cristata,	10		1.
— Orientalis singularis,	10		6.

I.

	G.	S.
Jachmur,	11	2.
Jackcall,	35	3.
Jackhais,	35	3.
Jaela,	9	3.
Jaguara,	39	8.
— Brasilienses,	39	8.
Jaguarete,	39	9.
— Brasilienses,	39	9.
Jakhals,	35	3.
Javali,	15	3.
Jazwice,	37	1.
Ibex,	9	3.
— Parvus Americanus,	9	5.
Ichiarl,	7	3.
Ichneumon,	36	12.

Digitized by Google

	G.	S.
— De Yzquiepatl,	37	3.
Ictis,	36	3.
— Scythica,	36	9.
Jelen,	12	1.
Jelijenii,	12	1.
Jesef,	34	1.
Jez,	28	1.
Igel,	28	1.
Igelkott,	28	1.
Ignavus,	3	1.
Jiya,	40	2.
Ikorn,	24	1.
— (Flygande)	24	12.
Ικτὶς,	36	3.
Iller,	36	10.
Iltis,	36	10.
Imar,	10	1.
Indianisch Künele,	23	7.
Indisch Seüle,	23	7.
Investigator,	36	12.
Ιππέλαφος,	12	8.
Ιπποποταμος,	19	1.
Ιππος,	14	1.
Jument,	14	1.
Jupatiima,	42	1.
Juvenca, [sylvestris]	11	2.
Ize,	9	1.
Izquiepotl,	37	3.

K.

	G.	S.
KAabe,	33	1.
Kabsa,	10	1.
Kæmelthier,	7	1.
Kalb,	11	1.
Kalba,	35	1.
Καμηλος,	7	1
Kanin,	22	4.
Kanisir,	15	1.
Καπρος,	15	3.
Karas,	16	1.
Karasch,	16	1.
Kargos,	22	1.
Karibou,	12	6.
Καστορ,	21	1.

	G.	ST.	S.
Katt,	39		1.
— (Desmans)	36		13.
— (Will)	39		13.
Katta,	39		1.
Kattlo,	39		14.
Katz,	39		1.
— (Genith)	36		13.
— Luchs,	39		14.
— (Meer)	29	4	2.
Katze, (Wilde,)	39		2.
Kebes,	10		1.
Kelbe,	35		1.
Keleb,	35		1.
Kenlée,	35		6.
Kepb,	35		1.
Kephir,	39		5.
Keret,	27		1.
Kipod,	28		1.
Ko,	11		1.
Kobyla,	14		1.
Koc,	39		1.
Koczka,	39		1.
Koe,	11		1.
Koger-Angan,	36		5.
Kolczawa,	36		1.
Kolpb,	35		1.
Kon,	14		1.
Koniin,	22		4.
Kopeda,	28		1.
Koph,	29	1	1.
Kophin,	29	1	1.
Korn Ferle,	25		8.
Korytansky,	9		6.
Koslik,	9		6.
Koszalka,	25		2.
Kot Dziki,	37		1.
—	39		2.
Kotzcohi,	9		3.
Koza,	9		1.
— (Dzyka)	9		6.
— Lesna,	12		5.
— Skalna,	9		6.
Kozel,	9		1.
Koziel,	9		1.
Kozoroziecz,	9		3.

Digitized by Google

	G.	S.
Kralik,	22	4.
Kret,	41	1.
—	41	2.
Κρίος,	10	1.
Krolik,	22	4.
Krolijk,	22	4.
Kronhiort,	12	1.
Kroſſreſf,	35	6.
Krticze,	41	1.
Krzyzaki,	35	6.
Κτίς,	36	3.
Ku,	11	1.
Kühe,	11	1.
Kun,	14	1.
Kuna,	36	8.
Künele,	22	4.
— (Indianiſch)	23	7.
Künigle,	22	4.
Kunlein,	22	4.
Kydd,	9	1.
Κύων,	35	1.

L.

	G.	S.
LAbi,	39	5.
Lacerta Indica,	2	2.
Lacertus Indicus ſquamoſus,	2	1.
— Squamoſus minor,	2	1.
— Squamoſus peregrinus,	2	2.
Låderlapp,	32	1.
Λαγὼς,	22	1.
Laiſch,	39	5.
Lam,	10	1.
Lamantin,	6	2.
Lamb,	10	1.
Lambe,	10	1.
Låmblin,	10	1.
Lanii,	12	1.
—	12	7.
Lapin,	23.	
—	22	4.
— D'Allemagne,	23	6.
— D'Amérique,	23	3.
— D'Angora,	22	6.
— De Bahama,	25	4.
— Du Bréſil,	23	8.
— De Java,	23	1.
— Des Indes,	23	7.
— De Norvege,	23	5.
— De notre pays,	22	4.
Lapreau,	22	4.
Laſica Leſna,	36	3.
Laſino,	14	3.
Laska,	36	3.
Laye,	15	3.
Leem,	23	5.
Lekat,	36	2.
Lekatt,	36	2.
Leming,	25	5.
Leo,	39	5.
Leœna,	39	5.
Leon,	39	5.
Λέων,	39	5.
Leone,	39	5.
Leonpardal,	39	12.
Leonpardo,	39	12.
Leopard,	39	12.
Leopardus,	39	12.
Leophante,	5	1.
Leparde,	39	12.
Leppard,	39	12.
Lepre,	22	1.
Lepus,	22.	
—	22	1.
— Albiſſimus,	22	2.
— Albus,	22	2.
— Braſilianus,	22	7.
— Candidus,	22	2.
— Niger,	22	3.
— Plané niger,	22	3.
— Vulgaris cinereus,	22	1.
Lepusculus,	22	4.
Lérot,	25	2.
Letaga,	24	12.
Lévraut,	22	1.
Leure,	40	1.
Lew,	39	5.
Lewhart,	39	12.

	G.	S.
Leyon,	39	
Lezard de Clusius,	2	
— Ecaillé,	2	
— Ecailleux,	2	
— Des Indes Orientales,	2	
Lhama,	7	
Liebre,	22	
Lievora,	22	
Liévre,	22.	
—	22	
— Blanc,	22	
— Du Brésil,	22	
— De Java,	23	
— Noir,	22	
Lion,	39	
Lionne,	39	
Liron,	25	
Lis	35	
Liska,	35	
Liszka,	35	
Lobo,	35	
— Marino,	33	
Lodra,	40	
Lodria,	40	
Loir,	25.	
—	25	
Loni,	11	
Looss,	15	
Los,	12	
Loup,	35	
— Cervier,	39	
— Doré,	35	
— Marine,	33	
— Du Mexique,	35	
— Tigre,	39	
Loutra,	40	
—	40	
Loutre,	40.	
—	40	
—	40	
— Du Brésil,	40	
Louve,	35	
Louveteau,	35	
—	38	
Lozzos,	12	

	G.	S.
Luchs,	39	15.
— (Katz)	39	14.
Luiaardt,	3	
Lummick,	23	5.
Lupo,	35	2.
— Cerveiro,	39	15.
— Cerveto,	39	15.
— Cerviro,	39	15.
— Gatto,	39	15.
Lupus,	35	2.
— Armenius,	39	15.
— Aureus,	35	3.
— Aureus Asiaticus,	35	3.
— Canarius,	39	12.
— Cervarius,	39	15.
— Indicus,	35	4.
— Mexicanus,	35	4.
— Vespertinus,	34	1.
— Vulgaris,	35	2.
Lutra,	40.	
—	40	1.
— Ægypti,	36	12.
— Brasilienſis,	40	2.
— Nigricans &c,	40	2.
Lutris,	40	1.
Luzarne,	39	15.
Lws,	39	15.
Lybarde,	39	12.
Λυξ,	39	15.
Λυγξ,	35	2.
Lynce,	39	15.
Lynx,	39	15.
— Brasilienſis, *Jaguara* dicta,	39	8.
— Colore albo &c.	39	14.
Lytra,	40	1.

M.

	G.	ST.	S.
Açame,	9		14.
Macaquo,	29	5	2.
Macatlchichiltic,	9		11.
Machlis Plinio,	12		8.
Maez,	9		1.
Magnus Vorator	34		1.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
Magot,	29	5	3.
Majale,	15		1.
Majalis,	15		1.
Maimon,	29	5	3.
Makaque,	29	5	2.
Maki,	31.		
—	31		1.
— Aux pieds blancs,	31		2.
— Aux pieds fauves,	31		3.
— A queüe annelée,	31		4.
Malakaya,	39		3.
Malox,	28		1.
Manatee,	6		2.
Manati,	6		2.
— Indorum,	6		2.
— Phocæ Genus,	6		2.
Manatus,	6		2.
Mange-Fourmis,	1		1.
Mangeur de Fourmis,	1		2.
— (Gros)	1		1.
— (Petit)	1		4.
Mangouſte,	36		12.
Manicou,	42		1.
Manipouris,	18.		
—	18		1.
Manis &c,	2		1.
Mapach,	38		4.
Mar,	15		1.
Maracaia,	39		3.
Maraguao,	39		3.
Marcaſſin,	15		3.
Mård,	36		7.
—	36		8.
Marder,	36		7.
— (Buch)	36		7.
— (Feld)	36		8.
— (Huhſs)	36		7.
— (Stein)	36		7.
— [Tach]	36		7.
— (Wild)	36		8.
Marmontana,	25		6.
—	25		7.
Marmoſa,	42		5.
Marmota,	25		7.
— Alpina,	25		7.
— Americana,	25		5.
— Americanus,	25		5.
— Argentoratenſis,	25		8.
— Bahamenſis,	25		4.
— Italis,	25		7.
— Polonica,	25		6.
Marmotte,	25		7.
— Des Alpes,	25		7.
— Amériquaine,	25		5.
— D'Amérique,	25		5.
— De Bahama,	25		4.
— De Pologne,	25		6.
— De Straſbourg,	25		8.
Marſwin,	23		7.
Marta,	36		8.
Martaro,	36		8.
Marte,	36		8.
— Zibeline,	36		9.
Martes,	36		7.
—	36		8.
—	36		10.
— Abietina,	36		8.
— Domeſtica,	36		7.
— Domeſtica Matthioli,	36		10.
— Domeſticus,	36		7.
— Fagina,	36		7.
— Saxorum,	36		7.
— Scythica,	36		9.
— Sylveſtris,	36		8.
— Zibellina,	36		9.
Martin,	36		8.
Martire,	36		8.
Martis altera ſpecies nobilior,	36		8.
Martlet,	36		8.
Martorello,	36		8.
Marturo,	36		8.
Maul Wurff,	41		1.
Mauſs, [Specx]	32		1.
Maypoury,	18		1.
Mazame,	9		14.
Meer-Fetcxel,	23		7.
Meer-Hund,	33		1.
Meer-Katz,	29	4	2.
Meer-ſchwein,	23		7.

	G.	ST.	S.
Meerſchweyn,	20		1.
Meer-Wurm,	33		1.
Meles,	37.		
—	37		1.
— Alba,	37		2.
— Cinerea,	37		4.
— Leucophæa,	36		12.
— Surinamenſis,	37		3.
Melis,	37		1.
Meri,	37		1.
Memeriam Bacala,	12		5.
Merri,	14		1.
Mezeck,	14		4.
Mieren-Eeter,	1		1.
Miſtbellerle,	25		7.
Moldwrap,	41		1.
Mole,	41		1.
Moll,	41		1.
Mollmuſs,	41		1.
Monax,	25		5.
Monkje,	29	4	13.
Monops,	11		8.
Montanella,	25		7.
Montone,	10		1.
Morcego,	32		1.
Mormeldiur,	25		7.
Moromoro,	7		3.
Morſe,	6		1.
Morskieeiele,	33		1.
Morſs,	6		1.
Mos,	15		1.
Moſcardino,	25		3.
Moſchus,	13		5.
Moskandar,	11		2.
Moulier, (Pezze)	6		2.
Mouſe,	26		2.
— (Flitter)	32		1.
— [Shrew]	27		1.
Mouton,	10		1.
— De Perou,	7		3.
Mows,	26		2.
Muger,	6		
Mula,	14		4.
Mulasna,	14		4.
Mule,	14		4.
Mulefel,	14		4.
Mulet,	14		4.
Mullvad,	41		1.
Mulo,	14		4.
Mulor,	26		9.
Multhier,	14		4.
Mulus,	14		4.
Mulwerf,	41		1.
Mungathia,	36		4.
Mungo,	36		4.
Murganho,	27		1.
Murmelthier,	25		6.
—	25		7.
Murmentle,	25		7.
Murmont,	25		7.
Murziegalo,	32		1.
Mus,	26.		
—	26		1.
—	26		2.
— Ægypti,	36		12.
— Africanus *Kayopollin* dictus,	42		6.
— Agreſtis,	26		4.
— Agreſtis, brachiurus,	26		12.
— Agreſtis capite grandi,	26		12.
— Agreſtis major,	26		4.
— Agreſtis major macrouros,	26		4.
— Agreſtis minor,	26		12.
— Agreſtis Virginianus albus,	26		7.
— Albus Virginianus,	26		7.
— Alpinus,	25		6.
—	25		7.
— Alpinus Plini,	25		7.
— Americanus,	26		3.
—	26		6.
— Americanus & Guineenſis,	23		7.
— Americanus major &c,	42		8.
— Aquaticus,	22		3.
—	26		11.
— Aquaticus Cluſii,	21		37

Digitized by Google

	G.	S.
Aquaticus Exoticus Clusii,	21	3.
Aquatilis,	26	11.
Aquatilis Clusii,	21	3.
Avellanarius,	25	2.
Avellanarum,	25	2.
Avellanarum major,	25	2.
Avellanarum minor,	25	3.
Brasilienſis magnus,	23	4.
Cæcus,	27	1.
Campeſtris major,	26	4.
Campeſtris minor,	26	12.
Cauda abrupta &c,	23	5.
	23	7.
Cauda brevi &c,	23	6.
	26	12.
Citellus,	23	6.
Domeſticus,	26	1.
Domeſticus communis,	26	2.
Domeſticus major,	26	1.
Domeſticus medius,	26	9.
Domeſticus minor,	26	2.
Domeſticus vulgaris,	26	2.
Getulus,	24	11.
Indicus,	23	7.
Indicus arboreus ſtriatus,	24	10.
Indicus dictus *Coyopollin*,	42	6.
Laſſicus,	24	4.
Lemingus,	23	5.
Magnus campi quorumdam,	25	8.
Major aquaticus,	26	11.
Marſupialis,	42	2.
Marſupialis maximus Orientalis,	42	3.
Marſupialis ſylveſtris Braſilienſis,	42	1.
Minor,	26	2.
Montanus quorumdam,	25	6.
Moſchiferus,	24	3.
Moſchiferus Canadenſis,	21	4.
Noricus,	23	6.
Ex Norvagia,	26	8.
Norvagicus,	23	5.
	26	8.
Norvegicus,	23	5.
Orientalis,	26	10.
Palmarum,	24	10.
Pharaonis,	36	12.
Pharaonis quibuſdam,	23	7.
Ponticus,	24	4.
Ponticus volans,	24	12.
Sarmaticus,	36	9.
Scalopes,	42	5.
Scythicus,	36	9.
Scythicus volans,	24	12.
Sylveſtris,	26	3.
Sylveſtris Americanus,	23	2.
	42	7.
	42	9.
Sylveſtris Americanus *Scalopes* dictus,	42	5.
Tlaquatzin,	42	4.
Venenoſus,	27	1.
Venerus,	24	4.
Volans,	24	12.
Muſaraigne,	27.	
	27	11.
Du Brésil,	27	22.
Muſaraneus,	27.	
	27	1.
	27	22.
Braſilienſis,	27	27.
Muſc,	13	5.
Muſcovy,	21	3.
Muſculus vulgaris domeſticus,	26	2.
Muſeraing,	27	1.
Muſet,	27	1.
Muſette,	27	1.
Musk Hog,	15	6.
— Rat,	21	5.
Muſs, (Biſem)	27	1.

Digitized by Google

	G.	S.
— (Fläder)	32	1.
— (Moll)	41	1.
— (Spitz)	27	1.
Muſtela,	36.	
—	35	1.
— Ægypti peculiatis,	36	12.
— Ægyptiaca,	36	12.
— Africana,	24	10.
— Alba,	36	2.
— Alpina Junii,	36	2.
— Americana fœtida,	36	11.
— Armeilina,	36	2.
— Candida,	36	2.
— Fœtida,	36	10.
— Glauca,	36	4.
— Javanica,	36	5.
— Martes,	36	8.
— Proprié ſic dicta,	36	1.
— Scythica,	36	9.
— Sobella,	36	9.
— Sylveſtris,	36	3.
— Totą alba,	36	2.
— *Viverra* dicta,	36	3.
— Vulgaris,	36	1.
— Zibellina,	36	9.
Muſz,	26	2.
— (Waſſer)	26	11.
Mutzet,	27	1.
Μυσαρνε,	26	2.
Mygale,	27	1.
Μυγαλη,	27	1.
Myrbiörn,	1	1.
Myrmecophaga,	1.	
—	1	2.
— Minima,	1	4.
— Minor,	1	3.
— *Tamanoir* dicta,	1	1.
Μυς,	26	1.
— Ενυδρος,	26	11.
Μυσκος,	26	2.
Myſs,	26	2.
— (Niemegka)	27	1.
— Polna,	26	4.
— Wodna,	26	11.
Myſzorzechowa,	25	2.

N.

	G.	S.
NAbba,	16	1.
Nabbmus,	27	1.
Nabin,	8	1.
Nabuda,	8	1.
Namer,	39	12.
Naricornis,	16	1.
Nattblacka,	32	1.
Nedwed,	38	1.
Nerameiſch,	10	1.
Netopyrz,	32	1.
Niedzwiedz,	38	1.
Nielmuſz,	26	4.
Niemegka-Myſs,	27	1.
Nietoperſz,	32	1.
Nimra,	39	12.
Noemba,	16	1.
Nör,	11	1.
Nottola,	32	1.
Notula,	32	1.
Nozorozec,	16	1.
Núlmuſz,	26	4.
Nutria,	40	1.
Νυκτερις,	32	1.

O.

	G.	ST.	S.
OChſs,	11		1.
Odobenus,	6.		
—	6		1.
Ofer,	12		1.
Οϊς,	10		1.
Onager,	14		5.
Οναγρος,	14		5.
Onagrus,	14		5.
Onça,	39		8.
—	39		9.
Onçe,	39		9.
Ορυξ,	14		3.
Opaſſum,	42		1.
Ophen,	12		5.
Opieze,	29	1	1.
Oposſum,	42		1.
Oquitli,	7		3.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
Orico cachero,	20		5.
—	28		1.
Orignal,	12		9.
Orſo,	38		1.
Os,	11		1.
Oſel,	14		3.
Oſtrowidz,	39		15.
Otter,	40		1.
Otziſchak,	28		1.
Ouaikaré,	3		1.
Ouariri,	1		1.
Ouatirioüaou,	1		4.
Oveia,	10		1.
Ounce,	39		15.
Ourana,	23		4.
Ourang-outang,	29	1	2.
Ourico-cacheiro,	20		4.
Ouriſo,	28		1.
Ours,	38.		
—	38		1.
— De la Baye de Hudſon,	38		3.
— Blanc,	38		2.
— (Petit)	38		3.
Ovis,	10		1.
— Æthiopica,	10		4.
— Africana,	10		4.
— Angolenſis,	10		5.
— Arabiæ longicauda,	10		3.
— Arabica,	10		2.
—	10		3.
— Arabica altera,	10		3.
— Chilenſis,	7		4.
— Cretenſis,	9		15.
— Domeſtica,	10		1.
— Guineenſis,	10		5.
— Indica,	7		4.
— Laticauda,	10		2.
— Laticauda Arabica,	10		2.
— Longicauda,	10		3.
— Orientalis,	10		2.
— Peruana,	7		3.
—	7		4.
— Peruanæ alia ſpecies,	7		4.
— Peruviana,	7		4.
— Strepſiceros Cretica Bellonii,	9		15.
— Turcica,	10		2.
Owca,	10		1.
Owcze,	10		1.
Ox,	11		1.

P.

	G.	ST.	S.
Paca,	23		4.
Paco,	7		4.
Pacos,	7		4.
Pak,	23		4.
Panggoeling,	2		1.
Pantegana,	26		1.
Panter,	39		12.
Παρδος,	39		12.
Panthera,	39		12.
Panthere,	39		12.
Papio,	29	3.	
—	29	3	1.
— Ius,	29	3	1.
— Secundus,	3		1.
Pardalion,	39		12.
Pardalis,	39		12.
Παρδαλις,	39		12.
Παρδος,	39		12.
Pardus,	39		12.
— Braſilienſis *Jaguara* dicta,	39		8.
— Cauda Brevi,	39		13.
Pareſſeux,	3.		
—	3		1.
— De Ceylan,	3		2.
Pas,	35		1.
Paſan,	9		9.
Paſen,	9		9.
Pate,	37		1.
Pavyon,	29	3	1.
Pecaris,	15		6.
Pecora,	10		1.
— D'Arabia, con la coda larga,	10		2.
— D'Arabia, con la coda longa,	10		3.

Digitized by Google

	G.	S.
Peert,	14	1.
Pege-buey,	6	2.
Pelandor-Aroé,	42	2.
Pelon,	7	3.
Perack,	32	1.
Pered,	14	4.
Perico-Ligero,	3	1.
Perro,	35	1.
Pervichcatl,	7	3.
Pes,	35	1.
Pezillo Ligero,	3	1.
Pezze Mouller,	6	2.
Phar,	26	2.
Phatagen,	2	2.
Philander,	42.	
—	42	1.
— Africanus,	42	6.
— Amboinenſis,	42	3.
— Americanus,	42	5.
— Braſilienſis,	42	4.
— Capite craſſo,	42	8.
— Cauda Brevi,	42	9.
— Maximus Orientalis,	42	3.
— Orientalis,	42	2.
— Surinamenſis,	42	7.
Philandre,	42.	
—	42	1.
— D'Afrique,	42	6.
— D'Amboine,	42	3.
— D'Amérique,	42	5.
— Du Bréſil,	42	4.
— A courte queue,	42	9.
— A groſſe tête,	42	8.
— Oriental,	42	2.
— De Surinam,	42	7.
Phir,	25	1.
—	26	2.
Phoca,	33.	
—	33	1.
— Dentibus exſertis,	6	1.
Phocas,	33.	
—	33	1.
[illegible],	33	1.
Pholidote,	2.	
—	2	1.
— A longue queue,	2	2.
Pholidotus,	2.	
—	2	1.
— Longicaudatus,	2	2.
Pig,	15	1.
— [Guiny]	23	7.
Pigg Swin,	20	1.
Pigritia,	3	1.
Pipiltrello,	32	1.
Pir,	25	1.
Pirdah,	14	4.
Pirolus,	24	1.
[illegible],	29 1	1.
Platyceros,	12	7.
Polatucha,	24	12.
Polecat,	36	10.
Pongi,	29 4	10.
Popieliza,	24	4.
Porc,	15	1.
Porc-Epic,	20.	
—	20	1.
— D'Amérique,	20	4.
— De l'Amérique Septentrionale,	20	3.
— De la Baye de Hudſon,	20	3.
— (Grand) d'Amérique,	20	5.
— Des Indes Orientales,	20	6.
— De la Nouvelle Eſpagne,	20	2.
Porcellio, [Teſtudinatus]	4	3.
Porcellus,	15	1.
— Cataphractus,	4	6.
— Frumentarius,	25	8.
— Guineenſis,	23	7.
— Indicus,	23	7.
Porco,	15	1.
— Caſtrato,	15	1.
— Spino,	20	1.
— Spinoſo,	20	1.
— Sylvatico,	15	3.
Porcopick,	20	1.
Porcupine,	20	1.

Digitized by Google

	C.	S.
Porcus,	15	1.
— Aculeatus Malaccenſis,	28	3.
— Aculeatus ſylveſtris,	20	6.
— Americanus,	15	6.
— Babyrouſſa,	15	5.
— Domeſticus,	15	1.
— Fluviatilis,	17	1.
— Guineenſis,	15	4.
— Indicus,	15	5.
— Moſchiferus,	15	6.
— Sylveſter,	15	6.
— Sylveſtris,	15	3.
Porte-corne,	16	1
Portepyne,	20	1.
Poſſum,	42	1.
Poulain,	14	1.
Pouttet,	36	10.
Priguiza,	3	1.
Prolimia,	31.	
Pteropus,	30.	
Puant,	42	1.
Puerco,	15	1.
— Montes,	15	3.
— Sylveſtre,	15	3.
Puerco-Eſpin,	20	1.
Puſa,	33	1.
Putois,	36	10.
—	36	11.
— Rayé,	36	11.
Putorius,	36	10.
— Striatus,	36	11.
Puzolo,	36	10.

Q.

	G.	S.
Quachy,	38	4.
Quadrupes Bellonii,	26	11.
— Peregrina,	4	5.
— (Vultur)	34	1.
Quapizotl,	15	6.
Quasje,	37	3.
Quauhcoyametl,	15	6.
Quauhtechallotl,	24	3.
— Thliltic,	24	3.
Quauhtlà-Coymatl,	15	6.
Quickhatch,	38	3.
Quimichpatlan,	24	12.

R.

	G.	S.
Raadiur,	12	5.
Rabit,	22	4.
Raccoon,	38	4.
Radja Outang,	39	6.
Rådiur,	12	5.
Råf,	35	5.
— (Blå)	35	8.
— (Kroſs)	35	6.
Raguahil,	7	2.
Rain-Deer,	12	8.
Rainger,	12.	8.
Ram,	10	1.
Rangifer,	12	8.
Raphius,	39	13.
Raposa,	35	5.
Rat,	26.	
—	26	1.
—	26	2.
— D'Amérique,	26	6.
— Blanc de Virginie,	26	7.
— De Bois,	26	3.
— D'eau,	26	11.
— (Grand) des champs,	26	4.
— (Musk)	21	3.
— Muſqué,	21	3.
—	21.	4.
— Muſqué de Canada,	21	4.
— De Norvege,	26	8.
— Oriental,	26	10.
— Palmiſte,	24	10.
— (Petit) des Champs,	26	12.
— De Pharaon,	36	12.
— De Pont,	24	12.
— De Tartarie,	24	12.
Rato da caſa,	26	1.
— Di caſa,	26	1.
— Penago,	32	1.
Raton,	26	1.
— Pequenno,	25	2.
—	27	1.

Digitized by Google

	G.	S.
Ratte,	26	1.
— (Watter)	26	11.
Rattus,	26	1.
— Americanus,	26	6.
— Aquaticus,	26	11.
— Aquatilis,	26	11.
— Domeſticus,	26	1.
— (Veſpertilio) Ternatanus,	32	4.
Ratz,	26	1.
— (Waſſer)	26	11.
Reddeer,	12	1.
Reech,	12	5.
Reechbock,	12	5.
Reechgeiſs,	12	5.
Reem,	16	1.
Reen,	12	8.
Rein,	12	8.
Reinen,	12	8.
Reinſdiur,	12	8.
Reinſsthier,	12	8.
Rell,	25	1.
Rellmuſs,	25	1.
Renard,	35	5.
— Amériquain,	1	1.
— Blanc,	35	8.
— Croiſé,	35	6.
— Gris,	35	7.
Renſcheron,	12	8.
Reyner,	12	8.
Rhen,	12	8.
Rhenne,	12	8.
Rhinoceros,	16.	
—	16	1.
Rhinocerote,	16	1.
Rhinoceros,	16	1.
Riccio,	28	2.
Riche,	22	5.
Rind,	11	1.
Rizo,	28	1.
Roe-Deer,	12	5.
Ropoza,	42	1.
Roſmarus,	6	1.
— Vetus,	6	1.
Roſomacha,	34	1.
Roſs,	14	1.
Rotta, (Watn)	26	11.
Rouſſette,	30.	
—	30	1.
— A col rouge,	30	2.
— A longues oreilles,	30	3.
Rupicapra,	9	6.
Ruyn,	14	1.
Rys,	39	15.

S.

	G.	ST.	S.
Sabbel,	38		9.
Sabelmus,	23		5.
Sable,	36		9.
Sag,	35		1.
Sagoin,	29	4	14.
Sagouin,	29	4	14.
Sal-Hund,	33		1.
Sanda Benamet,	16		1.
Sanglier,	15		3.
— Appellé *Pecaris*,	15		6.
— Des Indes Orientales,	15		3.
— Du Mexique,	15		6.
Sapajou brun,	29	4	1.
— Cornu,	29	4	3.
— Jaune,	29	4	8.
— Noir,	29	4	2.
— A queue de Renard,	29	4	4.
Saphan,	22		4.
Sarigoy,	42		1.
Sarn,	12		5.
Sarna,	12		5.
Satherius,	36		9.
Satyrus,	29	1	2.
— Indicus,	29	1	2.
Saw,	15		1.
Scalopes,	42		3.
Schaaff,	10		1.
Schaaffuſs Arabia,	10		2.
—	10		3.
Schaah,	9		1.
Schaep,	10		1.
Schanar,	39		1.
Schar,	41		1.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
Schârmus,	41		1.
Schemikel,	29	1	1.
Schetor,	7		1.
Schildverken,	4		4.
Schirato,	24		1.
Schiratolo,	24		1.
Schirivolo,	24		1.
Schor,	11		1.
Schual,	35		5.
Schunara,	39		1.
Schwein,	15		1.
— (Dorn)	20		1.
— (Meer)	20		1.
— (Stachel)	20		1.
— (Wild)	15		3.
Schwyn,	15		1.
Sciurus,	24.		
—	24		1.
— Albus Sibericus,	24		2.
— Americanus,	24		5.
— Americanus volans,	24		12.
— Braſilienſis,	24		7.
— Carolinenſis,	24		9.
— Epilepticus,	25		1.
— Getulus,	24		11.
— Lyſteri,	24		9.
— Mexicanus,	24		3.
— Niger,	24		3.
— Novæ Hiſpaniæ,	24		8.
— Palmarum,	24		10.
— Petauriſta volans,	24		11.
— Ponticus,	24		4.
— Rariſſimus ex Nova Hiſpania,	24		8.
— Schyticus,	24		4.
— Sibericus volans,	24		13.
— Striatus,	24		9.
— Varius,	24		4.
— Virginianus,	24		6.
— Virginianus petauriſta,	24		14.
— Virginianus volans,	24		14.
— Volans,	24		12.
— Vulgaris,	24		1.
— Vulgaris rubicundus,	24		1.
Scropha,	15		1.
Scrutulus,	24		1.
Sczuzek,	25		1.
Sea-Calf,	33		1.
Seahorſe,	6		1.
Seakow,	6		1.
Seal-Hund,	33		1.
Sebey,	39		5.
Seehond,	33		1.
See-Hund,	33		1.
Seekoejen,	6		2.
Semivulpa,	42		1.
Seraphah,	8		1.
Sery,	27		1.
Seſef,	34		1.
Seüle, (Indiſch)	23		7.
Seuwle,	15		1.
Sezurez,	26		1.
Sheepe,	10		1.
Shrew,	27		1.
— (Hardy)	27		1.
— Mouſe,	27		1.
Shymel,	7		1.
Siâl,	33		1.
Sjechaal,	35		3.
Sig,	35		1.
Silenus,	3		2.
Sime,	29	1	1.
Simia,	29.		
—	29	1.	
—	29	1	1.
— Alba &c,	29	4	21.
— Callitrix &c,	29	4	26.
— Caudata &c,	29	4.	
—	29	5.	
— Ceylonica,	29	1	3.
— Cynocephala,	29	2.	
—	29	2	1.
— Cynocephala Ceylonica,	29	2	2.
— Ecaudata &c,	29	1	2.
—	29	2.	
— Primus,	29	1	1.
— Secundus,	29	1	1.
— Ourang-Outang,	29	1	2.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
— Perſonata,	3		2.
— Sciurus &c,	31		1.
— Semicaudata &c,	29	3	1.
— Simpliciter dicta,	29	1	1.
Simiolus Ceylonicus,	29	4	8.
Simius Callitrix,	29	4	27.
— Cynocephalus alter,	29	2	1.
Singe,	29.		
—	29	1.	
—	29	1	1.
— Barbu,	29	4	24.
— Barbu à queue de Lion,	29	4	25.
— Blanc à barbe noire,	29	4	21.
— De Ceylan,	29	1	3.
— Cynocéphale,	29	2.	
—	29	2	1.
— Cynocéphale de Ceylan,	29	2	2.
— (Grand) de la Cochinchine,	29	4	18.
— De Guinée,	29	4	6.
— De Guinée à barbe blanche,	29	4	23.
— De Guinée à barbe jaunâtre,	29	4	19.
— Lion,	29	4	16.
— Muſqué,	29	4	7.
— Noir à barbe blanche,	29	4	22.
— Noir d'Egypte,	29	4	26.
— (Petit) Lion,	29	4	11.
— [Petit] du Mexique,	29	4	28.
— (Petit) Négre,	29	4	5.
— (Petit) de Para,	29	4	12.
— A queue de Lion,	29	4	15.
— A queue de Rat,	29	4	13.
— Rouge,	29	4	20.
— Rouge de Cayenne,	29	4	20.
— Roux d'Egypte,	29	4	27.
— Varié,	29	4	9.
— Verd,	29	4	17.
Sion,	5		1.
Siſel,	23		6.
Siyah-Ghush,	39		15.
Σκίουρος	24		1.
Skogſmus,	25		3.
Skop,	10		1.
Skrzeczek,	25		8.
Slaep ratte,	25		2.
Sleeper,	25		3.
— (Greater)	25		2.
Sobol,	36		9.
Soile,	33		1.
Sorce,	25		2.
Sorex,	26		1.
—	26		2.
—	27		1.
— Americanus,	26		5.
— Americanus major &c,	42		8.
— Aquaticus,	26		11.
— Domeſticus,	26		7.
— Moſcoviticus,	21		3.
— Odoriferus,	21		3.
— Plinii,	25		2.
— Sylveſtris Americanus,	42		7.
Sorgio di caſa,	26		2.
Sorgo Morgange,	26		11.
Sorice,	26		2.
Sourco,	26		1.
Souris,	26		2.
— D'Amérique,	26		5.
Sow,	15		1.
Spaca,	35		1.
Span-Ferle,	15		1.
Speckmauſs,	32		1.
Spiriosus,	24		1.
Spitzmuſs,	27		1.
Sportegliono,	32		1.
Squilachi,	35		3.
Squirrel, (Flying)	24		12.
— (Great Grey Virginia)	24		6.
Squyrrell,	24		1.
Srna,	12		5.
Stachelſchweyn,	20		1.
Stagg,	12		1.
Steinbock,	9		3.

Digitized by Google

	G.	S.
Stein Marder,	36	7.
Stier,	11	1.
Stoat,	36	2.
Strepſiceros,	9	8.
—	9	15.
— Bellonii,	9	15.
— Jo. Caii,	9	8.
— Plinii,	9	8.
Στρεψίκερως,	9	8.
Su,	15	1.
Suber,	11	6.
Svin, (Gr. f)	37	1.
Surck,	41	1.
Sus,	15.	
—	15	1.
— Agreſtis,	15	3.
— Aquaticus multiſulcus,	18	1.
— Chinenſis,	15	2.
— Domeſticus,	15	1.
— Ferus,	15	3.
— Guineenſis,	15	4.
— Maximus Paluſtris,	17	1.
— Sinenſis,	15	2.
— Sylvaticus,	15	3.
Sus,	14	1.
Suſah,	14	1.
Suſel,	23	6.
Suſuatha,	14	1.
Suw,	15	1.
Swin, [Pigg]	20	1.
— (Will)	15	3.
Swine, (Wild)	15	3.
Swinka Zamorska,	23	7.
Swiſzez,	25	6.

T.

	G.	S.
Tach Marder,	36	7.
Tachs,	37	1.
Tai-Ibi,	42	4.
Tajacu,	15	6.
Taiſbi,	42	4.
Taiſſon,	37	1.
Talpa,	42.	

	G.	ST.	S.
—	41		1.
Alba,	41		2.
— Alba Noſtras,	41		2.
— Americana rufa,	41		5.
— Coloris albi,	41		2.
— Maculata, Ooſt-Friſia,	41		3.
— Nigra Virginiana,	41		4.
— Noſtras,	41		1.
— Noſtras albi coloris,	41		2.
— Rubra Americana,	41		5.
— Siberica aurea,	41		6.
— Sibericus verſicolor,	41		6.
— Variegata,	41		3.
— Virginiana,	41		4.
— Virginianus niger,	41		4.
Tamamaçame,	9		11.
Tamandua,	1		1.
— Alba,	1		4.
— Americana minor,	1		2.
— Guacu,	1		1.
—	1		3.
— I,	1		2.
—	1		3.
— Major,	1		1.
— Minor cinerea,	1		2.
— Minor flaveſcens,	1		4.
— Miri,	1		2.
Tamanoir,	1		1.
Tamarind,	29	4	10.
Tamendoa,	1		1.
Tapeti,	22		7.
Tapiierete,	18		1.
Tapir,	18.		
—	18		1.
Tapirus,	18.		
—	18		1.
Taran,	20		1.
Tarandus,	12		8.
— Agricolæ & Eliotæ,	12		8.
Tardigradus,	3.		
—	3		12
—	29	1	3.
—	29	2	2.
— Ceylonicus,	3		2.

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
Tartarin,	29	5	3.
Taſch,	37		1.
Taſſo,	37		1.
Taſſus,	37		1.
Taſugo,	37		1.
Tatoe,	2		1.
Tatou,	4		2.
—	4		4.
—	4		6.
— Kabaſſou,	4		5.
Tatu,	4		2.
—	4		4.
—	4		6.
— Africanus,	4		7.
— Apara,	4		2.
—	4		7.
— Caninus,	4		7.
— Eté,	4		5.
— Muſtelinus,	2		1.
—	4		1.
— Orientalis,	4		2.
— Piloſus,	23		7.
— Porcinus,	4		2.
—	4		6.
Tatupeba,	4		4.
Tatus,	4		2.
—	4		5.
— Major,	4		5.
Taupe,	41.		
—	41		1.
— Blanche,	41		2.
— Dorée de Siberie,	41		6.
— Rouge d'Amérique,	41		5.
— Variée,	41		3.
— De Virginie,	41		4.
Taur,	11		1.
Taureau,	11		1.
Taurus,	11		1.
— Domeſticus,	11		1.
— Ferus,	11		6.
— Mexicanus,	11		7.
— Quiviræ Provinciæ,	11		7.
— Quiviræ Regionis,	11		7.
— Quivirenſis,	11		7.
Taxo,	37		1.
Taxus,	37		1.
— Suillus,	38		6.
Tchorz,	36		10.
Temamaçame,	9		11.
Tenlic,	35		6.
Tepe Maxtlaton,	39		3.
Ternera,	11		1.
Texon,	37		1.
Thaal,	35		5.
Thabia,	9		6.
—	12		5.
Thabiu,	9		6.
—	12		5.
Thaleb,	35		5.
Thapſa,	22		4.
Thlitic, (Quauhtechal-lotl)	24		3.
Thor,	11		1.
Thur,	11		3.
Tiger,	39		6.
Tigerthier,	39		6.
Tigra,	39		6.
Tigre,	39		6.
—	39		8.
—	39		11.
— D'Amérique,	39		8.
— Barbet,	39		10.
— (Eſpece de)	39		9.
— Friſé,	39		10.
— De la grande eſpece,	39		7.
— [Gros] de la Guiane,	39		8.
— [Loup]	39		10.
— Noir,	39		9.
— Rouge,	39		11.
— Royal,	39		7.
Tigris,	39		6.
— Americana,	39		8.
— Criſpa,	39		10.
— Cuguacuarana,	39		11.
— Fulva,	39		11.
— Fulvus,	39		11.
— Jaguarete,	39		9.
— Mexicanus,	39		8.
— Nigra,	39		9.
— Regia,	39		7.

Digitized by Google

	G.	S.
Τίγρις,	39	6.
Titflein,	9	1.
Tlacuatzin ſpinoſum,	20	2.
Tlacoozcloti,	39	13.
Tlalocelotl,	39	13.
Tlaquatzin,	42	1.
—	42	4.
Tlatlauhqui ocelotl,	39	8
Tlilocoteqvillin,	24	3.
Topinara,	41	1.
Topo,	26	2.
—	41	1.
Toporagno,	27	1.
Tora,	11	1.
Torata,	11	1.
Toro,	11	1.
Tragelaphus,	9	12.
—	12	2.
— Bellonii,	9	12.
Τράγος,	9	1.
— ἄγριος,	9	3.
Tragulus,	13.	
— Africanus,	13	1.
—	13	4.
— Guineenſis,	13	2.
— Indicus,	13	1.
— Mazame,	9	14.
— Pergracilis Africanus,	13	1.
— Surinamenſis,	13	3.
— Temamaçama,	9	11.
Tragus Bezaarticus,	9	9.
— Biſulcorum mixtus,	8	1.
— Capra ſylveſtris Africana Grimmii,	13	4.
— Domeſticus,	9	1.
— Dorcas,	9	6.
— Moſchiferus,	13	5.
— Strepſiceros,	9	8.
Trichechus,	6	2.
Troiata,	15	1.
Truye,	15	1.
Tuabba,	16	1.
Tup,	10	1.
Tur,	11	3.
Tzwijerzatko,	28	1.

V.

	G.	S.
Vaca,	11	1.
Vacca,	11	1.
— Marina,	6	23
Vache,	11	1.
— Marine,	6.	
—	6	1.
Vare,	24	4.
Varia,	39	12.
Varius,	24	4.
Varoza,	25	7.
Varus,	24	4.
Veau,	11	1.
— Marin,	33	1.
— De mer,	33	1.
Vebar,	22	4.
Vech,	24	4.
Vechio Marino,	33	1.
Veldratte,	25	8.
Verdadeiro,	4	5.
Verrat,	15	1.
Verres,	15	1.
— Sylvaticus,	15	3.
Verro,	15	1.
Vervex,	10	1.
— Alius peregrinus,	7	4.
Veſpertilio,	32.	
—	32	1.
—	32	3.
— Americanus,	32	5.
—	32	6.
— Americanus rufus,	32	5.
— Americanus vulgaris,	32	6.
— Auriculis binis,	32	1.
— Auriculis quaternis,	32	3.
— Borſippæ,	30	1.
— Cato ſimilis Americanus,	32	5.
— Cauda nulla,	30	1.
— Caudatus &c,	32.	
— Cynocephalus ex Nova Hiſpania,	30	5.
— Cynocephalus Terna-		

Digitized by Google

	G.	ST.	S.
tanus,	30		1.
— Ingens,	30		1.
— Major,	32		1.
— Major Ternatanus	32		4.
— Minor,	32		3.
— Minor Ternatanus,	32		2.
— Rattus Ternatanus,	32		4.
— Ternatanus,	32		2.
— Ternatanus auriculis simplicibus,	32		2.
— Vulgaris,	32		1.
— Vulgaris auriculis duplicibus,	32		3.
Vigogne,	7		4.
Vilfras,	34		1.
Vilpiſtrello,	32		1.
Vir ſylvarum,	29	1	2.
Viſon,	36		6.
Vitello,	11		1.
Vitulus,	11		1.
— Marinus,	33		1.
Viverra,	36		3.
— Fœmina,	36		3.
— Javanica,	36		5.
— Indica,	36		4.
— Mas,	35		3.
Ulf,	35		2.
Ulk,	36		10.
Umbulu,	1		1.
Uhau,	3		1.
Volpe,	35		5.
Vorator, [Magnus]	34		1.
Vos,	35		5.
Urchin,	28		1.
Urochs,	11		3.
Utos,	11		3.
Utſa formicaria,	1		3.
Utſus,	38		
—	38		1.
— Albus,	38		2.
— Cauda abrupta,	38		1.
— Cauda elongata,	38		4.
— Formicarius,	1		1.
— Freti Hudſonis,	38		3.
Urus,	11		3.

	G.	S.
Utter,	40	2.
Vuelblud,	7	1.
Vulpecula Americana,	37	3.
— Quæ Mayzium torte-factum æmulatur,	37	3.
Vulpes,	39	5.
— Alba,	35	8.
— Albus,	35	8.
— Americana, *Mapach* dicta,	38	4.
— Campeſtris,	35	5.
— Cinerea,	35	7.
— Cinereus Americanus,	35	7.
— Cœruleſcens,	35	8.
— Cruciatus,	35	6.
— Crucigera,	35	6.
— Fulvus,	35	5.
— Indica, *Icquiepotl* dicta,	37	3.
— Major Putoria &c,	42	1.
— Minor &c,	38	6.
— Vulgaris,	35	5.
Vulpi affinis Americana,	38	4.
Vultur Quadrupes,	34	1.
Vydra,	36	10.

W.

	G.	ST.	S.
Wald-Ezel,	14		5.
Walros,	6		1.
Walrus,	6		1.
Wanduru,	29	4	22.
Want,	41		1.
Warg,	35		2.
Warglo,	39		15.
Waſſer-Muſz,	26		11.
— Ratz,	26		11.
Watn-Rotta,	26		11.
Watter-Ratte,	26		11.
Weaſel,	36		1.
Weeſel,	36		1.
Weprz,	15		3.
Wercx, [Grau]	24		4.
Weſla,	36		1.

Digitized by Google

	G.	S.
Wewer,	38	1.
Wewerka,	24	1.
Wider,	10	1.
Wieprz,	15	1.
— Leſny,	15	3.
Wiewiorka Lataiaca,	24	12.
Wild-Aſs,	14	5.
— Boar,	15	3.
— Gheit,	9	3.
— Goote,	9	6.
— Marder,	36	8.
— Schwein,	15	3.
— Swine,	15	3.
Wilde-Buffel,	11	8.
— Katze,	39	2.
wilk,	35	2.
Will-Katt,	39	13.
— Swin,	15	3.
Wiſele,	36	1.
Wiſelin, (Wyſs)	36	2.
Wiſent,	11	6.
Wlk,	35	2.
Wol,	11	1.
Wolf,	35	2.
Wolff,	35	2.
— (Meer)	33	1.
Wolverenne,	38	3.
Wor-dziki,	11	3.
Wul,	11	1.
Wurff, (Maul)	41	1.
Wydra,	40	1.
Wyewyorka,	24	1.
Wyſs Wiſelin,	36	2.

X.

	G.	ST.	S.
XImio,	29	1	1.
Xoloitzcuintli,	35		4.

Y.

	G.	S.
YBſch,	9	3.
Yſi,	15	1.
Yſeren-verexen,	28	1.
Yſipe,	20	1.
Ytembo,	5	1.
Yzard,	9	6.
Yzquiepatl,	37	1.

Z.

	G.	S.
ZAbo,	34	1.
Zagicz,	22	1.
Zaiac,	22	1.
Zainq,	15	6.
Zainus,	15	6.
Zamer,	8	1.
Zbik,	37	1.
—	39	2.
Zebati,	16	1.
Zebi,	9	6.
—	12	5.
Zebiah,	12	5.
Zebra,	14	2.
— Indica,	14	2.
Zébre,	14	2.
Zeeb,	35	2.
Zeebah,	35	2.
Zeehundt,	33	1.
Zibet,	37	4.
Zibethica,	37	4.
Ziemuy,	28	1.
Zieſel,	23	6.
Zijm,	39	2.
Zilio-Hyæna,	34	1.
Zobel,	36	9.
Zon,	10	1.
Zoneh,	10	1.
Zorlito,	12	5.
Zuber,	11	6.
Zubr,	11	3.
Zurnapa,	8	1.
Zyſel,	23	6.

Digitized by Google

CLASSE II.

LES CETACÉES.

CLASSIS II.

CETACEA.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUS AUTHORUM.

ALDRO. Piſc... Uliſſis Aldrovandi Philoſophi & Medici Bononienſis, de Piſcibus Libri V, & de Cetis, Liber I. &c. Bononiæ 1638. in-folio.

Art. Deſcr. Piſc... Petri Artedi Sueci deſcriptiones ſpecierum Piſcium, quos vivos præſertim diſſecuit, & examinavit, inter quos primariò Piſces regni Sueciæ, &c. Ichtyologiæ pars V. Lugduni Batavorum 1738. in-octavo.

Art. Gen. Piſc... Petri Artedi Sueci genera Piſcium, in quibus ſyſthema totum Ichtyologiæ proponitur, cum Claſſibus, Ordinibus, Generum Characteribus, ſpecierum differentiis, obſervationibus plurimis, &c. Ichthyologiæ pars III. Lugduni Batavorum 1738. in-octavo.

Art. Synon. Piſc .. Petri Artedi Angermannia-Sueci ſynonymia nominum Piſcium ferè omnium, in qua recenſio fit nominum Piſcium omnium facilè Authorum, qui unquam de Piſcibus ſcripſere: uti Græcorum, &c. Ichthyologiæ pars IV. Lugduni Batavorum 1738. in-octavo.

Bell. Aquat... Petri Bellonii Cenomani de Aquatilibus libri duo, &c. Pariſiis 1553. in-octavo oblong.

Bell. des Poiſ.. La nature & diverſité des Poiſſons, avec leurs pourtraits repréſentés au plus près du naturel, par Pierre Belon du Mans. A Paris 1555, in octavo oblong.

Charlet. Exer... Gualteri Charletoni exercitationes, Piſcium differentiæ & nomina. Oxoniæ 1677. in-folio.

Cluſ. Exot... Caroli Cluſii Atrebatis, Aulæ Cæſareæ quondam familiaris, Exoticorum libri decem. &c. Raphelengii 1605. in-folio.

Euſ. Nieremb... Joannis Eberhardi Nierembergii Madritenſis, ex Societate Jeſu, in Academia Regia Madritenſi Philoſophiæ Profeſſoris, Hiſtoria Naturæ maximæ peregrinæ, libris XVI. diſtincta. Antuerpiæ 1635. in-folio.

Faun. Suec. Linn... Caroli Linnæi Medici & Botan. Prof. Upſal. &c. Fauna Suecica, ſiſtens Animalia Sueciæ Regni, &c. Stockholmiæ 1746. in-octavo.

Geſn. Icon. Aquat... Icones Animalium aquatilium in mari & dulcibus aquis degentium. Tiguri 1560. in-folio.

Geſn. Piſc .. Conradi Geſneri Medici Tigurini Hiſtoriæ Animalium liber IV. qui eſt de Piſcium & aquatilium animantium natura. Tiguri 1558. in-folio.

Hiſt. de l'A. ad... Hiſtoire de l'Académie Royale des Sciences. A Paris. in-quarto.

Hiſt. d'Iſl. & de Gro... Hiſtoire Naturelle de l'Iſlande, du Groënland, du détroit de Davis, & d'autres pays ſitués ſous le Nord; traduite de l'Allemand, par M. Anderſon, &c. A Paris 1750. in-douze.

Jonſt. Piſc... Hiſtoriæ Naturalis de Piſcibus & Cetis, libri V. cum æneis figuris, Johannes Jonſtonus Medicæ Doctor. Amſtelodami 1657. in folio.

Klein. Piſc. Miſ. 1... Jacobi Theodori Klein Hiſtoriæ Piſcium Naturalis promovendæ Miſſus ſecundus; de Piſcibus per pulmones ſpirantibus, &c. Gedani 1741. in-quarto.

Linn. Syſt. Nat. ed. 6. ... Caroli Linnæi Archiatr. Reg. Med. & Bot. Profeſſ. Upſal. Syſthema Naturæ, ſiſtens regna tria naturæ, in claſſes & ordines, genera & ſpecies redacta, Tabuliſque æneis illuſtrata. Editio ſexta, emendata & aucta. Stockholmiæ 1748. in-octavo.

Muſ. Worm... Muſeum Wormianum, ſeu Hiſtoria rerum rariorum, tam naturalium, &c. Adornata ab Olao Worm. Med. Doct. &c. Amſtelodami 1655. in-folio.

Raj. Syn. Piſc... Joannis Raji Synopſis Methodica Piſcium, Londini 1713. in-octavo.

Digitized by Google

Rondel Piſc... Guillelmi Rondeletii Doctoris Medici & Medicinæ in Schola Monſpelienſis Profeſſoris Regii, libri de Piſcibus marinis. Lugduni 1554. in folio.

Sibbald. Obſ.. Phalainologia nova, ſive Obſervationes de rarioribus quibuſdam Balænis in Scotiæ littus nuper ejectis, &c. Edinburgii 1692. in-quarto.

Will. Hiſt. Piſc... Franciſci Willughbeii Armig. de Hiſtoria Piſcium libri quatuor, juſſu & ſumptibus Societatis Regiæ Londinenſis, editi, &c. Oxonii 1686. in-folio.

CLASSIS II.

Digitized by Google

CLASSIS II.

CETACEA.

HORUM character est Corpus nudum, elongatum: Pinnæ carnosæ: Cauda horizontaliter plana.

Omnia hujus Classis Animalia in mari perpetuò degunt; nec unquàm sponte, & absquè vitæ periculo, in siccum exeunt. Hæc, QUADRUPEDUM modo, *duos* habent in corde *ventriculos*; *pulmonibus* spirant; coeunt, *vivos* fœtus pariunt, eosque *lacte* alunt. Partium denique omnium internarum structurâ & usu cum illis conveniunt. Omnia fistulâ unâ, vel fistulis duobus, per quas aquam rejiciunt & efflant, in capite vel rostro donantur.

Alia sunt edentula: alia verò dentata. Edentula maxillam superiorem habent laminis corneis utrinque instructam; quæ laminæ corneæ

CLASSE II.

LES CETACÉES.

LEUR caractere est D'avoir le corps nud, & allongé: Des nageoires charnues: Et la queue platte horizontalement.

Tous les Animaux de cette Classe vivent toujours dans la mer; & ils n'en sortent jamais d'eux-mêmes, & sans risque de leur vie. Comme les QUADRUPEDES, ils ont *deux ventricules* au cœur; respirent par des *poûmons*; s'accouplent, font leurs petits *vivants*, & les *alaittent*. Ils leurs ressemblent encore par la structure & l'usage de toutes leurs parties intérieures. Ils ont tous pardessus la tête ou le museau, un ou deux canaux, par lesquels ils rejettent l'eau.

Les uns n'ont point de dents: les autres en sont munis. Ceux qui n'ont point de dents, ont la mâchoire supérieure garnie des deux côtés de lames de corne,

Digitized by Google

qui s'ajuſtent obliquement dans l'inférieure, comme la *Baleine*. Ceux qui ont des dents, ou n'en ont qu'à la mâchoire inférieure ſeulement, comme le *Cachalot*; ou n'en ont qu'à la mâchoire ſupérieure, comme le *Narhval*; ou en ont aux deux mâchoires, comme le *Souffleur*, le *Dauphin*, &c.

Ils ſe diviſent en quatre Ordres.

Dans le premier ſont compris ceux qui n'ont point de dents.

Dans le ſecond, ceux qui ont des dents à la mâchoire inférieure ſeulement.

Dans le troiſiéme, ceux qui ont des dents à la mâchoire ſupérieure ſeulement.

Et dans le quatriéme, ceux qui ont des dents aux deux mâchoires.

in maxillâ inferiore obliquè includuntur, ut *Balæna*. Dentata dentes habent vel in maxillâ inferiore tantùm, ut *Cetus*; vel in maxillâ ſuperiore tantùm, ut *Ceratodon*; vel in maxillâ utrâque, ut *Phyſeter*, *Delphinus*, &c.

In quatuor Ordines dividuntur.

In primo Ordine continentur ea quæ ſunt edentula.

In ſecundo, ea quæ ſunt dentata in maxillâ inferiore tantùm.

In tertio, ea quæ ſunt dentata in maxillâ ſuperiore tantùm.

In quarto deniquè, ea quæ ſunt dentata in utrâque maxillâ.

Table méthodique des Cetacées.

Les Cetacées ou
- N'ont point de dents... *La Baleine*. 1... Ordre I.
- Ont des dents,
  - A la mâchoire inférieure ſeulement... *Le Cachalot*. 2... Ordre. II.
  - A la mâchoire ſupérieure ſeulement... *Le Narhval*. 3... Ordre III.
  - Aux deux mâchoires... *Le Dauphin*. 4... Ordre IV.

Tabula Synoptica Cetaceorum.

Cetacea ſunt, vel
- Edentula... *Balæna*. 1... Ordo I.
- Dentata,
  - In maxillâ inferiore tantùm... *Cetus*. 2... Ordo II.
  - In maxillâ ſuperiore tantùm... *Ceratodon*. 3... Ordo III.
  - In maxillâ utrâque... *Delphinus*. 4... Ordo IV.

Digitized by Google

ORDO I.

CETACEA

edentula.

UNICO Genere, *Balænæ* ſcilicet, hic Ordo conſtituitur.

I.

Genus Balænæ.

Hujus character eſt
Dentes nulli:
Maxillâ ſuperior laminis corneis utrinque inſtructa.

Obſ. Hujus Generis ſpecierum aliæ binas tantùm habent pinnas laterales, utrinquè unam; aliæ, præter iſtas laterales, tertiam habent in dorſo pinnam.

ORDRE I.

LES CETACÉES

Qui n'ont point de dents.

IL n'y a dans cet Ordre qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui de la *Baleine.*

I.

Le Genre de la Baleine.

Son caractere eſt
De n'avoir point de dents:
D'avoir la mâchoire ſupérieure garnie des deux côtés de lames de corne.

Obſ. Parmi les eſpeces de ce Genre, les unes n'ont que deux nageoires latérales, ſçavoir une de chaque côté; & les autres, outre ces deux latérales, en ont une troiſiéme ſur le dos.

1. LA BALEINE ORDINAIRE DE GROENLAND.

Balæna bipinnis, in dorſo nigricans, in ventre alba, dorſo levi... BALÆNA VULGARIS GROENLANDICA.

Balæna vulgaris edentula dorſo non pinnato. *Raj. Syn. Piſc. p. 6. A. 1.*
Balæna major laminas corneas in ſuperiore maxillâ habens, fiſtulâ donata, bipinnis. *Raj. Syn. Piſc. p. 16. 7.*
Sibbald. Obſ. p. 28.
Balæna fiſtula in medio capite, dorſo caudam versùs acuminato. *Art. Gen. Piſc. g. 48. ſp. 1.*

Digitized by Google

Art. Synon. Piſc. g. 48. ſp. 1.
Art. Deſcr. Piſc. g. 48. ſp. 1.
Faun. Suec. Linn. N°. 264.
Balæna ſiſtula in medio capite, dorſo caudam versùs acuminato. Myſticetus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 99. ſp. 1.*
Balæna vera Zorgdrageri. *Klein. Piſc. Miſ. 2. p. 11. 1.*
Balæna Rondeletii, Geſneri & aliorum. *Will. Hiſt. Piſc. p. 35.*
Balæna vulgò dicta, ſive Myſticetus Ariſtotelis, Muſculus Plinii. *Geſn. Piſc. Fig. p. 132.* (*Fig. mala*).
Balæna vulgò dicta, ſive Muſculus. *Rondel. Piſc. Fig. p. 475.* (*Fig. ut ſuprà*).
Balæna vulgò dicta. *Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 167.* (*Fig. eadem*).
Balæna vulgi. *Aldrov. Piſc. p. 688. Fig. p. 732.* (*Fig. eadem*).
Jonſt. Piſc. p. 152.
Muſ. Worm. p. 281.
Balæna vulgaris. *Charlet. Exer. p. 46.*
Baleine de Groenland. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I. p. 198; & Tom. II. p. 78. Fig. p. 168.* (*Fig. bonne*).
Les Eſpagnols l'appellent VALLENA. *Geſn.*
Les Italiens, BALENA; VALENA. *Geſn.*
Les Allemands, WAL; WALLFISCH; WALLER. *Geſn.*
Les Suédois, GROENLANDS HWALFISKEN. *Art.* GRÖNLANDS-WALFISK. *Linn.*
Les Danois, SLICHTEBACK, *ou* SANDHUAL. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Groënlandois, ARBACH. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Iſlandois, SLETTBARK. *Hiſt. d'Iſl.*
Les autres Habitans du Nord, SEITBAKKER. *Hiſt. d'Iſſ.*
Les Anglois, WHALE, *ou* GREENLANDS-WHALE. *Art. Will.*

La Baleine eſt le plus grand des Animaux. Elle a ordinairement 70 pieds de long. (*Jean Faber* dit qu'il y en a qui vont juſqu'à 100 pieds*). Sa tête ſeule occupe le tiers de ſa longueur. Elle n'a point de dents; mais la mâchoire ſupérieure eſt garnie des deux côtés de lames de corne qui s'ajuſtent obliquement dans l'inférieure, comme dans un fourreau, qui pour cela eſt beaucoup plus large que la ſupérieure. Les lames de corne de devant & de derriere ſont les plus

Omnium Animalium maxima eſt *Balæna*. 70 pedum longitudinem communiter attingit. (Secundùm *Joannem Fabrum* ſunt quæ 100 pedes longitudine adæquant*). Caput maximum eſt, ſiquidem tertiam totius animalis longitudinis partem obtinet. Dentibus omninò caret; ſed eorum loco, in maxillâ ſuperiore tantùm utrinque ſunt laminæ corneæ, quæ in maxillâ inferiore, ſicut in vaginâ, obliquè includuntur: quarum

* Raj. Syn. Piſc. p. 6.

* Raj. Syn. Piſc. p. 6.

Digitized by Google

obrem maxillam inferiorem ſuperiore multò latiorem habet. Laminæ autem illæ corneæ in anteriore oris parte, itemque in poſteriore, breviores ſunt, in mediâ longiſſimæ, ut interdùm 8 vel 10 pedum longitudinem adæquent. Laminæ etiam illæ tenuiore ſui parte, ſecundum earum longitudinem, appendicibus, ſetarum *Porcinarum* æmulis, augentur. Oculos habet oculis *Bovinis* non multò majores, & ſuprà oris angulos collocatos. Auriculæ ei nullæ; ſed, cuticulâ capitis detractâ, poſt & infrà oculum macula inſpicitur nigra, eoque in loco meatus auditorius. In parte capitis ſuperiore, ſuprà oculos, eminentia eſt quædam, è quâ hinc inde exeunt fiſtulæ, quibus aquam rejicit & efflat. Linguam habet maximam, ſubſtantiæ mollis & ſpongioſæ, maxillæ inferiori firmiter adnexam, albicantem, & ad margines maculis nigris ornatam. Pinna nulla eſt in dorſo; binas tantùm habet laterales (utrinque unam) poſt & paulò infrà oris angulos ſitas, oſſibus intùs firmatas, quæ *humanæ* manûs modo in digitos expanduntur. Pinnæ illæ 10 circiter pedes longæ ſunt, & 3 latæ; quæ latitudo, versùs extremitates; & celles du milieu les plus longues: ces dernieres ont juſqu'à 8 ou 10 pieds de long. Toutes ces lames de corne ſont garnies dans toute leur longueur, du côté de leur tranchant, d'appendices qui reſſemblent à des poils de *Sanglier*. Ses yeux, qui ne ſont gueres plus grands que ceux d'un *Bœuf*, ſont placés au-deſſus des angles de la bouche. Elle n'a point d'oreilles; mais lorſqu'on a ôté l'épiderme de la tête, on découvre derriere l'œil & un peu plus bas une tache noire, & dans ce même endroit un conduit, par lequel le ſon pénétre juſqu'au tympan. Elle a ſur la tête, & au-deſſus des yeux, une éminence, de chaque côté de laquelle eſt un canal, par lequel elle rejette l'eau. Sa langue eſt très grande, d'une ſubſtance molle & ſpongieuſe, fermement attachée à la mâchoire inférieure, blanchâtre, & marquée vers ſes bords de taches noires. Elle n'a point de nageoires ſur le dos: elle en a ſeulement une de chaque côté, ſituée derriere, & un peu au-deſſous des angles de la bouche, & ſoutenuë intérieurement par des os, qui imitent ceux des doigts de la main de l'*homme*. Ces nageoires ont environ 10 pieds de long, & 3 de larges; & cette largeur diminue à meſure qu'elle s'éloigne du corps. Sa queue qui eſt plat-

te horizontalement, eſt l'arge d'environ 20 pieds. Sa peau eſt liſſe & noirâtre ſur le dos, & marbrée en certains endroits de blanc & de jaune, ſurtout ſur les nageoires, & ſur la queue. Le ventre eſt blanc. Le mâle a une verge qui a 6 pieds de long, & 7 à 8 pouces de diamétre, & qui ſe termine en une pointe d'un pouce de diamétre. Il la porte ordinairement au dedans du corps, où elle eſt cachée comme dans un fourreau. La partie de la génération de la femelle eſt ſemblable à celle des *Quadrupedes*, & eſt ordinairement fermée. La femelle a auſſi au bas du ventre 2 mammelles, qui, lorſqu'elle a des petits, ont 6 ou 8 pouces d'épaiſſeur, ſur 10 ou 12 de diamétre. On la trouve dans la *Mer du Nord*.

tremum procedendo, minuitur. Cauda horizontaliter plana eſt, & 20 circiter pedes lata. Cutis leviſſima, in ventre alba, in dorſo nigricans, & quibuſdam in locis, præſertim in pinnis & caudâ, ex albo & flavo, marmoris in modum, variegata. Mas penem habet 6 pedes longum, cujus diameter 7 aut 8 pollices attingit, quique in acumen diametri unius pollicis deſinit. Penis iſte in corpore ſub cute, ſicut in vaginâ, includitur. Fœmina vulvam habet vulvis *Quadrupedum* ſimilem, cujus orificium communiter clauſum eſt; & in imo ventre mammas duas, quæ, dum pulli lacte aluntur, 6 aut 8 pollices craſſæ ſunt, earumque diameter 10 aut 12 pollices æquat. Habitat in *Mari Septentrionali*.

2. La Baleine d'Islande.

Balæna bipinnis, ex nigro candicans, dorſo levi... Balæna Islandica.

Balæna Glacialis. *Klein. Piſc. Miſ. 2. p. 12. 3.*
Nord-Caper. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. I. p. 199. & Tom. II. p. 91.*

Elle reſſemble par ſa figure à la précédente: elle en differe ſeulement parce qu'elle a la tête & les lames de corne, qui garniſſent la mâchoire ſupérieure, beaucoup plus petites, & le corps

Figurâ ſuâ præcedentem æmulatur: ab eâ tantùm differt corpore graciliore, & capite & laminis corneis, maxillæ ſuperiori affixis, multò minoribus. Cutem ha-

Digitized by Google

bet levem, & ex nigro candicantem. *Harengis* vescitur. Habitat in mari, circà *Norvegiam*, & *Islandiam*.

plus mince. Sa peau est lisse, & d'un noir qui tire un peu sur le blanchâtre. Elle se nourrit de *Harengs*. On la trouve sur les côtes de *Norvege* & d'*Islande*.

3. La Baleine de la Nouvelle Angleterre.

Balæna bipinnis, unico in dorso gibbo... Balæna Novæ Angliæ.

Balæna gibbo unico propè caudam. *Klein. Pisc. Mis.* 2. *p.* 12. 1.
Pflockfisch. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 101.
Les Anglois l'appellent Bunch, *ou* Hump-back-whale. *Klein. Hist. d'Isl.*

A *Balænâ Groenlandicâ* differt gibbo suo in dorso, versùs caudam, sito, unius pedis altitudine & capitis *humani* crassitie. Binas habet pinnas laterales (utrinque unam) in medio ferè corpore sitas, 18 pedes longas, & candidissimas. Habitat in mari circà *Novam Angliam*.

Elle differe de la *Baleine de Groënland* parce qu'elle a sur le dos, vers la queue, une espece de bosse, qui a un pied de haut & l'épaisseur de la tête d'un *homme*. Elle a deux nageoires, une de chaque côté, placées presque au milieu du corps. Ces nageoires ont chacune 18 pieds de long, & sont fort blanches. On la trouve sur les côtes de la *Nouvelle Angleterre*.

4. La Baleine a six Bosses.

Balæna bipinnis, sex in dorso gibbis.

Balæna gibbis vel nodis sex. *Klein. Pisc. Mis.* 2. *p.* 13. 2.
Knoten-Fisch, ou Knobbel-Fisch. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 102.
Les Anglois l'appellent Scrag-whale. *Klein. Hist. d'Isl.*

Figurâ suâ *Balænam Groenlandicam* imitatur: ab eâ tantùm differt quod laminas habeat corneas albas, sexque in dorso gibbos.

Elle ressemble par sa figure à *la Baleine de Groënland*: elle en differe seulement parce que ses lames de corne sont blanches; & qu'elle a six bosses sur le dos.

Digitized by Google

5. Le Gibbar.

Balæna tripinnis, ventre levi.

Balæna edentula corpore ſtrictiore, dorſo pinnato. *Raj. Syn. Piſc. p. 9. 1. Klein. Piſc. Miſ. 2. p. 13. 1. a.*
Balæna fiſtula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorſo. *Art. Geſn. Piſc g. 48. ſp. 2.*
Art. Synon. Piſc. g. 48. ſp. 2.
Faun. Suec. Linn. No. 265.
Balæna fiſtula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorſo. Phyſalus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 99. ſp. 2.*
Balæna vera. *Rondel. Piſc. Fig. p. 482. (Fig. mala).*
Balæna vera Rondeletii. *Geſn. Piſc. Fig. p. 135. (Fig. ut ſuprà).*
Gen. Icon. Aquat. Fig. p. 166. (Fig. eadem).
Aldro. Piſc. Fig. p. 677. (Fig. eadem).
Balæna vera Rondeletii, Geſn. *Will. Hiſt. Piſc. p. 38.*
Phyſeter veterum. *Raj. Art.*
Gibbar, ou Finfiſch. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p. 92. Fig. p. 168. (Fig. bonne).*
Les Xaintongeois l'appellent Gibbar. *Rondel. Geſn. Hiſt. d'Iſl.*
Les Grecs, φάλαινα. *Geſn.*
Les Suédois, Finn-Fisk. *Linn.*
Les Anglois, Finfish. *Raj. Art.* Finbak-Whale. *Klein.*

Sa longueur eſt égale à celle de la *Baleine de Groënland*; mais ſa groſſeur eſt beaucoup moindre, & ſon corps plus effilé. Il en differe encore plus parce qu'il a ſur le dos, vers la queue, une nageoire droite & pointuë, de 3 ou 4 pieds de long: celles des côtés ont 6 ou 7 pieds. Il a ſur la tête un double canal, par lequel il rejette l'eau avec violence. Ses lames de corne ſont plus courtes que celles de la *Baleine de Groënland*, & de couleur bleue. Sa peau eſt liſſe, & brune ſur le dos & blanche ſur le ventre. Sa queue eſt beaucoup plus

Balænæ Groenlandicæ longitudine par eſt; verùm craſſitie multò minor, & corpus ipſius gracilius eſt. Ab eâ faciliùs adhuc dignoſcitur ex pinnâ rectâ & acutâ, 3 aut 4 pedes longâ, dorſo innaſcente non longè à caudâ. Pinnæ laterales 6 aut 7 pedes longæ ſunt. In parte capitis ſuperiore duplex eſt fiſtula, per quam vehementer aquam rejicit & efflat. Maxillæ ſuperiori innaſcuntur laminæ corneæ quàm in *Balænâ Groenlandicâ* breviores, & coloris cœrulei. Cutis ei levis eſt, in

dorſo

dorso fusca, in ventre alba. Oris rictum habet multò ampliorem quam *Balæna vulgaris*. *Harengis*, *Scombris*, aliisque *Piscibus* vescitur. In *Indiâ* & *Novo Orbe* frequens.

grande que celle de la *Baleine ordinaire*. Il se nourrit de *Harengs*, de *Maqueraux*, & d'autres *Poissons*. On le trouve fréquemment dans l'*Inde* & dans le *Nouveau Monde*.

6. La Baleine a museau rond.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro rotundo.

Balæna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam, & superiore multò latiorem habens. *Raj. Syn. Pisc. p.* 17. 9.
Sibbald. Obs. p. 33. *Fig. T.* 3. (*Fig. sat bona*).
Balæna fistula duplici in fronte, maxillâ inferiore multò latiore. *Art. Gen. Pisc. g.* 48. *sp.* 4.
Art. Synon. Pisc. g. 48. *sp.* 4.
Linn. Syst. nat. ed. 6. *g.* 99. *sp.* 3.
Balæna Bellonii. *Aldro. Pisc. Fig p.* 676. (*Fig. mala*).
Balæna. *Bell. Aquat. p.* 4. *Fig. p.* 6. (*Fig. ut suprà*).
Balene. *Bell. des Pois. p.* 4. *Fig. p.* 5. (*Fig. mauv.*)

Illius, cujus descriptionem dedit *Sibbaldus*, longitudo 78 pedes æquat: ambitus corporis 35 pedes superat. Maxilla inferior multò latior est & amplior superiore, figuræ semicircularis, & 13 pedes cùm 2 ½ pollicibus longa: superior verò angustior, & versùs partem extremam contractior, in acutum desinit. Rictus autem ipsius tantus est, ut in ejus ore uno eodemque tempore 14 *homines* stare possint. Lingua 15 pedes & 7 ½ pollices longa, & qua parte latissima 15 quoque pedes habet, substantiâque molliss imâ constat. Totum palatum ni-

La longueur de celle que *Sibbald* a décrite, est de 78 pieds. Le tour de son corps est de plus de 35 pieds. Sa mâchoire inférieure est beaucoup plus grande & plus large que la supérieure, & de figure semicirculaire, & elle a 13 pieds 2 ½ pouces de long: sa mâchoire supérieure est plus étroite, & se termine en pointe. Sa gueule est si grande, qu'il y peut tenir 14 *hommes* debout dans le même tems. Sa langue, qui est d'une substance molle, a 15 pieds 7 ½ pouces de long, & 15 pieds dans sa plus grande largeur. Tout son palais est couvert de soyes noires, qui luy tombent sur la langue: ses

lames de corne ſont noires & courtes; les plus longues n'ont que 3 pieds. Elle a ſur le front deux canaux, par leſquels elle rejette l'eau, qui approchent de la figure d'une pyramide, dont la baſe eſt vers le front. Ses yeux ſont placés un peu audeſſus des angles de la bouche, & diſtants du bout du muſeau de 13 pieds 2 pouces. Ses nageoires latérales ont 10 pieds de long, & 2 ½ pieds dans leur plus grande largeur, & 3 pouces ſeulement vers l'extrémité, & ſont éloignées de l'ouverture de la bouche de 6 pieds 5 pouces. Celle du dos eſt placée vers la queue, & eſt longue d'environ 3 pieds, & large de 2. Sa queue a 18 ½ pieds de large. Sa verge, qui eſt placée un peu audeſſous du nombril, a 5 pieds de long, & 4 pieds de tour à ſon origine; & elle devient enſuite peu à peu plus étroite juſqu'à ſon extrémité. L'anus eſt placé à 5 pieds audeſſous de la verge: ſon ouverture eſt longue d'un pied. Depuis la mâchoire inférieure juſqu'au nombril ſon ventre eſt garni de plis ou de rides, qui ont chacune 2 pouces de large, & qui ſont diſtantes d'autant les unes des autres. La couleur de ſa peau eſt noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre. Cette eſpece vit de *Harengs*.

gris contectum eſt ſetis, quæ ſuprà linguam pendent: laminæ corneæ nigræ ſunt & breves; longiores enim 3 tantùm pedes æquant. Duæ ſunt in fronte fiſtulæ, quibus aquam rejicit & efflat, figuræ ad pyramidalem accedentis, cujus baſis versùs frontem vertitur. Oculi paulò ſuprà oris angulos ſiti ſunt, & ab eis ad roſtri extremitatem diſtantia eſt 13 pedum & 2 pollicum. Pinnæ laterales 10 pedes longæ, qua parte latiſſimæ 2 ½ pedes habent, & versùs extremum 3 tantùm pollices latæ. Ab eis ad oris hiatum diſtantia eſt 6 pedum & 5 pollicum. Pinna dorſalis versùs caudam ſita eſt, treſque circiter pedes longa, & 2 lata. Cauda 18 ½ pedes latitudine attingit. Penis, qui paulò infrà umbilicum pendet, 5 pedes longus, in exortu 4 pedes in ambitu obtinet, ſenſimque ad extremum anguſtius vergit. Ad 5 pedes ſub pene anus ſitus eſt; rima autem ejus unum pedem longa. A maxillâ inferiore ad umbilicum venter plenus eſt plicis ſeu rugis, quæ in latitudine 2 pollices obtinent, & pars eminens & pars cava æquales ſunt, ejuſdemque menſuræ. Cutis eſt in dorſo nigra, in ventre alba. *Harengis* victitat hæc ſpecies.

Digitized by Google

7. La Baleine a museau pointu.

Balæna tripinnis, ventre rugoso, rostro acuto.

Balæna tripinnis, nares habens, cum rostro acuto, & plicis in ventre. *Raj. Syn. Pisc. p.* 16. 8.
Sibbald. Obs. p. 29. *Fig. T.* 1. *Lit. D.* (*Fig. sat bona*).
Balæna fistulâ duplici in rostro, protuberantiâ cornuiformi, in extremo dorso. *Art. Gen. Pisc. g.* 48. *sp.* 3.
Art. Synon. Pisc. g. 48. *sp.* 3.
An Balæna *Tigridis* instar variegata? *Klein. Pisc. Mis.* 2. *p.* 16.

Junioris hujus speciei descriptionem dedit *Sibbaldus*. Ab extremitate rostri ad caudam 46 pedes longa est. Ambitus corporis juxtà pinnas laterales, qua parte crassissimum, 20 pedum est, & 12 tantùm pedum juxtà pinnam dorsalem mensuratus. Caput est oblongum, molliter ad angustiam quamdam, secundùm rostri longitudinem, inclinans: rostrum autem figuræ inter acutum & obtusum mediæ. Maxilla inferior circà medium 4 ½ pedes lata: oris rictus 10 pedes longus, & 4 pedes cum 2 pollicibus latus: lingua, licet contracta, 5 pedes longa, versùs radices 3 pedes lata, & paris fere cum latitudine crassitiei, substantiâ, colore, & figurâ planè *Bovinæ* similis. In parte rostri altiore duæ sunt fistulæ, quibus aquam rejicit, ab extremitate maxillæ superioris 6 pedes &

Sibbald en a décrit une jeune de cette espece, qui a 46 pieds de long depuis le bout du museau jusqu'à la queue: le tour de son corps mesuré aux nageoires latérales, où il est le plus gros, est de 20 pieds, & de 12 seulement mesuré à la nageoire du dos. Sa tête est oblongue, & se rétrécit un peu vers le bout du museau, qui tient le milieu entre l'aigu & l'obtus. La mâchoire inférieure est large de 4 ½ pieds vers son milieu: l'ouverture de la bouche est longue de 10 pieds, & large de 4 pieds 2 pouces: sa langue, quoique contractée, a 5 pieds de long, & 3 de large vers sa racine, & presque autant d'épaisseur, & est semblable en substance, en couleur, & en figure à celle d'un *Bœuf*. Elle a sur la partie la plus élevée de la tête 2 canaux, par lesquels elle rejette l'eau, qui sont éloignés de 6 pieds 8 pouces du bout de la mâchoire supérieure. Ses yeux sont environ de la grosseur de

ceux d'un *Bœuf*, & placés auprès des angles de la bouche. Elle a 3 nageoires, ſçavoir 2 latérales & une ſur le dos : les latérales, qui ſont placées à la poitrine, & diſtantes des yeux de 5 pieds, ont 5 pieds de long, & 1 $\frac{1}{2}$ pied de large : celle du dos eſt diſtante de la queue de 8 $\frac{1}{2}$ pieds, & reſſemble aſſez à une corne. Sa queue a 9 $\frac{1}{2}$ pieds de large. Sa verge a à peine 2 pieds de long, & eſt placée à 5 $\frac{1}{2}$ pieds audeſſous du nombril. A 3 pieds audeſſous de la verge eſt ſitué l'anus, dont l'ouverture a $\frac{1}{2}$ pied de long, & eſt éloignée du bout de la queue de 14 pieds. Depuis la mâchoire inférieure juſqu'au nombril & aux nageoires latérales, le ventre eſt garni de plis ou de rides longitudinales, larges d'un pouce. La largeur & la profondeur des ſillons qu'elles forment, n'eſt pas tout à fait d'un pouce. Sa peau eſt très liſſe, noire & brillante ſur le dos, & blanche ſur le ventre.

8 pollices diſtantes. Oculi *Bovinis* ferè magnitudine pares videntur, nec procul ab oris angulis collocantur. 3 ei ſunt pinnæ, duæ laterales, unaque dorſalis : pinnæ laterales, utrinque in pectore ſitæ, & 5 pedes ab oculis diſtantes, 5 pedes longæ ſunt, & 1 $\frac{1}{2}$ pede latæ : pinna verò dorſalis 8 $\frac{1}{2}$ pedes à caudâ diſtat, cornuque ſat benè imitatur. Cauda 9 $\frac{1}{2}$ pedes lata. Penis, ad 5 $\frac{1}{2}$ pedes infrà umbilicum ſitus, pedes 2 in longitudine vix attingit. Infrà eum ad 3 pedes poſitus eſt anus, cujus apertura pedem dimidium æquat, & ab extremo caudæ 14 pedes diſtat. A maxillâ inferiore ad umbilicum, & uſque ad pinnas laterales, permultæ ſunt in ventre plicæ ſive rugæ longitudinales 1 pollice latæ ; & ſulcorum inter has latitudo & profunditas pollice minores. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigra & nitidiſſima, in ventre alba.

Digitized by Google

ORDO II.

CETACEA

Dentata in maxillâ inferiore tantùm.

GENUS *Ceti* unicum est ad hunc Ordinem constituendum.

II.

Genus Ceti.

Hujus character est
Dentes in maxillâ inferiore tantùm:
Alveoli in maxillâ superiore, ad dentes inferioris includendos aptati.

Obs. Hujus Generis specierum aliæ binas tantùm habent pinnas laterales, utrinque unam; aliæ, præter istas laterales, tertiam habent in dorso.

ORDRE II.

LES CETACÉES

Qui ont des dents à la mâchoire inférieure seulement.

CET Ordre ne contient qu'un seul Genre, sçavoir celui du *Cachalot*.

II.

Le Genre du Cachalot.

Son caractere est
D'avoir des dents à la mâchoire inférieure seulement:
Et à la mâchoire supérieure des trous propres à recevoir les dents de la mâchoire inférieure.

Obs. Parmi les especes de ce Genre les unes n'ont que deux nageoires latérales, une de chaque côté; & les autres, outre ces deux latérales, en ont une troisiéme sur le dos.

1. LE CACHALOT.

Cetus bipinnis, suprà niger, infrà albicans, fistulâ in cervice, dorso levi... CETUS.

Cetus dentatus. *Mus. Worm. p.* 280.
Charlet. Exer. p. 47.

Digitized by Google

Cete, Potwalfish, Batavis maris accolis dictum, Cluſii Exot. *Raj. Syn. Piſc. p.* 11. 4.

Cete Cluſio deſcriptum, Potwalfish, Batavis maris accolis dictum. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 41. *Fig. T. A.* 1. *F.* 3. (*Fig. bona*).

Cete. Cluſii Exot Lib. VI. Raji, Willughbeji, & aliorum. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 14. 1.

Aliud Cete admirabile. *Cluſ. Exot. Fig. p.* 131. (*Fig. ſat bona*).

Balæna major, in inferiore tantùm maxillâ dentata, macrocephala, bipinnis. *Raj. Syn. Piſc. p.* 15. 3.

Sibbald. Obſ. p. 12.

Balæna. *Jonſt. Piſc. p.* 151. *Fig. T.* 41. & 42. [*Fig. bonis*].

Catodon fiſtula in cervice. *Art. Gen. Piſc. g.* 50. *ſp.* 2.

Art. Synon. Piſc. g. 50. *ſp.* 2.

Linn. Syſt. nat. ed. 6. *g.* 97. *ſp.* 2.

Faun. Succ. Linn. No. 262.

Aquatile ingens. *Euſ. Nieremb. Fig. p.* 263. (*Fig. bona*).

Cachelot, ſive Potfish, Zorgdrageri. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 14. 2.

Cachalot. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 116.

Les Hollandois l'appellent Potwalfish. *Klein. Hiſt. d'Iſl.* Cazilot, ou Potfisch; *& quelques uns*, Nord-Caper. *Hiſt. d'Iſl.*

Le Cachalot décrit par *Cluſius*, a 52 ou 53 pieds de long. (Il y en a qui ont juſqu'à 80 pieds de long, & le reſte à proportion). Le tour de ſon corps eſt d'environ 31 pieds. Sa tête eſt très groſſe, & applatie en devant, comme le muſle d'un *Bœuf*. La mâchoire ſupérieure a 15 pieds de long, depuis ſon extrémité juſqu'aux yeux; & la mâchoire inférieure n'en a que 7: elle eſt garnie tout au tour de dents de la groſſeur du poignet, qui ſortent des gencives de 2 ou 3 pouces, & qui s'emboitent dans autant de trous ſitués dans la mâchoire ſupérieure. Le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé ſur le ſommet de la tête vers le dos, & a environ 3 pieds

Cetus à *Cluſio* deſcriptus 52 aut 53 pedum longitudinem attingit. (Sunt qui 80 pedum longitudinem æquant, craſſitie proportionatâ). 31 circiter pedes in ambitu corporis obtinet. Caput habet craſſiſſimum, & roſtri *Bovini* inſtar anteriùs compreſſum. Maxilla ſuperior, ab ipſius extremitate ad oculos uſque, 15 pedes longa eſt; maxilla vero inferior 7 tantùm pedes longa, in cujus ambitu plurimi ſunt dentes carpi humani craſſitie, qui è gingivis ad 2 vel 3 pollicum longitudinem exerti ſunt. Maxilla ſuperior totidem habet alveolos carneos, in quibus dentes inferioris excipit. In cervice,

Digitized by Google

versùs dorsum, fistula est, foramen circiter 3 pedes amplum, per quod aquam in altum ejicit. Oculos habet 7 aut 8 pollices longos; pinnas laterales duas (utrinque unam) 4 pedes ab oculis distantes, 4 pedes & 4 pollices longas, unoque ferè pede crassas. Ab umbilico ad maxillas distantia est 16 pedum: ad 3 pedes infrà umbilicum penis est 6 pedes longus; & infrà penem ad 3 ½ pedum distantiam anus est collocatus: cauda verò crassissima, 13 pedes lata, 13 ½ pedes ab ano distat. Cutis est in dorso nigra, in ventre alba.

de grandeur. Ses yeux ont 7 à 8 pouces de long. Il n'a que deux nageoires (une de chaque côté) distantes des yeux de 4 pieds. Ces nageoires ont 4 pieds 4 pouces de longueur, & presque 1 pied d'épaisseur. Le nombril est éloigné des mâchoires de 16 pieds: à 3 pieds au-dessous du nombril se trouve la verge, qui a 6 pieds de long: l'anus est placé à 3 ½ pieds au-dessous de la verge; & de là jusqu'à la queue, il y a 13 ½ pieds de distance. Sa queue est très épaisse, & large de 13 pieds. Sa peau est noire sur le dos, & blanche sur le ventre.

2. Le Cachalot blanc.

Cetus bipinnis, ex albo flavescens, fistulâ in cervice, dorso levi... Cetus albicans.

Balæna albicans. *Klein. Pisc. Mis. 2. p. 12. 2.*
Albus Piscis Cetaceus. *Raj. Syn. Pisc. p. 11. 5.*
White-Fish, Frederici Martens. *Raj. Klein.*
Wittfisch, ou Weisfisch. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 148.*

Corporis longitudo 15 est aut 16 pedum. Figurâ suâ *Balænam vulgarem* imitatur; capite tamen acutiore donatur. Dentes habet parumper incurvos, compressos, apice rotundatos; eminentiam quamdam in cervice, & fistulam, per quam aquam ejicit; pinnam in dorso nullam,

La longueur de son corps est de 15 ou 16 pieds. Il ressemble par sa figure à la *Baleine ordinaire*; il a cependant la tête plus pointue. Ses dents sont un peu recourbées, applaties, & arrondies par enhaut. Il a sur le sommet de la tête une éminence, & un canal, par lequel il rejette l'eau. Il n'a point de nageoire

sur le dos; mais il en a une de chaque côté passablement longue. Sa queue est semblable à celle de la *Baleine ordinaire*. La couleur de sa peau est d'un blanc jaunâtre. On le trouve dans le *Détroit de Davis*, & sur tout dans *la Baye Méridionale*, appellée *Sud-Bucht*.

duas verò laterales, utrinque unam, pro mole corporis, satis longam; caudam caudæ *Balænæ vulgaris* æmulam. Cutis ex albo flavescit. Habitat in *Freto Davis*; in *Freto Meridionali, Sud-Bucht* vocato, frequens.

3. Le Cachalot de la Nouvelle Angleterre.

Cetus bipinnis, fistula in cervice, dorso gibboso... Cetus Novæ Angliæ.

Balæna Dudleji, dorso Gibbo. *Klein. Pisc. Mis.* 2. *p.* 25.
Cachalot des côtes de la Nouvelle Angleterre. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 127.
Cachalot. *Hist. de l'Acad. an.* 1741. *p.* 26.
Les Anglois l'appellent Sperma Ceti-Whale. *Hist. d'Isl.*
Dans les Bermudes il porte le nom de Trumpo. *Hist. d'Isl.*

La longueur de son corps est de 60 ou 70 pieds, & l'épaisseur de 30 ou 40 pieds. Sa tête est énorme, & fait presque la moitié de la longueur de son corps. La mâchoire supérieure est beaucoup plus épaisse que l'inférieure; elle est fort large vers le museau, & son bout est applati en avant, comme le musle d'un *Taureau*. La mâchoire inférieure est garnie de dents de la grosseur du bras près de la main, qui sont éloignées l'une de l'autre d'environ $\frac{1}{2}$ pied, & qui s'emboîtent dans autant de trous situés à la mâchoire supérieure. Ses yeux sont petits à

Corporis longitudo 60 aut 70 pedes æquat; crassities 30 aut 40 pedes. Caput est prægrande, & mediam ferè corporis longitudinem attingit. Maxilla superior inferiore multò crassior est, & latissima circà rostrum, cujus extremitas, rostri *Tauri* instar, anteriùs compressa est. Plurimi sunt in maxillâ inferiore dentes, carpi humani crassitie, circiter $\frac{1}{2}$ pedem à se invicem distantes: maxilla autem superior totidem habet alveolos carneos, in quibus prædicti dentes excipiuntur. Oculos habet, pro mole corporis;

poris, exiguos; fistulam in cervice, cujus diameter saltem 1 pedem æquat, & per quam aquam rejicit & efflat; binas tantùm pinnas laterales, utrinque unam; & loco pinnæ dorsalis, gibbum habet unum pedem crassitie superantem. Cutis est ad tactum molliſſima, & ex cinereo nigricans. Habitat in mari; circà *Novam Angliam* frequens.

proportion du corps. Il a sur le sommet de la tête un canal par lequel il rejette l'eau, & qui a au moins 1 pied de diamétre. Il n'a que deux nageoires, sçavoir une de chaque côté: & à la place de la nageoire du dos, il a une bosse de plus d'un pied d'épaisseur. Sa peau est très douce au toucher, & d'un gris noirâtre. On le trouve communément sur les côtes de la *Nouvelle Angleterre.*

4. Le Petit Cachalot.

Cetus bipinnis, fistula in rostro... Cetus minor.

Balæna minor, in inferiore maxillâ tantùm dentata, sine pinnâ, aut spinâ in dorso. *Raj. Syn. Pisc. p.* 15. 2.
Sibbald. Obs. p. 9.
Catodon fistulâ in rostro. *Art. Gen. Pisc. g.* 50. *sp.* 1.
Art. Synon. Pisc. g. 50. *sp.* 1.
Linn. Syst. nat. ed. 6. *g.* 97. *sp.* 1.

Longitudo corporis 24 pedes æquat. Caput habet rotundum, cum rictu oris parvo; dentes in maxillâ inferiore tantùm; in superiore autem alveolos, pro dentibus inferioris recipiendis: sunt autem hi dentes in planum finientes, & dimidium tantùm pollicis unius extrà gingivas extant. Fistulam habet in rostro, per quam aquam ejicit. Pinnâ dorsali caret; duabus tantùm lateralibus, utrinque unâ, donatur.

La longueur de son corps est de 24 pieds. Sa tête est ronde, & l'ouverture de sa bouche petite. Il n'a des dents qu'à la mâchoire inférieure, qui s'emboitent dans autant de trous situés à la mâchoire supérieure: ces dents ne sortent des gencives que d'un demi pouce, & sont terminées par un plan. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé sur le museau. Il n'a point de nageoires sur le dos; il n'en a que deux latérales, une de chaque côté.

Digitized by Google

5. Le Cachalot a dents pointuës.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, rectis.

Deuxiéme eſpece de Cachalot. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 139.

Celui qui eſt décrit dans *l'Hiſt. d'Iſl. & de Gro.* a 70 pieds de long. (On en trouve de 80 à 100 pieds). Sa tête eſt énorme, & a preſque la moitié de la longueur de ſon corps. La mâchoire inférieure, qui eſt beaucoup plus petite que la ſupérieure, s'emboîte entiérement dans cette derniere, & eſt garnie de groſſes dents droites & pointuës par enhaut, rangées à diſtances égales les unes des autres, comme celles d'une *Scie*, & qui s'emboitent dans des trous ſitués à la mâchoire ſupérieure. Ses yeux ſont très petits, brillants & jaunâtres. Sa langue eſt petite & pointuë; le canal par lequel il rejette l'eau, eſt placé au haut & ſur le devant de la tête. Outre les deux nageoires latérales, qui ont chacune 1 ½ pied de long, il en a une troiſiéme ſur le dos vers la queue. Il a auſſi ſur le haut du dos, une boſſe fort élevée. Sa peau eſt très liſſe, & noirâtre ſur le dos, & blanchâtre ſur le ventre.

Longitudo illius, cujus deſcriptionem dedit *D. Anderſonius*, *Hiſt. d'Iſl. & de Gro.* 70 pedes æquat. (Sunt qui 80 ad 100 pedes longitudine attingunt). Caput eſt maximum, & mediam ferè corporis longitudinem attingit. Maxilla inferior ſuperiore multò minor eſt, & in illâ omninò includitur. In maxillâ inferiore dentes ſunt craſſi, recti, in apice acuti, æqualiter à ſe invicem diſtantes, *Serræ* dentium inſtar; in maxillâ ſuperiore verò totidem ſunt alveoli, ad excipiendos inferioris maxillæ dentes comparati. Oculos habet valdè exiguos, ſplendentes & flavicantes; linguam parvam & acutam; in parte capitis anteriore & altiore fiſtulam, per quam aquam in altum ejicit; pinnas duas laterales, utrinque unam, 1 ½ pede longam, & præter iſtas, tertiam in dorſo versùs caudam, & gibbum altiſſimum in parte ſuperiore dorſi. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigricans, in ventre candicans.

Digitized by Google

6. Le Cachalot a dents en faucilles.

Cetus tripinnis, dentibus acutis, arcuatis, falciformibus.

Balæna major, in inferiore tantùm maxillâ dentata, dentibus arcuatis, falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens. *Raj. Syn. Pisc. p.* 15. 4.
Klein. Pisc. Mis. 2. p. 15. 1.
Sibbald. Obs. p. 13. *Fig. T.* 1. *Lit. A.* (*Fig. mala*).
Physeter maxillâ superiore longiore, spinâ longâ in dorso. *Art. Gen. Pisc. g.* 46. *sp.* 1.
Linn. syst. nat. ed. 6. *g.* 101. *sp.* 1.
Physeter maxillâ superiore longiore, pinnâ longâ in dorso. *Art. Synon. Pisc. g.* 46. *sp.* 1.
Troisiéme espece de Cachalot. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 142.

Corporis longitudo quandoque 70 pédes attingit. Caput tantæ molis est, ut, demptâ caudâ, totius corporis mediam longitudinem habeat, & crassitie reliquam corporis partem, etiam quâ crassissimum, superet. In maxillâ inferiore, quæ superiore paulò brevior est, dentes sunt rotundi, parumper compressi, arcuati, & falciformes, in mediâ longitudine crassiores & magis arcuati, & sensim de crassitie remittentes, superiùs in conum acutum, intùs versum, desinentes, inferiùs etiam de crassitie perdentes, & in radicem tenuiorem & quàm in medio angustiorem finientes. In maxillâ superiore totidem sunt alveoli quot sunt dentes in inferiore, ad istos dentes excipiendos comparati. Oculi

La longueur de son corps est quelquefois de 70 pieds. Sa tête est si grande, qu'elle a la moitié de la longueur de tout le corps, si l'on en excepte la queue, & qu'elle est plus grosse que le reste du corps, même dans l'endroit où il est le plus épais. La mâchoire inférieure est un peu plus courte que la supérieure, & est garnie de dents rondes, un peu comprimées & recourbées en forme de faucilles. Le plus grand diamétre de chaque dent est vers le milieu de sa longueur, & chacune se termine par un cone pointu, dont le sommet est tourné vers la partie intérieure de la bouche. Toutes ces dents s'emboitent dans autant de trous situés à la mâchoire supérieure. Ses yeux sont très petits. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé un peu audessus du milieu du mu-

Digitized by Google

ſeau. Outre les deux nageoires latérales, qui ont chacune environ 4 pieds de long, il en a ſur le dos une troiſieme aſſez longue, & qui ſe termine en pointe : (ce qui luy a fait donner le nom d'*Epine*). Sa peau eſt très liſſe, & d'un brun noirâtre. Le mâle a une verge longue de 6 pieds, & éloignée des mâchoires d'environ 20 pieds. L'anus eſt placé à environ 3 pieds au-deſſous de la verge; & de-là juſqu'à la queue il y a 14 pieds de diſtance. Les extrémités de la queue ſont diſtantes de 9 pieds l'une de l'autre.

ſunt perexigui. Parùm ſuprà roſtrum medium fiſtula eſt, per quam aquam in altum ejicit. Binas habet pinnas laterales (utrinque unam) 4 circiter pedes longas, & præter iſtas, tertiam in dorſo ſatis longam, & in acutum deſinentem : (undè *Spinæ* nomen). Cutis eſt leviſſima, & ex fuſco nigricans. Mas penem habet 6 pedes longum, & 20 circiter pedes à mandibulis diſtantem : à pene ad podicem 3 plùs minùs pedum diſtantia eſt : à podice ad caudam diſtantia 14 pedum : caudæ extrema à ſe invicem 9 pedes diſtant.

7. Le Cachalot a dents plattes.

Cetus tripinnis, dentibus in planum deſinentibus.

Balæna macrocephala tripinnis, quæ in mandibulâ inferiore dentes habet minùs inflexos, & in planum deſinentes. *Raj. Syn. Piſc. p.* 16. 5.
Sibbald Obſ. p. 18.
Phyſeter pinnâ dorſi altiſſimâ, apice dentium plano. *Art. Gen. Piſc. g.* 46. *ſp.* 2.
Art. Synon. Piſc. g. 46. *ſp.* 2.
Linn. ſyſt. nat. ed. 6. *g.* 101. *ſp.* 2.
Mular Nierembergii. *Klein. Piſc. Miſ.* 2. *p.* 15. 2. *a.*
Piſcis Mulatis. *Euſ. Nieremb. p.* 265.
Cachalot à petites dents groſſes & applaties. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p.* 117.

La longueur de ſon corps eſt quelquefois de plus de 100 pieds. Il reſſemble au précédent par ſa figure, mais il en differe par celle de ſes dents, qui ſont moins recourbées, & qui ſe ter-

Corporis longitudo quandoque 100 pedes ſuperat. Figurâ ſuâ præcedentem imitatur, ab eo autem differt figurâ dentium, qui minùs ſunt in medio inflexi, & in planum

Digitized by Google

desinunt. Fistulam habet in fronte, per quam aquam rejicit & efflat; pinnas duas laterales, & præter istas, tertiam in medio ferè dorso, quam gerit erectam, quæque arbori navis, à Nautis *Mât de Mizéne* dictæ, comparatur. Habitat in mari; frequens circà *Caput Septentrionale*, & circà *Finmarchiam*.

minent par un plan. Le canal par lequel il rejette l'eau, est placé sur le front. Outre les deux nageoires latérales, il en a une troisiéme presque au milieu du dos, qu'il porte droite & élevée, & qu'on compare au mât d'un vaisseau, appellé *Mât de Mizéne*. On le trouve le plus fréquemment au *Cap du Nord*, & sur les côtes de *Finmarchie*.

Digitized by Google

ORDRE III.

LES CETACÉES

Qui ont des dents à la mâchoire supérieure seulement.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans les deux précédents, qu'un seul Genre, qui est celui du *Narhval*.

III.

Le Genre du Narhval

Son caractere est
D'avoir à la mâchoire supérieure seulement deux dents très longues, droites, & qui avancent en avant.

ORDO III.

CETACEA

Dentata in maxillâ superiore tantùm.

IN hoc Ordine, sicut in duobus præcedentibus, unicum continetur Genus, scilicet *Ceratodontis*.

III.

Genus Ceratodontis.

Hujus character est
In maxillâ superiore tantùm dentes duo longissimi, recti, antrorsùm prominentes.

* I. LE NARHVAL.

CERATODON.

Narhwal. *Klein. Pisc. Mis.* 2. *p.* 18. *Fig. T.* 2. *Lit. C.* (*Fig. bona*).
Monoceros Piscis è Genere Cetaceo. *Raj. Syn. Pisc. p.* 11. 6.
Monoceros Piscis qui de Genere Cetaceo esse fertur. *Will. Hist. Pisc. p.* 42. *Fig. T. A.* 2. (*Fig. mala*) *& cranium cum dente eâdem Tab.* (*Fig. bona*).
Monoceros, Unicornu. *Linn. Syst. nat. ed.* 6. *g.* 98. *sp.* 1.
Monoceros, Unicornu Marinum. *Charlet. Exer. p.* 47.
Unicornu Marinum. *Mus. Worm. Fig. p.* 282. [*Fig. mala*]. *& cranium Fig. p.* 283. *&* 284. [*Fig. sat bonis*].
Monodon. *Art. Gen. Pisc. g.* 49. *sp.* 1.

Digitized by Google

Art. Synon. Pisc. g. 49. sp. 1.
Faun. Suec. Linn. No. 263.
Licorne de mer. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 102. Fig. p. 108.* [*Fig. bonne*].
Les Suédois l'appellent ENHÖRNING. *Linn.*
Les Islandois, NARHWAL. *Raj. Will. Art.*
Les Septentrionaux, NARHVAL. *Charlet.*
Les Groënlandois, TOWACK. *Hist. d'Isl.*

Corporis longitudo vulgaris 20 aut 22 pedes circiter æquat. (Sunt qui 40 ad 60 pedes longitudine attingunt, secundùm *Anderson. Hist. d'Isl. & de Gro.*). Caput habet, pro mole corporis, perexiguum. In maxillâ superiore duo sunt dentes (*a*) 6 aut 7 pedes longi, recti, spiraliter intorti (*b*), labium superius perforantes, antrorsùm prominentes. Oculos habet perexiguos; fistulam in capite, per quam aquam rejicit; pinnam in dorso nullam; binas tantùm habet laterales, utrinque unam valdè exiguam. Cutis est levissima,

La longueur ordinaire de son corps est d'environ 20 ou 22 pieds. (Il y en a de 40 à 60 pieds, selon *Anderson*, *Hist. d'Isl. & de Gro.*). Sa tête est très petite, en comparaison de la grosseur de son corps. Il a à la mâchoire supérieure deux dents (*a*) longues de 6 ou 7 pieds, droites, tortillées en spirale (*b*), qui percent la lévre supérieure, & avancent en avant. Ses yeux sont très petits. Il a par dessus la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il n'a point de nageoire sur le dos: il en a seulement une de chaque côté, & très petite. Sa peau est très lisse, blanche, & marquée sur le dos de taches noires. On

(*a*) Rarissimè reperiuntur *Ceratodontes* duobus dentibus præditi; ex illis enim una perit ordinariè in alveolo suo: quod facilè comprobatur inspectione juniorum, qui omnes duobus dentibus præditi sunt. Vide *Anderson. Hist. d'Isl. & de Gro. Vol. II. p. 104.*

(*b*) Secundùm Authores quosdam hujusmodi reperiuntur dentes nequaquam spiraliter intorti, sed per totam longitudinem leves. Fortassè *Ceratodontis* altera species.

(*a*) Il est très rare de trouver le *Narhval* avec ses deux dents; parce qu'il y en a ordinairement une qui périt dans son alvéole. La preuve de cela, c'est que les jeunes en ont deux. Voyez *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 104.*

(*b*) Quelques Auteurs disent avoir trouvé quelques unes de ces dents, qui n'étoient point tortillées en spirale, mais lisses d'un bout à l'autre. C'est peut être une autre espece de *Narhval*.

Digitized by Google

le trouve ordinairement sur les côtes d'*Islande* & de *Groënland*, & dans le *Détroit de Davis*.

alba, maculis nigris in dorso variegata. Habitat in mari circà *Islandiam* & *Groenlandiam*, & in *Freto Davis*.

ORDO IV.

Digitized by Google

ORDO IV.

CETACEA

Dentata in utrâque maxillâ.

HIc Ordo, ſicut & præcedentes, unico conſtituitur Genere, ſcilicet *Delphini.*

IV.

Genus Delphini.

Hujus character eſt
Dentes in maxillâ utrâque.

Obſ. Hujus Generis ſpecies ultima binas tantùm habet pinnas laterales, utrinque unam; aliæ omnes, præter iſtas laterales, tertiam habent in dorſo.

ORDRE IV.

LES CETACÉES

Qui ont des dents aux deux mâchoires.

IL n'y a dans cet Ordre, comme dans tous les précédents, qu'un ſeul Genre, ſçavoir celui du *Dauphin.*

IV.

Le Genre du Dauphin.

Son caractere eſt
D'avoir des dents aux deux mâchoires.

Obſ. La derniere eſpece de ce Genre n'a que deux nageoires latérales, une de chaque côté; toutes les autres, outre ces deux laterales, en ont une troiſiéme ſur le dos.

* 1. LE DAUPHIN.

Delphinus pinnâ in dorſo unâ, dentibus acutis, roſtro longo, acuto... DELPHINUS.

Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto. *Art. Gen. Piſc. g. 47. ſp. 2.*
Art. Synon. Piſc. g. 47. ſp. 2.
Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto. Delphinus. *Linn. ſyſt. nat. ed. 6. g. 100. ſp. 2.*
Delphinus antiquorum. *Raj. Syn. Piſc. p. 12. 7.*

Digitized by Google

Delphinus. *Klein. Piſc. Miſ. 2. p. 24. Fig. T. 3. Lit. A. & cranium T. I. No. 2. (Fig. bonis)*
Aldro. Piſc. p. 701. Fig. p. 703, & 704 [Fig. malis].
Jonſt. Piſc. p. 154. Fig. T. 43. & cranium T. 44. [Fig. ſat bonis].
Rondel. Piſc. Fig. p. 459. (Fig. ſat bona).
Will. Hiſt. Piſc. p. 28. Fig. T. A. 1. F. 1. (Fig. bona).
Bell. Aquat. p. 7. Fig. p. 9. (Fig. ſat bona).
Muſ. Worm. p. 288.
Charlet. Exer. p. 47.

Delphinus Bellonii. *Geſn. Piſc. p. 380. Fig. p. 381. (Fig. ſat bona).*

Delphinus, vel Delphin. *Geſn. Icon. Aquat. p. 163. Fig. p. 161. & cranium p. 162. (Fig. ſat bona).*

Sus Marinus roſtro acuto. *Euſ. Nieremb. p. 259.*

Daulphin, que nous appellons Oye de mer. *Bell. des Poiſ. p. 6. Fig. p. 7. (Fig. aſſez bonne).*

Dauphin. *Hiſt. d'Iſl. & de Gro. Tom. II. p. 153.*

Les François l'appellent Bec d'Oye. *Rondel. Geſn.* Oye de mer. *Bell.*

Les Bretons, Morhouch, *ou* Morho. *Geſn. Aldro.*

Les Grecs, Δελφὶς; Δελφίν. *Geſn. Aldro. Bell. Rondel. Charlet.*

Les Italiens, Delfino. *Geſn.*

Les Allemands, Meerschweyn. *Geſn.*

Les Polonois, Morska Swinia. *Geſn. Aldro.*

Les Suédois, Marswin. *Linn.*

Les Norvégeois, Nyssa. *Hiſt. d'Iſl.*

Les Hollandois, Tuymelaar. *Hiſt. d'Iſl.*

Les Marins, Tümmeler. *Hiſt. d'Iſl.*

Les Flamands, Meerswyn. *Aldro.*

Les Anglois, Dolphin. *Raj. Art.* Porpesse. *Will. Art.*

La longueur de ſon corps eſt de 9 ou 10 pieds : ſon diamétre, dans l'endroit le plus gros, d'environ 2 pieds. Son corps eſt oblong & rond, gros à la partie antérieure ; & la poſtérieure ſe termine en pointe. Son muſeau eſt rond, long & pointu ; l'ouverture de ſa bouche a environ 14 ou 15 pouces. Ses deux mâchoires ſont armées de petites dents pointuës comme des alênes. Ses yeux ſont aſſez grands. Il a par deſſus la tête un canal,

Corporis longitudo 9 aut 10 pedes attingit : diameter, qu'â parte craſſiſſimum, 2 circiter pedes. Corpus habet oblongum & terete, in parte anteriore craſſum, in poſteriore verò in acumen deſinens; roſtrum rotundum, longum & acutum ; oris rictum 14 aut 15 pollices longum. In utráque maxillâ dentibus munitur exiguis, *Subularum* inſtar, acutis. Oculos habet ſat magnos ; fiſtulam in

Digitized by Google

capite, per quam aquam rejicit; pinnas duas laterales 16 circiter pollices longas & 10 pollices latas, & tertiam insuper medium versus dorsum 1 ½ pedem longam & 13 pollices latam. Caudæ latitudo 2 circiter pedes æquat. Cutis est levissima, in dorso nigra, in ventre alba.

par lequel il rejette l'eau. Il a trois nageoires, deux latérales longues d'environ 16 pouces & larges de 10, & une vers le milieu du dos longue de 1 ½ pied & large de 13 pouces. Sa queue est large d'environ 2 pieds. Sa peau est très lisse, & noire sur le dos, & blanche sur le ventre.

2. Le Marsouin.

Delphinus pinnâ in dorso unâ, dentibus acutis, rostro brevi, obtuso... Phocæna.

Delphinus corpore ferè coniformi, dorso lato, rostro subacuto. *Art. Gen. Pisc. g. 47. sp. 1.*
Art. Synon. Pisc. g. 47. sp. 1.
Delphinus corpore subconiformi, dorso lato, rostro subacuto. Phocæna. *Linn. syst. nat. ed. 6. g. 100. sp. 1.*
Faun. Suec. Linn. No. 266.
Phocæna Rondeletii; Gesn. *Raj. Syn. Pisc. p. 13. A. 8.*
Will. Hist. Pisc. p. 31. Fig. T. A. 1. F. 2. (Fig. bona).
Phocæna. *Rondel. Pisc. p. 473.*
Gesn. Icon. Aquat. Fig. p. 163. (Fig. bona).
Jonst. Pisc. p. 155. Fig. T. 41. (Fig. bona).
Charlet. Exer. p. 48.
Tursio, sive Phocæna. *Klein. Pisc. Mis. 2. p. 26. Fig. T. 3. Lit. B. Fœtus T. 2. Lit. A. B. & Cranium T. 1. No. 3. (Fig. bonis).*
Gesn. Pisc. Fig. p. 837. (Fig. bona).
Aldro. Pisc. p. 719. Fig. p. 720. (Fig. bona).
Tursio. *Rondel. Pisc. Fig. p. 474. (Fig. bona).*
Bell. Aquat. p. 15. Fig. p. 16. (Fig. bona).
Sus Marinus, rostro obtuso. *Eus. Nieremb. p. 259.*
Marsouin. *Bell. des Poiss. Fig. p. 12. (Fig. bonne).*
Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. I. p. 211.
Marsouin, Souffleur, ou Tunin. *Hist. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p. 151.*
Les Grecs l'appellent ΔΕΛΦΙΝ. *Gesn. Aldro. Bell.*
Les Allemands, Meerschweyn. *Gesn.*
Les Suédois, Marswin. *Linn. Art.* Tumblare. *Linn.*
Les Danois, Marsuin. *Art.* Bruuskop, *ou* Sprinhwal, *ou* Springer. *Hist. d'Isl.*
Les Cimbres, Marsuin. *Raj. Will. Art.*

Digitized by Google

Les Norvégeois, MARSUEN, *ou* NISER. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Iſlandois, SUINHUAL, *ou* SUINHUALLUR, *ou* WIZING. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Flamands, BRUVNVISCH. *Aldro.*
Dans la Friſe Orientale, BRUNFISCH. *Geſn.*
Les Anglois, PORPESSE. *Raj. Will. Art. Klein. Hiſt. d'Iſl.* PORPUS. *Hiſt. d'Iſl.*
Les Ecoſſois, SEA-PORC. *Hiſt. d'Isl.*

Son corps eſt beaucoup plus gros & moins long que celui du *Dauphin* : il en differe encore par la forme de ſon muſeau, qui eſt court & obtus. Ses deux mâchoires ſont armées de petites dents pointues. Ses yeux ſont très petits. Il a ſur le ſommet de la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il a, comme le *Dauphin*, trois nageoires, deux latérales & une vers le milieu du dos. Sa peau eſt très liſſe, & noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre. On le trouve dans toutes les mers.

A *Delphino* differt corpore craſſiore & minus longo, & roſtro brevi & obtuſo. Dentes habet in utráque maxillâ parvos & acutos; oculos perexiguos; fiſtulam in cervice, per quam aquam rejicit; pinnas tres, *Delphini* inſtar, duas ſcilicet laterales, & præter iſtas, tertiam medium verſùs dorſum. Cutis eſt leviſſima, in dorſo nigra, in ventre alba. Habitat ubiquè in mari.

3. L'ÉPÉE-DE-MER.

Delphinus pinnâ in dorſo unâ Gladii recurvi æmulâ, dentibus acutis, roſtro quaſi truncato.

Epée de Mer. *Hiſt. d'Isl. & de Gro. Tom. II. p.* 155.
Les Pêcheurs de Baleines, *ſur les côtes de la Nouvelle Angleterre, l'appellent* KILLÆRS. *Hiſt. d'Isl.*

La longueur de ſon corps eſt d'environ 10 ou 12 pieds. (Celles qu'on prend ſur les côtes de la *Nouvelle Angleterre*, & qu'on y appelle *Killers*, ont quelquefois juſqu'à 30 pieds de long). Son muſeau eſt comme tronqué. Ses deux mâchoires

Corporis longitudo 10 aut 12 pedes æquat. (Qui circà *Novam Angliam* capiuntur, quique ibi *Killars* vocantur, quandoque 30 pedum longitudinem attingunt). Roſtrum habet quaſi truncatum; dentes in utráque maxillâ parvos

Digitized by Google

& acutos; fistulam in capite, per quam aquam ejicit; pinnas duas laterales, utrinque unam, & præter istas; tertiam in dorso *gladii* recurvi æmulam, 3 aut 4 pedes longam, & unum vel 1 ½ pedem in origine latam; quæ latitudo, sensim versùs ejus extremum procedendo, minuitur. Habitat in mari circà *Spitzbergam*, in *Freto Davis*, & circà *Novam Angliam*.

sont armées de petites dents pointues. Elle a sur la tête un canal, par lequel elle rejette l'eau. Outre ses deux nageoires latérales, elle en a sur le dos une troisiéme, qui ressemble assez à à un *sabre* recourbé: cette nageoire a 3 ou 4 pieds de long, & 1 pied ou 1 ½ pied de large proche le corps; & elle devient de plus en plus étroite, à mesure qu'elle s'en éloigne. On la trouve prés de *Spitzberg*, dans le *Détroit de Davis*, & sur les côtes de la *Nouvelle Angleterre*.

4. L'Epaulard.

Delphinus pinnâ in dorso unâ, dentibus obtusis... Orca.

Delphinus rostro sursùm repando, dentibus latis serratis. *Art. Gen. Pisc. g.* 47. *sp.* 3.
Art. Synon. Pisc. g. 47. *sp.* 3;
Faun. Suec. Linn. N°. 267.
Delphinus rostro sursùm repando, dentibus latis serratis. Orca. *Linn. syst. nat. ed.* 6 *g.* 100. *sp.* 3.
Balæna minor, utrâque maxillâ dentata, *Orca* dicta Bellonio & Rondeletio. *Raj. Syn. Pisc. p.* 15. 1.
Sibbald. Obs. p. 6.
Orca Rondeletii & Bellonii. *Raj. syn. Pisc. p.* 10. 3.
Will. Hist. Pisc. p. 40.
Gesn. Pisc. Fig. p. 748. (*Fig. bona*).
Gesn. Icon. Aquat. p. 168. *Fig. p.* 169. [*Fig. bona*].
Orca. *Klein. Pisc. Mis.* 2. *p.* 22. *cujus cranium Fig. T. I. Nov* 11 (*Fig. bona*).
Aldro. Pisc. p. 697. *Fig. p.* 698. (*Fig. mala*).
Jonst. Pisc. p. 153.
Rondel. Pisc. Fig. p. 483. (*Fig. bona*).
Bell. Aquat. p. 16. *Fig. p.* 18. (*Fig. mala*).
Charlet. Exer. p. 47.
Buts-Kopf. Frid. Martens. *Raj. Syn. Pisc. p.* 10.
Butzkopf. *Hist. d'. fl. & de Gro. Tom. I. p.* 150.
Oudre, ou Grand Marsouin. *Bell. des Pois. p.* 13. *Fig. p.* 14. (*Fig. mauv.*).

Les Eſpagnols l'appellent TINET. *Geſn.*
Les Allemands, VASSZ WAL; ZUBER-WAL. *Geſn.*
Les Suédois, LÖPARE. *Linn.*
Ceux qui habitent les bords de l'Ocean, LOPER. *Art.*
Les Norvégeois, SPRINGWAL. *Geſn.*
Les Anglois, GRAMPUS. *Raj. Art. Hiſt. d'Iſl.*
Les Ecoſſois, NORTH CAPER. *Raj. Art. Hiſt. d'Iſl.*

La longueur de ſon corps eſt d'environ 24 ou 25 pieds: ſon diamétre, dans l'endroit le plus gros, qui eſt vers le ventre, ſurpaſſe la moitié de ſa longueur. Ses deux mâchoires ſont armées de dents obtuſes. La mâchoire inférieure eſt beaucoup plus grande & plus épaiſſe que la ſupérieure. Ses yeux ſont ſemblables à ceux des *Bœufs*. Il a ſur la tête un canal, par lequel il rejette l'eau. Il a trois nageoires, ſçavoir deux latérales, & une ſur le dos qui a plus de 3 pieds de long. Sa peau eſt très liſſe, & noire ſur le dos, & blanche ſur le ventre. On le trouve dans les *Mers Occidentales*.

Longitudo corporis 24 vel 25 circiter pedes attingit: Hujus diameter, quâ parte craſſiſſimum eſt, circà ventrem ſcilicet, mediam longitudinem ſuperat. Dentes habet in utráque maxillâ obtuſos; maxillam inferiorem ſuperiore multò majorem & craſſiorem; oculos oculis *Bovinis* ſimiles; fiſtulam in capite, per quam aquam rejicit. Tribus donatur pinnis, duobus lateralibus, & inſuper tertiâ in dorſo 3 pedum longitudinem ſuperante. Cutis eſt leviſſima, nigra in dorſo, in ventre alba. Habitat in *Mari Occidentali*.

5. LE SOUFFLEUR.

Delphinus pinnâ in dorſo nullâ... PHYSETER.

Phyſeter. *Rondel. Piſc. Fig. p.* 485.
Geſn. Icon. Aquat. Fig. p. 170.
Aldro. Piſc. Fig. p. 689.
Jonſt. Piſc. p. 153.
Charlet. Exer. p. 47.
Phyſeter Rondeletii, Geſn. *Will. Hiſt. Piſc. p.* 41.
(Phyſalus Bellua, ſeu) Phyſeter Rondeletii. *Geſn. Piſc. Fig. p.* 851.
Les Xaintongeois l'appellent SEDENETTE. *Rondel. Geſn.*
Les Languedochiens, MULAR. *Rondel. Geſn.*
Les Grecs, φυσητηρ. *Geſn. Aldro.*
Les Italiens, CAPIDOGLIO. *Rondel. Geſn.*

Digitized by Google

Les Allemands, SPRÜTZWAL; WETTERWAL. *Gesn.*
Les Anglois, WHIRLE-POOL. *Will. Gesn.*

Descriptione *Physeteris*, quam nobis dedit *Rondeletius*, videtur eum nec esse en Genere *Balænarum*, nec ex Genere *Cetorum*; dentes enim habet quemadmodùm *Orca*: *Orca* autem dentibus in utrâque maxillâ munitur; quamobrem *Physeterem Delphini* Generis esse putavi. Hæc sunt verba *Rondeletii*. *Physeter* « Bellua est admirandæ ma- » gnitudinis, ex Balænarum » Genere: ore maximo, den- » tibus acutis, serratis quem- » admodùm Orca. Lingua in- » tùs magna & carnosa. Fis- » tulam longè ampliorem ha- » bet, quàm reliquæ Belluæ: » quam ob causam multò plùs » aquæ rejicit & efflat, undè » illi nomen φυσητηρ. Ab Orca » differt, quod multò longior » sit, & dorsi pinnâ careat. » Pinguedine multâ abundat, » veluti Balæna & Belluæ re- » liquæ ». Habitat in Oceano.

Il paroît par la description que *Rondelet* a donnée du *Souffleur*, qu'il doit être séparé des *Baleines* & des *Cachalots*, puisqu'il a les dents comme l'*Epaulard*, lequel en a aux deux mâchoires: c'est pourquoi je l'ai placé dans le même Genre. Voilà mot pour mot la description qu'en donne *Rondelet*. *Le Souffleur*, « est un Cetacée d'une grandeur » extraordinaire, du Genre des » *Baleines*: sa bouche est très » grande; ses dents sont poin- » tuës, & en forme de scie, com- » me celles de *l'Epaulard*: sa » langue est grande & charnuë. » Le canal par lequel il rejette » l'eau, est beaucoup plus grand » que ceux des autres *Cetacées*: » c'est pourquoi il rejette beau- » coup plus d'eau, & avec plus » de violence: d'où luy est venu » le nom de *Souffleur*. Il differe » de *l'Epaulard* en ce qu'il est » beaucoup plus long, & qu'il » n'a point de nageoire sur le dos. » Il devient très gras, comme la » *Baleine* & les autres *Cetacées*». On le trouve dans l'Ocean.

Digitized by Google

TABLE

Digitized by Google

TABLE
DES CETACE'ES,

Selon l'Ordre dans lequel ils ſont rangés dans cet Ouvrage.

ORDRE I.

I. Genre de la Baleine.

1. La Baleine ordinaire de Groënland.
2. La Baleine d'Iſlande.
3. La Baleine de la Nouvelle Angleterre.
4. La Baleine à ſix boſſes.
5. Le Gibbar.
6. La Baleine à muſeau rond.
7. La Baleine à muſeau pointu.

ORDRE II.

II. Genre du Cachalot.

1. Le Cachalot.
2. Le Cachalot blanc.
3. Le Cachalot de la Nouvelle Angleterre.
4. Le Petit Cachalot.
5. Le Cachalot à dents pointuës.
6. Le Cachalot à dents en faucilles.
7. Le Cachalot à dents plattes.

ORDRE III.

III. Genre du Narhval.

1. Le Narhval.

ORDRE IV.

IV. Genre du Dauphin.

1. Le Dauphin.
2. Le Marſouin.
3. L'Epée-de-mer.
4. L'Epaulard.
5. Le Souffleur.

Digitized by Google

TABLE ALPHABETIQUE
DES NOMS FRANÇOIS.

La Lettre G indique le Genre ; & la lettre E, l'Eſpece.

	G.	E.
B.		
Baleine,	1.	
— De Groënland,	1	1.
— D'Iſlande,	1	2.
— A muſeau pointu,	1	7.
— A muſeau rond,	1	6.
— De la Nouvelle Angleterre,	1	3.
— Ordinaire de Groënland,	1	1.
— A ſix boſſes,	1	4.
Balene,	1	6.
Bec d'Oye,	4	1.
C.		
Achalot,	G. 2.	E.
—	2	1.
—	2	3.
— Blanc,	2	2.
— Des côtes de la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— A dents en faucilles,	2	6.
— A dents plattes,	2	7.
— A dents pointuës,	2	5.
— (Deuxiéme eſpece de)	2	5.
— De la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— (Petit)	2	4.
— A petites dents groſſes & applaties,	2	7.
— (Troiſiéme eſpece de)	2	6.
D.		
Aulphin,	G. 4	E.
Dauphin,	4.	1.
—	4	1.
E.		
Paulard,	G. 4	E. 4.
Epée-de-mer,	4	3.
G.		
Ibbar,	G. 1	E. 5.
L.		
Icorne de mer,	G. 3	E. 1.
M.		
Arſouin,	G. 4	E. 2.
— (Grand)	4	4.
N.		
Arhval,	G. 3.	E.
—	3	1.
O.		
Udre,	G. 4	E. 4.
Oye de mer,	4	1.
S.		
Edenette,	G. 4	E. 5.
Souffleur,	4	2.
—	4	5.

Digitized by Google

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; & Littera S, Speciem.

	G.	S.
A.		
Aquatile ingens,	2	
Arbach,	1	
B.		
Bæna,	1.	
—	2	1.
— &c,		2.
— Albicans,	2	
— Dudleji,	2	
— Glacialis,	1	
— Islandica,	1	2.
— Minor, *Orca* dicta,	4	
— Novæ Angliæ,	1	
— Rondeletii, Gesneri & Aliorum,	1	1.
— Vera,	1	
— Vera Rondeletii,	1	
— Vera Zorgdrageri,	1	
— Vulgaris,	1	1.
— Vulgaris Groenlandica,	1	1.
— Vulgi,	1	1.
— Vulgò dicta,	1	1.
Baleine,	1.	
— De Groenland,	1	1.
— D'Islande,	1	1.
— A museau pointu,	1	7.
— A museau rond,	1	6.
— De la Nouvelle Angleterre,	1	
— Ordinaire de Groënland,	1	1.
— A six bosses,	1	4.
Balæna,	1	6.
— Bellonii,	1	6.
Balena,	1	5.
Balene,	1	6.
Bec d'Oye,	4	1.
Brunfisch,	4	2.
Bruuskop,	4	2.
Bruynvisch,	4	2.
Bunch,	1	1.
Buts-Kopf,	4	4.
Butzkopf,	4	4.
C.		
Cachalot,	1.	
—	2	1.
—	2	5.
— Blanc,	2	2.
— Des côtes de la Nouvelle Angleterre,	2	5.
— A dents en faucilles,	2	6.
— A dents plattes,	2	7.
— A dents pointuës,	2	5.
— (Deuxiéme espece de)	2	5.
— De la Nouvelle Angleterre,	2	3.
— (Petit)	2	4.
— A petites dents grosses & applaties,	2	7.
— (Troisiéme espece de)	2	6.
Cachelot,	2	1.
Caper, (Nord)	1	2.
—	2	1.
Capidoglio,	4	5.
Catodon fistula in cervice,	2	1.
— Fistula in rostro,	2	4.

Digitized by Google

	G.	S.
Cazilot,	2	1.
Ceratodon,	1.	
—	1	1.
Cete,	2	1.
— Clusii,	2	1.
— (Aliud) admirabile,	2	1.
Cetus,	2.	
—	2	1.
— Albicans,	2	2.
— Dentatus,	2	1.
— Minor,	2	4.
— Novæ Angliæ,	2	3.

D.

	G.	S.
Dauphin,	4	1.
Dauphin,	4.	
—	4	1.
Delfino,	4	1.
Delphin,	4	1.
Δελφὶς,	4	1.
Delphinus,	4.	
—	4	1.
— Antiquorum,	4	1.
— Bellonii,	4	1.
Δελφὶς,	4	1.
Dolphin,	4	1.

E.

	G.	S.
Enhörning,	1	1.
Epaulard,	4	4.
Epée-de-mer,	4	3.

F.

	G.	S.
Finbak-Whale,	1	5.
Finfisch,	1	5.
Finfish,	1	5.
Finn-fisk,	1	5.
Fisch, (Knobbel)	1	4.
— (Knoten)	1	4.
Fish, (White)	2	2.

G.

	G.	S.
Gibbar,	1	5.
Grampus,	4	4.
Greenlands-Whale,	1	1.
Groenlands-Hwalfisken,	1	1.
Grönlands-Walfisk,	1	1.

H.

	G.	S.
Hump-back-whale,	1	3.
Hwalfisken, (Groenlands)	1	1.

K.

	G.	S.
Killærs,	4	3.
Knobbel-fisch,	1	4.
Knoten-fisch,	1	4.
Kopf, (Buts)	4	4.
— (Butz)	4	4.

L.

	G.	S.
Licorne de mer,	1	1.
Lespare,	4	4.
Loper,	4	4.

M.

	G.	S.
Marsouin,	4	2.
— (Grand)	4	4.
Marsuen,	4	2.
Marsuin,	4	2.
Marswin,	4	1.
—	4	2.
Meerschweyn,	4	1.
—	4	2.
Meerswyn,	4	1.
Monoceros,	1	1.
— Piscis,	1	1.
Monodon,	1	1.
Morbo,	4	1.
Morhouch,	4	1.
Morskaswinia,	4	1.
Mular,	4	5.
— Nierembergii,	2	7.
Musculus,	1	1.
— Plinii,	1	1.
Mysticetus,	1	1.
— Aristotelis,	1	1.

Digitized by Google

N.

	G.	S.
Narhval,	3.	
—	½	1.
Narhwal,	½	1.
Narwhal,	½	1.
Niſer,	4	2.
Nord-caper,	1	2.
—	2	1.
Northcaper,	4	4.
Nyſſa,	4	1.

O.

	G.	S.
Orca,	4	4.
— Bellonii,	4	4.
— Rondeletii,	4	4.
Oudre,	4	4.
Oye de mer,	4	1.

P.

	G.	S.
Plockfiſch,	1	3.
φαλαινα,	1	5.
Phocæna,	4	2.
— Rondeletii,	4	2.
φωκαινα,	4	2.
Phyſalus,	1	5.
— Bellua,	4	5.
Phyſeter,	4	5.
— &c,	2	6.
—	2	7.
— Rondeletii,	4	5.
— Veterum,	1	5.
φυσητηρ,	4	5.
Piſcis [Albus] Cetaceus,	2	2.
— [Monoceros]	½	1.
— Mularis,	2	7.
Pool, (Whirle)	4	5.
Porc, [Sea]	4	2.
Porpeſſe,	4	1.
—	4	2.
Porpus,	4	2.
Pothiſch,	2	1.
Potfish Zorgdrageri,	2	1.
Potwalfish,	2	1.

S.

	G.	S.
Sandhual,	1	1.
Schweyn, (Meer)	4	1.
—	4	2.
Scrag-Whale,	1	4.
Sea-Porc,	4	2.
Sedenette,	4	5.
Slettbark,	1	2.
Slichteback,	1	1.
Slitbakker,	1	1.
Souffleur,	4	2.
—	4	5.
Sperma cæti-whale,	2	3.
Spring wal,	4	4.
Springer,	4	2.
Sprinhwal,	4	2.
Sprützwal,	4	5.
Suinhual,	4	2.
Suinhuallur,	4	2.
Sus Marinus roſtro acuto,	4	1.
— Marinus roſtro obtuſo,	4	2.
Swinia, (Morska)	4	1.

T.

	G.	S.
Tinet,	4	4.
Towack,	½	1.
Trumpo,	2	3.
Tumblare,	4	2.
Tummeler,	4	1.
Tunin,	4	2.
Turſio,	4	2.
Tuymelaar,	4	1.

V.

	G.	S.
Valena,	1	1.
Vallena,	1	1.
Vaſſz Wal,	4	4.
Unicornu,	½	1.
— Marinum,	½	1.

W.

	G.	S.
Wal,	1	1.
— (Spring)	4	4.

Digitized by Google

	G.	S.
— (Sprinh)	4	2.
— (Sprütz)	4	5.
— (Vaffz)	4	4.
— (Wetter)	4	5.
— (Zuber)	4	4.
Walfisk, [Gr nlands]	1	1.
Waller,	1	1.
Wallfiſch,	1	1.
Weisfiſch,	2	2.
Wetter-Wal,	4	5.
Whale,	1	1.
— [Finbak]	1	5.
— [Greenlands]	1	1.
— [Hump-back]	1	3.
— (Scrag)	1	4.
— [Sperma ceti]	2	3.
Whirle-Pool,	4	5.
White-fish,	2	2.
Whittfiſch,	2	2.
Witingr,	4	2.

Z.

	G.	S.
Zuber-Wal,	4	4.

Digitized by Google

EXTRAIT DES REGISTRES

de l'Académie Royale des Sciences.

Du 6 Septembre 1754.

MESSIEURS Duhamel & de Juſſieu le cadet, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BRISSON, qui a pour titre : *Le Regne Animal, diviſé en neuf Claſſes. Premiere Claſſe, Les Quadrupedes*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que la méthode employée par l'Auteur, paroiſſoit plus exacte que celles qui avoient été publiées, & qu'elle méritoit ſon Approbation : en foi de quoi j'ai ſigné le préſent Certificat. A Paris, le 2 Décembre 1754.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sec. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

EXTRAIT DES REGISTRES

de l'Académie Royale des Sciences.

Du 23 Avril 1755.

MESSIEURS Duhamel & de Juſſieu le cadet, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. BRISSON, dans lequel il établit une nouvelle Claſſe, à laquelle il rapporte les Animaux que les Naturaliſtes déſignent par le nom de *Cetacées*, & qu'ils rangent parmi les *Poiſſons*, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé que cet Ouvrage rempli d'ailleurs de recherches curieuſes ſur les différens noms donnés par les Auteurs à chacun de ces Animaux, pouvoit être utile aux Naturaliſtes, & méritoit d'être imprimé avec ſon Approbation, en foi de quoi j'ai ſigné le préſent certificat. A Paris, ce 26 Avril 1755.

GRANDJEAN DE FOUCHY,

Sec. Perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

PRIVILE'GE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos amés & feaux Conſeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra, SALUT : Nos bien amés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait expoſer qu'ils auroient beſoin de nos Lettres de Privilege pour

Digitized by Google

l'impreſſion de leurs Ouvrages. A CES CAUSES voulant favorablement traiter les Expoſans, Nous leur avons permis & permettons par ces préſentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudroient choiſir, toutes les recherches ou obſervations journalieres, ou relations annuelles de tout ce qui a été fait dans les aſſemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires, ou traités de chacun des Particuliers qui la compoſent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner leſdits Ouvrages, & jugé qu'ils ſont dignes de l'impreſſion, en tel volume, forme, marge, caractere, conjointement ou ſéparement, & autant de fois que bon lui ſemblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de vingt années conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes; ſans toutesfois qu'à l'occaſion des Ouvrages ci-deſſus ſpécifiés ils puiſſent en imprimer d'autres qui ne ſoit pas de ladite Académie: Faiſons défenſes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perſonnes, de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étrangère dans aucun lieu de notre obéiſſance, comme auſſi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucune traduction ou extrait, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit des Expoſans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expoſant, ou de celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois moiſde la date d'icelles; que l'impreſſion deſdits Ouvrages ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier, & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, qu'avant de l'expoſer en vente, les Manuſcrits ou Imprimés qui auront ſervis de copie à l'impreſſion deſdits Ouvrages, ſeront remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, le Sieur DAGUESSEAU, Commandeur de nos Ordres, Chancelier de France, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires de chaqu'un dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notredit très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préſentes; du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir leſdits Expoſans & leurs ayans cauſes pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement; Voulons que la Copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin deſdits Ouvrages, ſoit tenue pour dûement ſignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conſeillers Secretaires, foi ſoit ajoûtée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceſſaires ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le dix-neuviéme du mois de Mars, l'an de grace mil ſept cent cinquante, & de notre Regne le trente-cinquiéme. Par le Roi en ſon Conſeil.

MOL.

Regiſtré ſur le Regiſtre douze de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 430. *fol.* 109. *conformément au Réglement de* 1723. *qui fait défenſes à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles ſoient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, ſoit qu'ils s'en diſent les Auteurs ou autrement; & à la charge de fournir à la ſuſdite Chambre huit Exemplaires preſcrits par l'Article* 108 *du même Reglement. A Paris le* 5 *Juin* 1750.

LE GRAS, *Syndic.*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google